



Perú

Indicadores de Resultados de los Programas Estratégicos, 2010



Encuesta Demográfica y de Salud Familiar-ENDES Continua
(Primeros Resultados)

PERÚ

Lima, febrero 2011

Presentación

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el marco de la implementación de la Estrategia Nacional de Presupuesto por Resultados y como órgano rector del Sistema Estadístico Nacional, pone a disposición de las autoridades, instituciones públicas y privadas, especialistas responsables del diseño y ejecución de los Programas Estratégicos, el documento "Perú: Indicadores de resultados de los Programas Estratégicos 2010", el cual contiene Indicadores de Resultado final e intermedios de tres Programas Estratégicos: Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal y Acceso de la Población a la Identidad.

El documento, que se pone a disposición de los usuarios a pocos días de culminada la recolección de datos corresponde a los primeros resultados de la ENDES Continua 2010 y contiene tres capítulos. El primero presenta indicadores del Programa Articulado Nutricional, desnutrición crónica en niños menores de cinco años con el patrón de referencia NCHS y OMS, Anemia, Lactancia materna exclusiva, prevalencia de infecciones respiratorias agudas, prevalencia de diarrea, bajo peso al nacer y hogares con acceso a agua tratada y con saneamiento básico. En el segundo capítulo, se analiza los indicadores referentes a tasa de mortalidad neonatal, control prenatal en el primer trimestre de gestación, parto institucional y planificación familiar. En el tercero, se presenta indicadores de acceso de la población a la identidad. Finalmente, se incluye una ficha técnica, un glosario de términos y un anexo estadístico, que contiene estimaciones puntuales con sus respectivos intervalos de confianza y coeficiente de variación.

El INEI, expresa su reconocimiento a las autoridades públicas y privadas, a las cerca de 23 mil mujeres en edad fértil seleccionadas al azar por su paciente colaboración en la entrevista, y de manera especial, el apoyo financiero del Ministerio de Economía y Finanzas-Dirección de Presupuesto Público. Asimismo, al personal de campo, Supervisoras, Antropometristas y Entrevistadoras que recorrieron el país en búsqueda de las viviendas seleccionadas y cuyo esfuerzo hizo posible culminar la ardua fase de recolección de datos de la ENDES 2010.

Lima, febrero 2011.



Mg. Aníbal Sánchez Aguilar
Jefe
Instituto Nacional
de Estadística e Informática

Contenido

Presentación	3
PRINCIPALES INDICADORES	7
Capítulo 1: ARTICULADO NUTRICIONAL	11
1.1 DESNUTRICIÓN CRÓNICA	11
1.2 ANEMIA	14
1.3 LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	16
1.4 INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA)	17
1.5 PREVALENCIA DE DIARREA	18
1.6 BAJO PESO AL NACER	20
1.6 HOGARES CON ACCESO A AGUA TRATADA Y CON SANEAMIENTO BÁSICO	21
Capítulo 2: SALUD MATERNO NEONATAL	27
2.1 TASA DE MORTALIDAD NEONATAL	27
2.2 CONTROL PRENATAL EN EL PRIMER TRIMESTRE DE GESTACIÓN	28
2.3 PARTO INSTITUCIONAL	29
2.4 TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD (TGF)	30
2.5 PLANIFICACIÓN FAMILIAR	31
Capítulo 3: ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA IDENTIDAD	33
3.1 NIÑAS Y NIÑOS SIN INSCRIPCIÓN EN LA MUNICIPALIDAD Y/O RENIEC	39
FICHA TÉCNICA	43
GLOSARIO DE TÉRMINOS	47
ANEXO 1: ARTICULADO NUTRICIONAL	51
ANEXO 2: SALUD MATERNO NEONATAL	87
ANEXO 3: ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA IDENTIDAD	127

PERÚ: PRINCIPALES INDICADORES DE LOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS, 2000, 2007, 2009 Y 2010
(Porcentajes)

Programa / Indicador	2000	2007	2009	2010
I. Articulado nutricional				
Menores de 5 años con desnutrición crónica (NCHS).	25,4	22,6	18,3	17,9
Menores de 5 años con desnutrición crónica (OMS).	...	28,5	23,8	23,2
Niños de 6 a menos de 36 meses con anemia.	60,9	56,8	50,4	50,3
Niños nacidos con bajo peso al nacer (menos de 2,5 Kg.).	8,5	8,4	7,1	8,0
Menores de 6 meses con lactancia exclusiva.	67,2	68,7	68,5	68,3
Menores de 36 meses que en las dos semanas anteriores a la encuesta tuvieron infección respiratoria aguda (IRA).	21,3	24,0	17,2	18,3
Menores de 36 meses que en las dos semanas anteriores a la encuesta tuvieron enfermedad diarreica aguda (EDA).	19,8	17,4	18,0	18,9
Hogares con acceso a agua tratada.	84,4	92,9	91,1	91,5
Hogares con saneamiento básico.	75,9	81,8	83,3	85,3
Hogares rurales con saneamiento básico.	48,6	61,0	64,7	67,8
Mujeres gestantes que recibieron suplemento de hierro en el último nacimiento anterior a la encuesta.	60,2	74,9	80,1	86,1
II. Salud materno neonatal				
Tasa de mortalidad neonatal ^{1/} en los 10 años anteriores a la encuesta.	23,0	15,0	13,0	11,0
Tasa global de fecundidad en los 3 años anteriores a la encuesta.	2,9	2,4	2,6	2,5
Mujeres en edad fértil (MEF) que conoce algún método de planificación familiar.	97,9	99,2	99,3	99,6
MEF en unión que usa algún método de planificación familiar.	68,9	73,1	73,2	74,4
MEF en unión que usa algún método moderno de planificación familiar.	50,4	47,8	50,0	50,5
Gestantes que en el último nacimiento recibieron su primer control prenatal en el primer trimestre de gestación.	58,0	71,3	72,4	73,0
Gestantes que en el último nacimiento recibieron seis o más controles prenatales.	50,6	76,4	80,8	81,0
Partos institucionales ^{2/} de gestantes procedentes del área rural del último nacimiento en los 5 años antes de la encuesta.	23,4	49,4	55,0	58,4
Partos institucionales ^{2/} del último nacimiento en los 5 años antes de la encuesta.	57,6	76,0	79,1	81,0
Partos en establecimiento de salud de gestantes del área rural del último nacimiento de los 5 años antes de la encuesta.	23,8	50,5	56,5	60,0
Partos en establecimiento de salud de gestantes del área rural del último nacimiento en los 5 años antes de la encuesta atendido por profesional de la salud.	29,0	52,7	61,0	63,7
Partos del último nacimiento en los 5 años antes de la encuesta atendido por profesional de la salud.	62,5	76,5	82,5	83,8
Mujeres en unión con demanda insatisfecha de planificación familiar.	10,2	7,8	7,2	6,9
III. Acceso de la población a la identidad				
Niños de 6 a 59 meses que no están inscritos en la Municipalidad/Oficina Registral del RENIEC.	6,8	5,8	8,1	7,2

1/ Mortalidad Neonatal: Probabilidad de morir durante el primer mes de vida.

2/ Se refiere a los partos ocurridos en establecimiento de salud y que fueron atendidos por profesional de la salud.

Fuente: INEI - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES 2000, 2007, 2009 y 2010.

**PRINCIPALES INDICADORES DE LOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS EN EL ÁMBITO DEL
PROGRAMA JUNTOS, 2000, 2007, 2009 Y 2010**

Programa / Indicador	2000	2007	2009	2010
I. Articulado nutricional				
Menores de 5 años con desnutrición crónica (NCHS).	49,1	42,1	38,7	38,0
Menores de 5 años con desnutrición crónica (OMS).	...	54,7	47,9	46,8
Niños de 6 a menos de 36 meses con anemia.	63,0	62,5	61,1	63,6
Niños nacidos con bajo peso al nacer (menos de 2,5 Kg.).	13,7	9,4	9,8	11,9
Menores de 6 meses con lactancia exclusiva.	83,3	81,1	87,8	87,3
Menores de 36 meses que en las dos semanas anteriores a la encuesta tuvieron infección respiratoria aguda (IRA).	21,1	25,3	18,3	17,7
Menores de 36 meses que en las dos semanas anteriores a la encuesta tuvieron enfermedad diarreica aguda (EDA).	23,6	20,0	16,2	15,6
Hogares con acceso a agua tratada.	66,2	84,1	83,5	88,7
Hogares con saneamiento básico.	43,0	59,2	67,1	70,5
Hogares rurales con saneamiento básico.	41,7	57,8	65,3	67,8
Mujeres gestantes que recibieron suplemento de hierro en el último nacimiento anterior a la encuesta.	51,5	71,7	78,9	84,9
II. Salud materno neonatal				
Mujeres en edad fértil (MEF) que conoce algún método de planificación familiar.	90,7	97,0	97,0	98,2
MEF en unión que usa algún método de planificación familiar.	54,4	68,0	68,6	72,3
MEF en unión que usa algún método moderno de planificación familiar.	32,7	37,5	40,0	43,0
Gestantes que en el último nacimiento recibieron su primer control prenatal en el primer trimestre de gestación.	38,5	61,0	64,9	67,3
Gestantes que en el último nacimiento recibieron seis o más controles prenatales.	24,4	66,0	75,8	77,2
Partos institucionales ^{2/} de gestantes procedentes del área rural del último nacimiento en los 5 años antes de la encuesta.	13,6	42,2	50,9	56,8
Partos institucionales ^{2/} del último nacimiento en los 5 años antes de la encuesta.	14,7	44,1	54,5	60,4
Partos en establecimiento de salud de gestantes del área rural del último nacimiento de los 5 años antes de la encuesta.	14,0	43,4	52,1	58,9
Partos en establecimiento de salud de gestantes del área rural del último nacimiento en los 5 años antes de la encuesta atendido por profesional de la salud.	18,7	44,7	58,9	63,2
Partos del último nacimiento en los 5 años antes de la encuesta atendido por profesional de la salud.	20,0	46,4	62,1	66,8
Mujeres en unión con demanda insatisfecha de planificación familiar.	19,4	13,6	9,9	8,8
III. Acceso de la población a la identidad				
Niños de 6 a 59 meses que no están inscritos en la Municipalidad/Oficina Registral del RENIEC.	6,4	5,6	6,7	6,2

1/ Mortalidad Neonatal: Probabilidad de morir durante el primer mes de vida.

2/ Se refiere a los partos ocurridos en establecimiento de salud y que fueron atendidos por profesional de la salud.

Fuente: INEI - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES 2000, 2007, 2009 y 2010.

Capítulo I

Articulado Nutricional

“Reducir la desnutrición crónica en niños menores de cinco años de 22,6% que existía en el 2007 a 16,0% en el 2011”

MEF - Líneas de Base de los Programas Estratégicos 2008 - 2009

Capítulo N° 1

Articulado Nutricional

1.1 DESNUTRICIÓN CRÓNICA

La desnutrición crónica, es un indicador del nivel de desarrollo de un país. Lograr su disminución contribuirá a garantizar el desarrollo de la capacidad física, intelectual, emocional y social de las niñas y niños. Este indicador se determina al comparar la talla de la niña o niño con la esperada para su edad y sexo. En el marco de la estrategia de Presupuesto por Resultados, la desnutrición crónica es un indicador de resultado final y es utilizado para analizar los logros del Programa Articulado Nutricional.


Patrón de Referencia NCHS^{2/}

La desnutrición crónica es el estado en el cual las niñas y niños, tienen baja estatura con relación a una población de referencia, refleja los efectos acumulados de la inadecuada alimentación o ingesta de nutrientes

y de episodios repetitivos de enfermedades (principalmente diarreas e infecciones respiratorias), y de la interacción entre ambas.

En el periodo 2007-2010 la desnutrición crónica a nivel nacional ha descendido en 4,7 puntos porcentuales, al pasar de 22,6 a 17,9 por ciento, es decir, por cada 100 niñas y niños, cinco de ellos dejaron la condición de desnutrición. Para el año 2010 al desagregar a los niños menores de cinco años de edad en dos grupos, uno de menores de 36 meses y otro de 36 a 59 meses se observa que la proporción de desnutrición crónica es algo mayor en el segundo grupo de edad, 19,4 por ciento frente a 16,9 por ciento, para el grupo de menores de 36 meses. (Ver Cuadro N° 01. Anexo I)

GRÁFICO N° 01
PERÚ: PROPORCIÓN DE MENORES DE 5 AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA,
SEGÚN PATRÓN DE REFERENCIA NCHS, 2000, 2007, 2009 Y 2010




1/ INEI - Mapa de Desnutrición Crónica en Niñas y Niños Menores de cinco años a nivel Provincial y Distrital, 2007, pág.7. Lima, 2009

2/ Tomando como base el patrón de referencia de la National Center for Health Statistics (NCHS).

Por área de residencia, los resultados de la ENDES 2007 y la ENDES Continua 2010 muestra una disminución, siendo mucho mayor en el área rural. Entre el año 2007 y 2009 la desnutrición crónica en el área urbana pasó de 11,8 por ciento a 10,1 por ciento; disminuyendo en 1,7 puntos porcentuales; en tanto, que en el área rural disminuyó de 36,9 a 31,3 por ciento; lo que significa 5,6 puntos porcentuales menos.

Por región natural, se aprecia la tendencia encontrada en diferentes investigaciones respecto al comportamiento de las variables socioeconómicas y demográficas relacionadas con la desnutrición crónica. La región de la Sierra es la que tiene el mayor porcentaje de desnutrición crónica (27,6 por ciento), seguida de la región Selva (21,7 por ciento) siendo la sub-región Resto de Costa la que tiene el porcentaje más bajo (10,3 por ciento).

GRÁFICO N° 02
PERÚ: PROPORCIÓN DE MENORES DE 5 AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA,
SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA Y REGIÓN NATURAL, 2007, 2009 Y 2010
 (Patrón de referencia NCHS)



Una de las variables que influye en el nivel de la desnutrición crónica de los niños es la educación de la madre, a mayor nivel educativo se observa menor porcentaje de desnutrición, 6,2 por ciento en niñas y niños de madres con educación superior y 32,5 por ciento en aquellos que tienen madres con educación primaria o sin nivel educativo. (Ver Cuadro N° 01. Anexo I).

Otra variable asociada al nivel de desnutrición crónica es la disponibilidad de agua tratada. El 25,3 por ciento de niñas y niños menores de cinco años de edad con desnutrición crónica consumen agua sin tratamiento alguno. La desnutrición crónica es más baja cuando consumen agua tratada con Cloro residual (5,6 por ciento); en tanto, que el 19,0 por ciento consume agua hervida, de red pública (17,5 por ciento) y otras fuentes (23,5 por ciento).

Según quintil de riqueza, se puede observar que los porcentajes de desnutrición crónica son altos en el quintil inferior (35,9 por ciento) y en el segundo quintil (21,3 por ciento), correspondiendo al quintil superior solo un 2,9 por ciento de niños con desnutrición crónica.

En el año 2010, las niñas y niños menores de cinco años de edad residentes en el ámbito del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más pobres - JUNTOS, tienen más del doble de porcentaje de desnutrición crónica (38,0 por ciento), que el total del país (17,9 por ciento). En el año 2007, la desnutrición crónica fue de 42,1 por ciento; en el año 2010 alcanzó el 38,0 por ciento, representando en este período una disminución de 4,1 puntos porcentuales. (Ver Cuadro N° 01. Anexo I).

Desnutrición crónica departamental

A nivel de departamento, los mayores niveles de desnutrición crónica en niñas y niños menores de cinco años se presentan en Huancavelica (44,7 por ciento), Cajamarca (32,0 por ciento), Huánuco (31,0 por ciento), Apurímac (30,9 por ciento) y Ayacucho (30,3 por ciento). Contrariamente, Tacna, Moquegua y Lima presentan los menores niveles de desnutrición crónica (2,4, 4,8 y 6,2 por ciento, respectivamente).

Por otro lado, teniendo en cuenta el valor de la línea de base nacional de este indicador (22,6 por ciento)


implementado en el año 2007, los resultados de la ENDES Continua 2010 muestran que los niveles de desnutrición en once departamentos se encuentran por encima de la línea de base: Huancavelica, Cajamarca, Huánuco, Apurímac, Ayacucho, Cusco, Junín, Loreto, Pasco, Ucayali y Áncash. En cinco departamentos, los niveles de desnutrición se encuentran por debajo de la Línea de base pero superior a la meta a alcanzar en el año 2011 (16,0 por ciento), Amazonas, San Martín, La Libertad, Puno y Piura. En tanto, que ocho departamentos muestran niveles inferiores de desnutrición al 16,0 por ciento, que es la meta nacional.

Patrón de Referencia OMS^{3/}

En el año 2006, la Organización Mundial de la Salud, recomendó utilizar un nuevo patrón de referencia conocido como Patrón OMS, este patrón es más exigente en determinados periodos del crecimiento de niñas y niños, resultando que la estimación de la desnutrición crónica utilizando este patrón de referencia es mayor

que el estimado con el patrón NCHS^{4/}. Utilizando el patrón OMS la desnutrición crónica afectó al 23,2 por ciento de niñas y niños menores de cinco años de edad, esta situación estaría reflejando una tendencia decreciente al compararlo con el año 2007, donde se registró el 28,5 por ciento de desnutrición crónica.

GRÁFICO N° 03
PERÚ: PROPORCIÓN DE MENORES DE 5 AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA,
SEGÚN PATRÓN DE REFERENCIA OMS, 2000, 2007, 2009 Y 2010



Por área de residencia, la desnutrición crónica afectó en mayor proporción a niñas y niños del área rural (38,8 por ciento), es decir, 2,8 veces más que en área urbana (14,1 por ciento).


Por región natural, la Sierra presenta la mayor proporción de desnutrición crónica (34,4 por ciento),

seguida de la región Selva (28,5 por ciento); en tanto, que Lima Metropolitana y la sub-región Resto Costa presenta los menores porcentajes (8,6 y 14,9 por ciento, respectivamente). Por otro lado, la desnutrición crónica afectó con mayor intensidad a niñas y niños de madres sin nivel de educación y con nivel primario (40,4 por ciento). (Ver Cuadro N° 02. Anexo I).

3/ Organización Mundial de la Salud, difundido internacionalmente el año 2006.

4/ INEI- Mapa de Desnutrición Crónica en Niñas y Niños menores de cinco años a nivel provincial y distrital 2009, pág. 26

GRÁFICO N° 04
PERÚ: PROPORCIÓN DE MENORES DE 5 AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA,
SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA Y REGIÓN NATURAL, 2007, 2009 Y 2010
 (Patrón de referencia OMS)



Desnutrición departamental

A nivel de departamento, los mayores niveles de desnutrición crónica en niñas y niños menores de cinco años utilizando el patrón de referencia OMS se presentan en Huancavelica (54,6 por ciento), Cajamarca (40,5 por ciento), Ayacucho (38,8 por

ciento), Apurímac (38,6 por ciento) y Huánuco (37,4 por ciento). Contrariamente, Tacna, Moquegua y Lima presentan los menores niveles de desnutrición crónica (3,0, 5,7 y 8,9 por ciento, respectivamente).

1.2 ANEMIA

La anemia es una condición en la cual la sangre carece de suficientes glóbulos rojos o la concentración de hemoglobina es menor que los valores de referencia según edad, sexo y altitud. La hemoglobina, un conglomerado de proteína que contiene hierro, se produce en los glóbulos rojos de los seres humanos y su deficiencia indica que existe una deficiencia de hierro. Si bien se han identificado muchas causas de la anemia, la deficiencia nutricional debido a una falta de cantidades específicas de hierro en la alimentación diaria constituye más de la mitad del número total de casos de anemia.

La prevalencia de anemia en menores de 36 meses, es un indicador de resultado intermedio del Programa Articulado Nutricional cuyo valor de la Línea de base

implementada en el 2007 fue de 56,8% y presenta una disminución de 6,5 puntos porcentuales respecto al año 2010. (Ver Cuadro N° 04. Anexo I).

Por área de residencia, la proporción de anemia en niñas y niños de 6 a menos de 36 meses de edad, es mayor en el área rural (56,6 por ciento) y presenta una diferencia de 10,0 puntos porcentuales con respecto al área urbana (46,6 por ciento).

Por región natural, la región de la Sierra es la que presenta la mayor proporción de niñas y niños con anemia (60,1 por ciento), seguida de la región Selva (52,5 por ciento); en tanto, que la sub-región Resto de Costa presenta la menor proporción (40,4 por ciento).

GRÁFICO N° 05
PERÚ: PROPORCIÓN DE NIÑOS MENORES DE SEIS A MENOS DE 36 MESES DE EDAD CON ANEMIA, 2000, 2007, 2009 y 2010





GRÁFICO N° 06
PERÚ: PROPORCIÓN DE NIÑOS DE 6 A MENOS DE 36 MESES DE EDAD CON ANEMIA, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA Y REGIÓN NATURAL, 2007, 2009 y 2010



También existe una relación inversa entre el nivel de anemia de las niñas y niños y el nivel de educación de la madre, a mayor nivel educativo se observa menor proporción de niñas y niños con anemia (39,3 por ciento en niñas y niños de madres con educación superior y 57,1 por ciento en madres con nivel Primaria o sin nivel educativo).

Según quintil de riqueza, se puede observar que la mayor proporción de niñas y niños con anemia se encuentran en el quintil inferior (59,4 por ciento), seguido por el

segundo quintil (54,6 por ciento), correspondiendo al quintil superior un 31,0 por ciento de niñas y niños con anemia entre 6 y menos de 36 meses de edad.

Las niñas y niños entre 6 y menos de 36 meses de edad residentes en el ámbito del Programa JUNTOS, presentan la mayor proporción de anemia, que el total del país, en los años 2007 (62,5 por ciento) y 2010 (63,6 por ciento), y se incrementó en 1,1 puntos porcentuales en el periodo 2007-2010. (Ver Cuadro N° 04. Anexo I).

Anemia por departamentos

A nivel de departamento, los mayores niveles de anemia en niñas y niños entre 6 a menos de 36 meses se presentan en Puno (78,1 por ciento), Huancavelica (71,5 por ciento), Huánuco (66,5 por ciento) y Ucayali

(65,3 por ciento). En tanto, que Lambayeque, Piura, Junín, Lima y Moquegua presentan los menores niveles de desnutrición crónica (32,2, 36,8, 41,4, 41,5 y 42,4 por ciento, respectivamente).

1.3 LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA

El estado nutricional es el resultante final del balance entre ingesta y requerimiento de nutrientes^{5/}. La lactancia materna exclusiva provee de nutrientes adecuados para la niña o niño, durante los primeros seis meses de vida, sin requerir otros alimentos o agregados como agua o jugos. La leche materna está libre de contaminantes y gérmenes, es decir, la niña o niño con lactancia exclusiva estará protegido de contraer infecciones a través de los alimentos, de los chupones o cucharas.

Asimismo, la leche materna sirve de inmunización para un gran número de enfermedades comunes en la infancia.

La ENDES Continua 2010 muestra que el 68,3 por ciento de los menores de seis meses de edad son alimentados exclusivamente con leche materna. Según área de residencia, ésta proporción es mayor en el área rural (83,9 por ciento) que en el área urbana (59,9 por ciento).


Al comparar los resultados con la ENDES 2007, se observa que las niñas y niños de seis meses de edad con lactancia exclusiva han disminuido en 0,4 punto porcentual. Por área de residencia, disminuye en el área urbana al pasar de 64,5 a 59,9 por ciento (4,6

puntos porcentuales); mientras, que en el área rural aumenta de 76,5 a 83,9 por ciento (7,4 puntos porcentuales).

A nivel de región natural, en la Sierra el 83,7 por ciento de menores de seis meses de edad son alimentados exclusivamente con leche materna y en la Selva el 77,2 por ciento, presenta la mayor proporción en contraste con la observada en la región de la Costa, donde el 52,8 por ciento de niños tienen lactancia materna exclusiva. Con respecto a la ENDES 2007, la proporción de niñas y niños de seis meses que tienen lactancia exclusiva y que residen en la Sierra se incrementa en 11,3 puntos porcentuales al pasar de 72,4 a 83,7 por ciento; en tanto, en la Costa, disminuye en 7,3 puntos porcentuales (de 60,1 a 52,8 por ciento).


A nivel nacional la mayor proporción de menores de seis meses que se alimentan con lactancia materna exclusiva se presentan en los departamentos de Puno (97,3 por ciento), Huancavelica (94,7 por ciento), Junín (91,5 por ciento), Ucayali (87,2 por ciento), Apurímac (86,3 por ciento), Huánuco (83,4 por ciento), Cusco (82,3 por ciento) y Ayacucho con 82,0 por ciento. (Ver Cuadro N° 03A. Anexo I).

GRÁFICO N° 07
PERÚ: PROPORCIÓN DE MENORES DE SEIS MESES DE EDAD
CON LACTANCIA EXCLUSIVA, 2000, 2007, 2009 Y 2010



5/ HODGSON, María Isabel. Evaluación del Estado Nutricional. Departamento de Pediatría. Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago de Chile 2000.

GRÁFICO N° 08
 PERÚ: PROPORCIÓN DE MENORES DE SEIS MESES DE EDAD
 CON LACTANCIA EXCLUSIVA, 2007, 2009 Y 2010




1.4 PREVALENCIA DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (IRAs)

Las Infecciones Respiratorias Agudas "IRAs", son un conjunto de enfermedades que afectan las vías por donde pasa el aire en el cuerpo humano y son causadas tanto por virus como por bacterias. Este grupo de enfermedades son la principal causa de consulta en los servicios de salud y la que causa más muertes, especialmente en niñas y niños menores de 36 meses y en personas mayores de 60 años de edad. Las IRAs son más frecuentes cuando se producen cambios bruscos en la temperatura y en ambientes muy contaminados.

En el periodo 2007-2010 la proporción de niños afectados por episodios de infección respiratoria aguda (IRA) a nivel nacional, ha disminuido en 5,7 puntos porcentuales, al pasar de 24,0 a 18,3 por ciento. La proporción de IRA observada en menores de 36 meses y dentro de las dos semanas anteriores a la encuesta, por área de residencia, ha disminuido entre la ENDES 2007 y la ENDES Continua 2010 en 3,6 puntos porcentuales en el área urbana (al pasar de 21,6 a 18,0 por ciento), y de 8,6 puntos porcentuales en el área rural (de 27,3 a 18,7 por ciento).

GRÁFICO N° 09
 PERÚ: PROPORCIÓN DE MENORES DE 36 MESES QUE EN LAS DOS ÚLTIMAS SEMANAS ANTERIORES A LA ENCUESTA TUVIERON IRA, 2000, 2007, 2009 Y 2010



Por región natural se aprecia que la región de la Selva es la que tiene el mayor porcentaje de IRA en menores de 36 meses de edad (24,4 por ciento), seguida de la región Costa (18,3 por ciento), siendo la región Sierra la que tiene el porcentaje más bajo (15,6 por ciento).


También influye en el nivel de IRAs en menores de 36 meses de edad el nivel de educación de la madre, a mayor nivel educativo se observa menor porcentaje de IRA (12,4 por ciento en las niñas y niños de madres con educación superior y 21,2 por ciento en los que tienen madres con educación Primaria o sin nivel educativo).

Según quintil de riqueza, se puede observar que la mayor proporción de IRA se encuentran en el quintil inferior y segundo quintil 20,9 y 21,1 por ciento, respectivamente, correspondiendo al quintil superior solo un 11,6 por ciento de IRA.

Las niñas y niños menores de 36 meses de edad que tuvieron IRA en las dos semanas anteriores a la encuesta residentes en el ámbito JUNTOS, presentan un 17,7 por ciento de IRA en el año 2010, menor en 7,6 puntos porcentuales respecto al encontrado en el año 2007, alrededor de 25,3 por ciento. (Ver Cuadro N° 05. Anexo I).

A nivel nacional la mayor proporción de menores de 36 meses de edad con IRA se presentan en los departamentos de Loreto (33,9 por ciento), Pasco (30,3 por ciento), Piura (25,1 por ciento), Huánuco (24,3 por ciento) y Áncash (24,1 por ciento). En tanto, que las menores proporciones de IRA se presentan en los departamentos de La Libertad (9,2 por ciento), Apurímac (9,3 por ciento), Arequipa (10,1 por ciento) y Tacna 11,4 por ciento. (Ver Cuadro N° 05A. Anexo I).

GRÁFICO N° 10
PERÚ: PROPORCIÓN DE MENORES DE 36 MESES QUE EN LAS DOS SEMANAS ANTERIORES A LA ENCUESTA TUVIERON IRA, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA Y REGIÓN NATURAL, 2007, 2009 Y 2010



1.5 PREVALENCIA DE DIARREA

La prevalencia de diarrea, es una enfermedad intestinal generalmente infecciosa, caracterizada por evacuaciones líquidas o disminuidas de consistencia y frecuentes, casi siempre en número mayor a tres en 24 horas con evolución menor de dos semanas. La diarrea está considerada entre las principales causas de morbilidad y mortalidad en el mundo, particularmente entre las niñas y niños que viven en medio de pobreza, educación insuficiente de la madre y saneamiento inadecuado.


La ENDES Continua 2010, revela que a nivel nacional

dos de cada diez menores de tres años de edad (18,9 por ciento) tuvieron diarrea en las dos semanas anteriores al día de la entrevista, proporción que fue mayor en el área urbana (19,3 por ciento) que en el área rural (18,3 por ciento); las cuales, respecto a las estimaciones de la ENDES Continua 2009, evidencia el aumento en cerca de un punto porcentual en la estimación nacional (de 18,0 a 18,9 por ciento), como resultado del incremento de cerca de dos puntos porcentuales en el área urbana (de 17,5 a 19,3 por ciento) y la disminución de cerca de un punto porcentual en el área rural (de 18,9 a 18,3 por ciento).

Mientras, que en el área rural tiende a disminuir la proporción de menores de tres años con diarrea, en el área urbana se advierte que dicha proporción se incrementa.

En el periodo 2007-2010 la diarrea en menores de 36 meses de edad a nivel nacional se ha incrementado en un 1,5 puntos porcentuales, al pasar de 17,4 en el 2007 a 18,9 por ciento en el 2010.


GRÁFICO N° 11
PERÚ: PROPORCIÓN DE MENORES DE 36 MESES QUE EN LAS DOS ÚLTIMAS SEMANAS ANTERIORES A LA ENCUESTA TUVIERON EDA, 2000, 2007, 2009 Y 2010



Por región natural, la Selva es la que presenta la mayor proporción de diarrea (28,1 por ciento), seguido de la

Costa con el 17,3 por ciento, siendo la región Sierra (17,0 por ciento) la que presenta el menor porcentaje.

GRÁFICO N° 12
PERÚ: PROPORCIÓN DE MENORES DE 36 MESES QUE EN LAS DOS SEMANAS ANTERIORES A LA ENCUESTA TUVIERON EDA, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA Y REGIÓN NATURAL, 2007, 2009 Y 2010



De acuerdo al nivel de educación de la madre, se observa que a mayor nivel educativo menor es la proporción de episodios de diarrea en sus niños (14,0 por ciento en las niñas y niños de madres con educación superior y 20,6 por ciento en madres con educación Primaria o sin nivel educativo).

Respecto al agua que consumen las niñas y niños el porcentaje de diarrea la proporción de diarrea es más baja cuando es tratada con Cloro residual o es hervida y de Red Pública (16,9 por ciento en cada caso). Por otro lado, los niños con prevalencia de diarrea se incrementan a 24,4 por ciento cuando estos consumen agua sin tratamiento.

Las niñas y niños menores de cinco años de edad residentes en el ámbito del Programa JUNTOS,

presentan una menor proporción de diarrea (15,6 por ciento) con respecto al total del país (18,9 por ciento).

Prevalencia de diarrea por departamento

A nivel nacional la mayor proporción de enfermedades diarreicas se presentan en Loreto (35,4 por ciento), San Martín (29,0 por ciento), Madre de Dios (27,0 por

ciento), Amazonas (23,5 por ciento) y Pasco (23,3 por ciento).

1.6 BAJO PESO AL NACER

La salud infantil en el Perú ha continuado mejorando en la última década. Sin embargo, persisten problemas que merecen preferente atención, como es el bajo peso al nacer, el cual es un factor de riesgo para la salud y supervivencia del nacido vivo. Según los estudios que la OMS ha realizado a nivel mundial un bebé que nace con menos de 2.5 kilos tiene veinte veces más probabilidad de morir.

área rural (0,9 punto porcentual); sin embargo, disminuyó (0,7 punto porcentual) en el área urbana, lo que significa que las niñas y niños que nacieron en este ámbito geográfico nacieron con mejor peso.

En el año 2010, el 8,0 por ciento de las niñas y niños menores de cinco años de edad registró bajo peso al nacer (< 2,5 Kg). Este porcentaje es ligeramente menor al encontrado en la ENDES 2007 (8,4 por ciento); además, se observa que existe mayor porcentaje de nacidos vivos en el área rural (10,4 por ciento) con bajo peso al nacer, que en el área urbana (7,0 por ciento).

Por región natural la Sierra y la Selva presentan proporciones por encima del promedio nacional (9,8 y 8,8 por ciento, respectivamente), mientras que Lima Metropolitana (6,2 puntos porcentuales) y Resto Costa (7,1 puntos porcentuales) están por debajo del promedio nacional.

Por departamento, la menor proporción de niñas y niños nacidos con bajo peso al nacer son Tacna (3,1 por ciento), Puno (4,1 por ciento), Moquegua (4,3 por ciento) y Arequipa (5,7 por ciento). (Ver Cuadros N° 07 y 07A. Anexo I).

Al comparar con la ENDES 2007, la proporción de recién nacidos con bajo peso al nacer aumentó en el

GRÁFICO N° 13
PERÚ: PROPORCIÓN DE NACIDOS VIVOS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA CON BAJO PESO AL NACER (<2.5 KG.), 2000, 2007, 2009 Y 2010





GRÁFICO N° 14
 PERÚ: PROPORCIÓN DE NACIDOS VIVOS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
 ANTERIORES A LA ENCUESTA CON BAJO PESO AL NACER (<2.5 KG.), SEGÚN
 ÁREA DE RESIDENCIA Y REGIÓN NATURAL 2007, 2009 Y 2010



1.7 HOGARES CON ACCESO A AGUA TRATADA Y CON SANEAMIENTO BÁSICO

El agua tiene una estrecha relación con la vida de las personas pues es un agente esencial de salud o enfermedad. Si el agua está contaminada se convierte en uno de los principales vehículos de transmisión de

enfermedades, las que afectan a los grupos más desprotegidos de la población, entre ellos, a los menores de edad.

Hogares con acceso a agua tratada

Se entiende como agua tratada aquella que proviene de la red pública o de aquella que no proviniendo de la red pública en el hogar le dan algún tratamiento antes de beberla, tal como: la hierven, clorifican, desinfectan o consumen agua embotellada.

A nivel nacional, nueve de cada diez hogares (91,5 por ciento) tienen acceso a agua segura, proporción que es mayor en el área urbana (95,9 por ciento) que en el área rural (82,2 por ciento), esta última se explica por el uso de formas alternativas de desinfección del agua que usan para beber.

En relación con la ENDES 2007, la proporción de hogares con acceso a agua tratada disminuyó a nivel nacional; así como por área urbana y rural (1,4, 0,9 y 3,1 puntos porcentuales, respectivamente).

Según región natural, la proporción de hogares con acceso a agua es mayor en la Costa (95,9 por ciento) que en las regiones de la Sierra y de la Selva (90,5 y

75,3 por ciento, respectivamente). Sin embargo, de acuerdo con los resultados obtenidos con la ENDES 2007, el porcentaje de hogares con acceso a agua ha disminuido en 2,0, 0,5 y 1,6 puntos porcentuales en las tres regiones mencionadas, respectivamente.

La ENDES Continua 2010 refleja que la mayoría de los hogares que tienen acceso a agua tratada se ubican en el quintil superior (99,8 por ciento) y cuarto quintil de riqueza (99,3 por ciento). Con respecto a la ENDES 2007, los hogares que se ubican en el quintil inferior y quintil intermedio de riqueza se incrementan en 1,1 y 0,2 puntos porcentuales, respectivamente. (Ver Cuadro N° 14 Anexo I).

Por departamentos, Apurímac es el que tiene el mayor número de hogares que disponen de agua tratada (99,6 por ciento); le sigue Ayacucho (98,8 por ciento), Cusco (98,4 por ciento), Lima (98,0 por ciento), Arequipa (97,8 por ciento), Pasco (97,3 por ciento), Moquegua (96,2 por ciento), Tacna (96,0 por ciento) y Junín (95,1

por ciento), entre otros. Por el contrario, Loreto (52,8 por ciento), Ucayali (73,7 por ciento), Huánuco (78,0 por ciento), Puno (78,3 por ciento) y Amazonas (78,6

por ciento) tienen menos proporción de hogares con acceso a agua tratada. (Ver Cuadro N° 14A Anexo I).

GRÁFICO N° 15
PERÚ: PROPORCIÓN DE HOGARES CON ACCESO A AGUA TRATADA, 2000 2007, 2009 Y 2010





GRÁFICO N° 16
PERÚ: PROPORCIÓN DE HOGARES CON ACCESO A AGUA TRATADA, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA Y REGIÓN NATURAL 2007, 2009 Y 2010



Hogares con Saneamiento Básico

El agua segura y el uso de al menos una "unidad básica de saneamiento" para la eliminación de excretas, constituyen elementos esenciales que aseguran la calidad de la salud materno infantil. Se considera que los hogares tienen saneamiento básico cuando poseen servicio higiénico conectado a red pública dentro o fuera de la vivienda, letrina ventilada, pozo séptico o pozo ciego o negro.

La ENDES Continua 2010 revela que a nivel nacional el 85,3 por ciento de los hogares cuentan con saneamiento básico, destacando el incremento de 3,5 puntos porcentuales, en comparación con los resultados de la ENDES 2007 que fue 81,8 por ciento. Asimismo, se incrementó en 1,1 y 6,8 puntos porcentuales en el área urbana y rural, respectivamente.

Según región natural, la ENDES Continua 2010 muestra que en la Costa, el 93,1 por ciento de los hogares cuenta con saneamiento básico; en tanto, que en la Sierra y la Selva más de las tres cuartas partes de los hogares se benefician con este servicio higiénico.

Los resultados de la ENDES Continua 2010 muestran que los hogares, que cuentan con saneamiento básico, ubicados en el quintil superior de riqueza son cerca de dos veces más que en el quintil inferior (100,0 por ciento frente a 58,6 por ciento). Ver Cuadro N° 15A. Anexo I.

A nivel de departamento, la ENDES Continua 2010 refleja que nueve departamentos se encuentran por encima del promedio nacional: Lima (94,2 por ciento), Tacna (93,7 por ciento), Lambayeque (90,2 por ciento), Arequipa (90,1 por ciento), La Libertad (89,8 por ciento), San Martín (89,2 por ciento), Moquegua (89,1 por ciento), Ica (88,7 por ciento) y Cajamarca (85,7 por ciento); mientras los que están por debajo del 85,3 por ciento son: Loreto (60,4 por ciento), Huancavelica (65,4 por ciento) y Pasco con 66,0 por ciento. (Ver Cuadro N° 15A. Anexo I).

GRÁFICO N° 17
PERÚ: PROPORCIÓN DE HOGARES CON SANEAMIENTO BÁSICO, 2000 2007, 2009 Y 2010





GRÁFICO N° 18
PERÚ: PROPORCIÓN DE HOGARES CON SANEAMIENTO BÁSICO, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA Y REGIÓN NATURAL 2007, 2009 Y 2010



Capítulo II

Salud Materno Neonatal

“Reducir en 25,0% el número de mujeres que fallecen durante el embarazo y en 8,0% el de los neonatos fallecidos”

MEF - Líneas de Base de los Programas Estratégicos 2008 - 2009

Capítulo N° 2

Salud Materno Neonatal

Los principales objetivos del Programa Salud Materno Neonatal son: reducir la tasa de mortalidad neonatal por cada mil nacidos vivos e incrementar, en las áreas rurales los nacimientos en centros de salud con personal capacitado. En este capítulo se analiza la tasa de mortalidad neonatal (indicador de resultado) y los indicadores intermedios: control prenatal en el primer trimestre de gestación, parto institucional, tasa global de fecundidad y planificación familiar.

2.1 TASA DE MORTALIDAD NEONATAL


La mortalidad infantil se puede descomponer de acuerdo a la edad en la que ocurre la defunción. La mayor parte de las defunciones durante el primer año de vida tienden a concentrarse en la primera semana o en el primer mes. De esta forma la mortalidad infantil suele dividirse entre neonatal y posneonatal. Si la defunción se produce durante el primer mes de vida se dice que ocurre en la etapa neonatal, mientras que si se produce con posterioridad se dice que se produce en la etapa posneonatal.

Según la ENDES Continua 2010 la tasa de mortalidad neonatal en el país ha descendido en 27,0 por ciento, al pasar de 15,0 a 11,0 defunciones de menores de un mes por cada mil nacidos vivos entre el año 2007 y 2010.

La tasa de mortalidad neonatal urbana fue de 9,0 y la rural de 14,0 defunciones de menores de un mes por mil nacidos vivos. Respecto a las tasas estimadas según la ENDES 2007 (11,0 en el área urbana y 21,0 en el área rural) muestran que el mayor descenso correspondió al área rural.

De acuerdo al lugar de residencia de la madre, los departamentos de Loreto, San Martín y Puno (21, 20 y 18 defunciones de menores de un mes por mil nacidos vivos, respectivamente) fueron los que presentaron las más altas tasas de mortalidad neonatal, en tanto Lima (7), Ica y Lambayeque (9), registraron las más bajas tasas de mortalidad neonatal. (Ver Cuadro N° 18A. Anexo I).

GRÁFICO N° 19
PERÚ: TASA DE MORTALIDAD NEONATAL DE LOS 10 AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA, ENDES 2007, 2009 Y 2010



2.2 CONTROL PRENATAL EN EL PRIMER TRIMESTRE DE GESTACIÓN

El control prenatal se define como todas las acciones y procedimientos destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de los factores que pueden condicionar la morbilidad y mortalidad materna y perinatal; lo que permite identificar riesgos y anomalías durante el embarazo, tanto en la madre como en el feto; quienes no controlan su embarazo tienen cinco veces más posibilidades de tener complicaciones; sin embargo al ser detectadas a tiempo, pueden ser tratadas oportunamente. El Ministerio de Salud - MINSA recomienda que todas las gestantes deban hacerse este control mensualmente hasta las 32 semanas, las siguientes semanas hasta la 36 semana los controles deben ser cada quince días, y de la semana 36 en adelante el control prenatal debe ser hecho semanalmente.

Las estimaciones de la ENDES Continua 2010 revelan una consolidación de la proporción de mujeres gestantes que en su último hijo nacido vivo recibieron su primer control prenatal en el primer trimestre de embarazo, tanto en el área urbana (76,5 por ciento) como en el área rural (66,3 por ciento). A nivel nacional, dicha proporción muestra un incremento respecto a la ENDES 2007 (de 71,3 por ciento a 73,0 por ciento).

Según región natural, entre la ENDES 2007 y la ENDES Continua 2010, en la Selva hubo un incremento de 2,5 puntos porcentuales de mujeres gestantes que recibieron en el primer trimestre su primer control prenatal, (de 63,3 por ciento a 65,8 por ciento). En cambio, en la Costa y en la Sierra el incremento fue de 1,6 y 1,1 puntos porcentuales, respectivamente.


De acuerdo al nivel de educación, según la ENDES Continua 2010 las mujeres gestantes con educación

superior presentan la mayor proporción que recibieron su primer control prenatal en el primer trimestre de gestación (87,1 por ciento), asimismo, muestra un incremento de 5,5 puntos porcentuales, entre los años 2007 y 2010; luego siguen las gestantes con educación secundaria (71,3 por ciento), pero entre las dos encuestas mencionadas presenta una ligera disminución (0,3 punto porcentual).

Igualmente, con respecto a los quintiles de riqueza, las mujeres gestantes que pertenecen al quintil superior y cuarto quintil presentan las mayores proporciones (88,8 por ciento y 80,5 por ciento, respectivamente) y la menor proporción fue en las gestantes del quintil inferior (63,3 por ciento) en la ENDES Continua 2010; sin embargo, al compararlo con la ENDES 2007, los mayores incrementos se dieron en las gestantes del quintil superior y quintil inferior (7,1 y 3,5 puntos porcentuales, respectivamente). (Ver Cuadro N° 34. Anexo II).

A nivel departamental, se observa que en el año 2010, en la mitad de los departamentos la proporción de mujeres gestantes que recibió su primer control prenatal se encuentran por encima del promedio nacional (73,0 por ciento); mientras que los restantes departamentos se encuentran por debajo de dicho promedio. Asimismo, se aprecia que en 17 departamentos las mujeres gestantes que en su último nacimiento recibieron su primer control prenatal en el primer trimestre de embarazo muestran incrementos entre 0,4 y 14,0 puntos porcentuales, siendo Huánuco, Cusco, Amazonas y Pasco, los que presentan los mayores incrementos (14,0, 7,7, 6,4 y 4,4 puntos porcentuales, respectivamente). Mientras que los ocho departamentos restantes presentan disminuciones entre 0,2 y 5,2 puntos porcentuales. (Ver Cuadro N° 34A. Anexo II).

GRÁFICO N° 20
PERÚ: PROPORCIÓN DE GESTANTES QUE EN EL ÚLTIMO NACIMIENTO EN LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA
RECIBIÓ SU PRIMER CONTROL PRE NATAL EN EL 1ER TRIMESTRE DE GESTACIÓN,
SEGÚN CARACTERÍSTICA SELECCIONADA, 2007 Y 2010



2.3 PARTO INSTITUCIONAL

Se denomina parto institucional a aquel parto atendido dentro del servicio de salud por un personal especializado de salud; en el cual se estima hay menos riesgo tanto para la madre como para el recién nacido. A nivel internacional, se estima que dos de los factores relacionados con la muerte o la supervivencia materna, son el lugar de atención del parto y las decisiones de la parturienta y de su familia sobre dónde acudir en caso de una complicación durante el embarazo, el parto o el puerperio.

La maternidad segura es un componente esencial de la salud reproductiva, principalmente porque el embarazo, parto y posparto son causas significativas de discapacidad y muerte de mujeres, que viven en países en vías de desarrollo, en la mayoría de los casos.

Entre la ENDES 2007 y la ENDES Continua 2010, la proporción de partos institucionales se ha incrementado en cinco puntos porcentuales (de 76,0 por ciento a 81,0 por ciento), en el área urbana el incremento es no significativo (de 93,6 a 93,7 por ciento) y en el área rural el incremento fue mucho mayor al pasar de 49,4 por ciento a 58,4 por ciento.


Según región natural, entre la ENDES 2007 y la ENDES Continua 2010, resalta la Sierra con un incremento de 12,6 puntos porcentuales (de 60,3 por ciento a 72,9 por ciento). La Costa, a pesar de mantener una elevada proporción de partos institucionales, disminuye en 1,8 puntos porcentuales al pasar de 96,1 por ciento a 94,3 por ciento.

Con respecto al nivel de educación, la proporción de partos institucionales es mayor en las mujeres con educación superior (97,5 por ciento) y con educación secundaria (89,4 por ciento), y menor en las mujeres sin nivel/primaria (61,0 por ciento); estas últimas registran el mayor incremento (8,1 puntos porcentuales) entre las dos encuestas señaladas. Por quintiles de riqueza, las mayores proporciones de partos institucionales se presentan entre las mujeres del quintil superior (99,0 por ciento) y del cuarto quintil (97,5 por ciento); mientras que las mujeres del quintil inferior tienen la menor proporción (51,2 por ciento), pero en este último quintil se muestra el mayor incremento de partos institucionales entre los años 2007 y 2010 (12,9 puntos porcentuales). (Ver Cuadro N° 25. Anexo II).

A nivel departamental, de acuerdo con la ENDES Continua 2010, en 11 de los 24 departamentos los porcentajes de partos institucionales se encuentra por encima del promedio nacional (81,0 por ciento), destacando Lima (97,5 por ciento), Ica (97,3 por ciento), Apurímac (96,8 por ciento), Arequipa (95,2 por ciento), Tumbes (94,9 por ciento), Moquegua (92,5 por ciento) y Tacna (91,7 por ciento). Con respecto a la ENDES 2007 los departamentos que presentaron mayor incremento en la proporción de partos institucionales fueron: Puno, Ayacucho,

Amazonas y Huánuco (19,5, 16,5, 15,7 y 15,0 puntos porcentuales, respectivamente); mientras que Lima y Tumbes con 0,3 y 0,9 puntos porcentuales, respectivamente, son los departamentos que entre las dos encuestas mencionadas presentan el menor incremento de partos institucionales. Por otro lado, en Loreto, Lambayeque, Junín, Madre de Dios y Ucayali, la proporción de partos institucionales ha disminuido entre 0,7 y 6,8 puntos porcentuales analizados (Ver Cuadro N° 25A. Anexo II).

GRÁFICO N° 21
PERÚ: PROPORCIÓN DE PARTO INSTITUCIONAL DEL ÚLTIMO NACIMIENTO EN LOS 5 AÑOS
ANTES DE LA ENCUESTA, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2007 Y 2010



2.4 TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD (TGF)

La tasa global de fecundidad es el indicador resumen de la fecundidad, llamada también nivel de la fecundidad, indica el número de hijas e hijos por mujer si se mantuvieran las mismas tasas específicas por edad a lo largo de su vida reproductiva y las condiciones de mortalidad no cambiaran, ni se truncara su vida.

La tasa global de fecundidad encontrada por la ENDES Continua 2010 fue de 2,5 hijas e hijos por mujer a nivel nacional, por área urbana y área rural fue de 2,2 y 3,5; respectivamente.


Por región natural de residencia es 3,4 hijas e hijos por mujer para la Selva, 2,8 para la Sierra y 2,4 para el Resto de Costa.

Igualmente como ocurren con otros indicadores la TGF varía según el nivel de educación de la madre, es así que según la ENDES Continua 2010 la tasa global de fecundidad para las mujeres sin instrucción o con educación Primaria es 3,7, para las de educación Secundaria 2,6 y las de educación superior la TGF es 1,7 hijas e hijos por mujer, más baja que el nivel de reemplazo que es 2,1 hijas e hijos por mujer.

También se encuentran diferencias cuando se distribuye a las mujeres en edad fértil (MEF's) por quintil de riqueza, se observa que el quintil inferior tiene una TGF de 4,0 hijas e hijos por mujer, seguido por el segundo quintil (3,3); siendo el cuarto quintil (1,9) y el quintil superior (1,7 hijas e hijos por mujer) las que tienen las TGF's por debajo de la tasa de reemplazo que corresponde a 2,1 hijas e hijos por mujer. (Ver Cuadro N° 19. Anexo II).

A nivel de departamentos, los mayores niveles de la Tasa Global de Fecundidad se presentaron en Loreto (4,3), Apurímac (3,4), Ucayali y Huancavelica (3,3 hijos por mujer cada uno). Contrariamente en los departamentos de Tacna (1,9), Lima (2,0), Arequipa y Lambayeque (2,2 hijos por mujer cada uno) se registran los menores niveles de fecundidad (Ver Cuadro N° 19A. Anexo II).

GRÁFICO N° 22
PERÚ: TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD DE LOS 3 AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA,
SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2007 Y 2010



2.5 PLANIFICACIÓN FAMILIAR

El estudio de la prevalencia de la anticoncepción es de particular importancia, no solo porque es el determinante próximo más importante de la fecundidad, sino por la utilización práctica que pueden hacer de esta información los administradores de los programas de planificación familiar y los responsables de la formulación de políticas de población y salud. El adecuado conocimiento del nivel de uso y de los tipos de métodos empleados permite evaluar también la efectividad de los programas desarrollados en el pasado

reciente y posibilita la identificación de los grupos con limitado acceso a los servicios de orientación, comercialización o distribución. Uno de los objetivos de la ENDES fue determinar el nivel de conocimiento de métodos anticonceptivos, pues es una condición necesaria para su uso. En este sentido, conocer un método, no significa necesariamente que la mujer tenga un buen nivel de información sobre el método; basta con que por lo menos lo conozca de nombre o tenga una idea de cómo se emplea.

2.5.1 Conocimiento de Métodos Anticonceptivos entre las Mujeres en Edad Fértil


El conocimiento de métodos para la regulación de la reproducción es muy amplio entre la población peruana. Casi todas las mujeres en edad fértil (99,6 por ciento) conocen o han oído hablar de algún método de planificación familiar, casi similar al encontrado en la ENDES 2007 (99,2 por ciento). En el área urbana el nivel de conocimiento es similar entre ambas encuestas (99,9 por ciento), incrementándose en 1,1 puntos porcentuales en el área rural (de 97,5 por ciento a 98,6 por ciento).

Según región natural, el conocimiento de métodos de planificación familiar entre los años 2007 y 2010 es superior al 98,0 por ciento, sin embargo, en la Costa y la Selva se presenta una ligera disminución (0,1 punto porcentual), en tanto, que en la Sierra se incrementa en 0,9 punto porcentual.

En cuanto al nivel de educación, entre las mujeres sin nivel/primaria y con educación secundaria, el nivel de conocimientos de algún método de planificación familiar muestra un ligero incremento de 0,9 y 0,1 punto porcentual entre la ENDES 2007 y la ENDES 2010. Con respecto, a los quintiles de riqueza, el nivel de conocimientos aumenta en 1,8 y 0,3 punto porcentual entre las mujeres ubicadas en el quintil inferior y segundo quintil, respectivamente. (Ver Cuadro N° 20. Anexo II).

Según departamento, en la ENDES 2010, se observa que el conocimiento de algún método de planificación familiar entre las mujeres en edad fértil es alto (98,0 por ciento y más); sin embargo, al compararlo con la ENDES 2007, se aprecia que en la mayoría de ellos, se presenta un incremento entre 0,1 y 1,8 puntos porcentuales; a excepción de Amazonas, Cajamarca, La Libertad, Loreto, San Martín y Ucayali que muestran una ligera disminución (Ver Cuadro N° 20A. Anexo II).

GRÁFICO N° 23
PERÚ: PROPORCIÓN DE MUJERES EN EDAD FÉRTIL QUE CONOCE ALGÚN MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2007 Y 2010



2.5.2 Mujeres en Unión que usa algún Método de Planificación Familiar

Se observa que el uso de métodos de anticoncepción fue alto en el país, mostrándose un incremento de 1,3 puntos porcentuales (de 73,1 por ciento a 74,4 por ciento entre el periodo 2007 y 2010). Similar comportamiento se aprecia en el área urbana (de 73,8 por ciento a 75,2 por ciento) y rural (de 71,8 por ciento a 72,4 por ciento) entre las dos encuestas mencionadas.


Por región natural, más del 70,0 por ciento de las mujeres unidas usa algún método de planificación familiar en el año 2010, comparado con el 2007, el incremento mayor se dio en la Selva (3,8 puntos porcentuales) y en la Sierra disminuye ligeramente (0,2 punto porcentual).

Según el nivel de educación, la ENDES 2010 revela que el uso de algún método de planificación familiar entre las mujeres unidas se ha incrementado en todos los niveles educativos, siendo mayor en las mujeres con educación superior (2,8 puntos porcentuales) con respecto a la ENDES 2007. Por quintiles de riqueza, EN EL 2010 el mayor uso de métodos de planificación familiar se da en las mujeres del quintil intermedio (76,3

por ciento) y quintil superior (75,6 por ciento), sin embargo, al compararlo con la ENDES 2007, las mujeres que pertenecen al quintil superior muestran el mayor incremento (7,4 puntos porcentuales) a diferencia de las mujeres del segundo quintil de riqueza que disminuye en dos puntos porcentuales (de 77,3 por ciento en el 2007 a 75,3 por ciento en el 2010). (Ver Cuadro N° 21. Anexo II).

A nivel departamental, en el año 2010 en 12 departamentos el uso actual de algún método de planificación familiar en las mujeres unidas es igual o superior al promedio nacional (74,4 por ciento), destacando Áncash (80,1 por ciento), Cajamarca (79,4 por ciento), Ica (79,0 por ciento), Moquegua (78,7 por ciento), Tumbes (78,2 por ciento) y Amazonas (77,9 por ciento) con las mayores proporciones. Con relación al año 2007, Áncash, Cajamarca y Huancavelica con 8,7; 6,9 y 5,9 puntos porcentuales, respectivamente, son los departamentos donde se dan los mayores incrementos; mientras que ocho departamentos muestran disminuciones en un rango que se encuentra entre 0,3 y 6,4 puntos porcentuales (Ver Cuadro N° 21A. Anexo II).

GRÁFICO N° 24
PERÚ: PROPORCIÓN DE MUJERES EN UNIÓN QUE USA ALGÚN MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2007 Y 2010



2.5.3 Mujeres en Unión que usa algún Método Moderno de Planificación Familiar

De acuerdo a la ENDES Continua 2010, el 50,5 por ciento de las mujeres unidas usa algún método moderno de planificación familiar, siendo mayor en 2,7 puntos porcentuales con respecto a la ENDES 2007, que fue de 47,8 por ciento. Similar comportamiento se observa en el área rural y urbana donde el incremento fue de 3,5 y 1,7 puntos porcentuales, respectivamente.


Según región natural, el uso de métodos modernos en la Costa (56,6 por ciento) es superior al promedio nacional (50,5 por ciento); mientras que en la Sierra y la Selva las proporciones se encuentran por debajo del promedio nacional. Sin embargo, es en la Sierra donde se aprecia el mayor incremento en el uso de métodos modernos, de 39,4 por ciento paso a 43,0 por ciento, entre los años 2007 y 2010, en la Selva disminuyó en dos puntos porcentuales.

Por nivel de educación, las mujeres unidas con educación superior y secundaria presentan las mayores proporciones de uso de algún método moderno de planificación familiar en el 2010 (57,0 por ciento y 52,3

por ciento respectivamente), entre el 2007 y 2010 las mujeres con educación superior y sin nivel/primaria muestran los mayores incrementos (5,8 y 4,4 puntos porcentuales, respectivamente). Con respecto a los quintiles de riqueza, las mujeres unidas del quintil superior tienen la mayor proporción de uso de métodos modernos (57,4 por ciento) en el año 2010 y asimismo, muestran el mayor incremento en relación al año 2007 (6,9 puntos porcentuales). (Ver Cuadro N° 22. Anexo II).

En la ENDES 2010, se observa que en ocho departamentos la proporción de uso de algún método moderno de planificación familiar en las mujeres unidas es mayor al 51,0 por ciento; mientras que Puno (24,7 por ciento) y Huancavelica (37,5 por ciento) presentan la menor proporción de usuarias de métodos modernos. Por otro lado, al comparar con la ENDES 2007, se observa que los mayores incrementos en el uso de métodos modernos se dan en Áncash, Moquegua, Loreto y La Libertad (7,7; 5,8 y 5,6 y 5,5 puntos porcentuales, respectivamente). (Ver Cuadro N° 22A. Anexo II).

GRÁFICO N° 25
PERÚ: PROPORCIÓN DE MUJERES EN UNIÓN QUE USA ALGÚN MÉTODO MODERNO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2007 Y 2010



2.5.4 MUJERES EN UNIÓN QUE USA ALGÚN MÉTODO TRADICIONAL DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR

Los resultados de la ENDES 2010 muestran que cerca de la cuarta parte de las mujeres en unión (23,9 por ciento) usan algún método tradicional de planificación familiar, habiendo disminuido en 1,4 puntos porcentuales comparado con la ENDES 2007. Similar comportamiento se aprecia en el área rural y urbana donde descendió en 2,9 y 0,3 puntos porcentuales, respectivamente.


Por región natural, en la Sierra el uso de algún método tradicional representa el 30,0 por ciento pero disminuye en 3,9 puntos porcentuales entre los años 2007 y 2010. Diferente comportamiento se aprecia en la Selva donde sólo el 23,3 por ciento de las mujeres en unión hace uso de algún método tradicional, pero entre el 2007 y 2010 es la región con el mayor incremento (5,8 puntos porcentuales).

Según el nivel de educación, en el año 2010, las mujeres unidas sin nivel/primaria tienen la mayor proporción de uso de algún método tradicional (28,1 por ciento) y las mujeres con educación superior registran la menor proporción (19,6 por ciento); sin embargo, dichos valores son menores a los encontrados en la ENDES 2007. Diferente comportamiento se observa en las mujeres

unidas con educación secundaria (22,7 por ciento) que registran un incremento de 2,3 puntos porcentuales entre los años mencionados. Por quintil de riqueza, las mujeres unidas del quintil inferior y del segundo quintil presentan las mayores proporciones que hacen uso de algún método tradicional de planificación familiar (28,2 por ciento, cada uno); asimismo, registran las mayores disminuciones (4,7 y 3,8 puntos porcentuales, respectivamente) entre la ENDES 2007 y la ENDES 2010. (Ver Cuadro N° 23. Anexo II).

A nivel departamental, en la ENDES Continua 2010, Puno (47,8 por ciento), Amazonas y Huancavelica (33,1 por ciento, cada uno), Cajamarca (31,8 por ciento) y Áncash (30,6 por ciento) muestran las mayores proporciones de mujeres en unión que usan un método tradicional de planificación familiar; en cambio, Tumbes (10,5 por ciento), Piura (16,4 por ciento) y Huánuco (16,6 por ciento) presentan las mayores proporciones. En comparación con la ENDES 2007, la mayoría de los departamentos muestran incrementos entre 0,2 y 8,0 puntos porcentuales, a excepción de Loreto, Lambayeque, Moquegua, Piura, La Libertad y Ayacucho cuyas disminuciones se encuentran entre 1,7 y 6,4 puntos porcentuales. (Ver Cuadro N° 23A. Anexo II).

GRÁFICO N° 26
PERÚ: PROPORCIÓN DE MUJERES EN UNIÓN QUE USA ALGÚN MÉTODO TRADICIONAL DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2007 Y 2010



Capítulo III

Acceso de la Población a la Identidad

“Es necesario que el 100,0% de los adultos cuenten con su documento de identidad y que los niños sean registrados al nacer”

MEF - Líneas de Base de los Programas Estratégicos 2008 - 2009

Capítulo N° 3

Acceso de la Población a la Identidad

3.1 NIÑAS Y NIÑOS SIN INSCRIPCIÓN EN LA MUNICIPALIDAD Y/O RENIEC

Los documentos básicos de identidad que contribuyen a la identificación y al ejercicio de la ciudadanía de los peruanos son el Documento Nacional de Identidad (DNI) y la Partida de Nacimiento. La carencia de estos documentos hace invisible a la persona y no le permite la existencia legal ante el estado.


Según la ENDES Continua 2010, el 7,2 por ciento de niñas y niños de 6 a 59 meses de edad no están inscritos en la Municipalidad/ Oficina Registral del Reniec. La tendencia de la población no inscrita refleja un mayor porcentaje, en el área rural (9,2 por ciento) que en el área urbana (6,0 por ciento).

En comparación con la ENDES 2007, a pesar de los avances, a nivel nacional se ha incrementado (1,4 puntos porcentuales) la incidencia de la indocumentación de las niñas y niños no inscritos; asimismo, en el área rural, aumenta en 2,7 puntos porcentuales (al pasar de 6,5 por ciento a 9,2 por ciento), y en el área urbana en 0,7 punto porcentual (al pasar de 5,3 por ciento a 6,0 por ciento).

A nivel de región natural, en la Selva el 18,1 por ciento de niñas y niños de 6 a 59 meses de edad no tienen existencia legal; porcentaje que contrasta con la observada en la región de la Costa (5,6 por ciento) y la Sierra (4,6 por ciento). Al comparar con el año 2007, el porcentaje de niñas y niños no registrados disminuyó en la Sierra (al pasar de 4,7 por ciento a 4,6 por ciento) y en la Selva (al pasar de 18,7 por ciento a 18,1 por ciento); en tanto, en la Costa creció (al pasar 2,8 a 5,6 por ciento).

GRÁFICO N° 27


PERÚ: PROPORCIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 59 MESES DE EDAD QUE NO ESTÁN INSCRITOS EN LA MUNICIPALIDAD / OFICINA REGISTRAL DEL RENIEC, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA 2007, 2009 Y 2010



Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2007, 2009 y 2010.

GRÁFICO N° 28

PERÚ: PROPORCIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 59 MESES DE EDAD QUE NO ESTÁN INSCRITOS EN LA MUNICIPALIDAD / OFICINA REGISTRAL DEL RENIEC, SEGÚN REGIÓN NATURAL 2007, 2009 Y 2010



Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2007, 2009 y 2010.

Respecto a la población que no está inscrita, se muestra que la mayor proporción de niñas y niños son de madres que no tienen educación o solo alcanzaron educación primaria (10,6 por ciento), y se ubican en el quintil inferior de riqueza (12,8 por ciento). En comparación con la ENDES 2007, el porcentaje de niñas y niños que pertenecen al quintil inferior se incrementa en 3,3 puntos porcentuales, y en las madres sin educación/primaria en 1,2 puntos porcentuales. (Ver Cuadro N° 36. Anexo III).

Por otro lado, se presenta una mayor proporción de niñas y niños de 6 a 59 meses de edad que no están inscritos en la Municipalidad/Oficina Registral del RENIEC en los departamentos de Loreto (37,1 por ciento), Ucayali (30,9 por ciento), Madre de Dios (7,7 por ciento), Huánuco (7,5 por ciento) y Pasco (7,2 por ciento); siendo los de menor porcentaje Apurímac (2,3 por ciento), Moquegua y Puno, 2,7 por ciento, en cada caso. (Ver Cuadro N° 36A. Anexo III).

- **Ficha Técnica de la Encuesta**
- **Glosario de Términos**

Ficha Técnica de la Encuesta

OBJETIVO

Proveer de información actualizada sobre la dinámica demográfica y el estado de salud de las madres y niños menores de 5 años, que permita la estimación de los indicadores identificados de los Programas Estratégicos en el marco de la Estrategia Nacional de Presupuesto por Resultado; así como también la evaluación y formulación de los programas de población y salud familiar en el país.

POBLACIÓN BAJO ESTUDIO

La ENDES 2010 tiene como población objetivo:

- Los hogares particulares y sus miembros, incluyendo las visitas que pernoctaron la noche anterior al día de la entrevista en la vivienda.
- Todas las mujeres en Edad Fértil de 15 a 49 años de edad; y,
- Los niños menores de 5 años.

DISEÑO MUESTRAL

Tipo de Muestra: La muestra de la ENDES 2010 es una Sub Muestra de la Muestra Maestra seleccionada para el periodo 2009 - 2011, la misma que es probabilística, de áreas, estratificada, bietápica e independiente en cada departamento.

Marco Muestral: El marco de la ENDES es un Marco Maestro de áreas que fue elaborado con información de los Censos Nacionales de Población y Vivienda del 2007.

Unidades de Muestreo:

- **En el Área Urbana:** Las Unidades de Muestreo son: El Conglomerado y la Vivienda Particular
- **En el Área Rural:** Las Unidades de Muestreo son: El Área de Empadronamiento Rural y la Vivienda Particular.

Tamaño de la Muestra: Teniendo como objetivo básico proveer los indicadores solicitados por la Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco de la implementación de la Estrategia Nacional de Presupuesto por Resultado, el tamaño de la Muestra Maestra es 2 mil 264 conglomerados para un horizonte de tres años, a razón de una muestra anual de 1 mil 132 conglomerados que incluye una Muestra Panel de 566 Conglomerados, cuyo detalle se presenta a continuación:

CUADRO N° 01

PERÚ: TAMAÑO DE LA MUESTRA MAESTRA Y MUESTRA ANUAL DE CONGLOMERADOS Y VIVIENDAS POR DEPARTAMENTO, 2009-2011

Departamento	Muestra Maestra 2009 - 2011		Tamaño de la Muestra Anual		Número esperado de niños Menores de 5 años/2	Coeficiente de Variación %	Número de niños Menores de 5 años- ENDES 2000
	Conglomerados1/	Viviendas	Conglomerados1/	Vivienda			
Total	2 264	82 728	1 132	27 576	9 703		11 585
Amazonas	80	3 468	40	1 156	454	7,8	541
Áncash	104	3 588	52	1 196	452	9,2	449
Apurímac	72	3 300	36	1 100	432	7,2	602
Arequipa	88	3 348	44	1 116	248	30,4	302
Ayacucho	88	3 912	44	1 304	473	9,0	670
Cajamarca	88	3 288	44	1 096	421	8,7	416
Cusco	80	3 264	40	1 088	453	6,2	486
Huancavelica	72	2 832	36	944	419	4,5	641
Huánuco	80	3 036	40	1 012	452	7,8	561
Ica	96	3 264	48	1 088	320	14,9	331
Junín	88	3 300	44	1 100	418	8,1	438
La Libertad	88	3 312	44	1 104	380	9,1	433
Lambayeque	80	2 712	40	904	334	11,5	369
Lima	312	7 884	156	2 628	719	12,3	1 016
Loreto	80	2 664	40	888	486	7,2	614
Madre De Dios	88	3 588	44	1 196	407	15,7	482
Moquegua	80	3 300	40	1 100	181	24,4	226
Pasco	88	3 588	44	1 196	421	10,7	458
Piura	88	3 336	44	1 112	470	9,9	503
Puno	88	4 344	44	1 448	446	9,2	593
San Martín	88	2 976	44	992	365	12,2	402
Tacna	80	2 784	40	928	210	26,4	241
Tumbes	80	2 796	40	932	335	12,8	365
Ucayali	88	2 844	44	948	407	12,4	446

1/ El número de conglomerados para la muestra anual se describe en el cuadro 02, en la cual se presenta las submuestras de conglomerados panel A y C y no panel B y D.
2/ El número estimado de niños menores de 5 años para la muestra anual de la ENDES CONTINUA 2009-2011.

CUADRO N° 02

PERÚ: DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA MAESTRA Y LA MUESTRA PANEL, 2009-2011

Distribución de los conglomerados, Perú 2009 - 2011

Tamaño de la submuestra		Submuestras de conglomerados anual		
		2009	2010	2011
A	566	A		
B	566	B		
A	566		A	
C	566		C	
D	566			D
C	566			C
Número de conglomerados por año		1 132	1 132	1 132

Niveles de Inferencia:

Muestra Semestral: 50 por ciento de la Muestra

- Nacional, urbano y rural
- Regiones Naturales: Costa, Sierra y Selva
- Lima Metropolitana.

Muestra Anual: 100 por ciento de la Muestra

- Nacional, urbano y rural
- Regiones Naturales: Costa, Sierra y Selva
- Lima Metropolitana
- Cada uno de los 24 departamentos del país

TEMAS INVESTIGADOS:

En el Cuestionario del Hogar

A. Tipo y características básicas del hogar y sus integrantes

- Listado y relación de parentesco con el Jefe del Hogar.
- Edad, sexo, supervivencia y residencia de los padres de los menores de 15 años, integrantes del hogar.
- Nivel y asistencia escolar, condición de actividad y tenencia de seguro de salud, acceso al SIS; traumatismos y enfermedades crónicas.
- Medidas antropométricas de los menores de 5 años y MEF (Mujeres en edad fértil de 15 a 49

años de edad): Peso, Talla y Prueba de Hemoglobina.

- Medición de la Presión Arterial a las MEF y personas de 50 años o más, integrantes del hogar.

B. Características de la vivienda

- Servicios básicos: Agua, desagüe, luz y combustible utilizado para cocinar.
- Material predominante en la construcción de la vivienda: Paredes, piso y techo.
- Total de cuartos de la vivienda y de habitación usadas para dormir.
- Tenencia de electrodomésticos, ganado, parcelas y uso de la tierra.
- Otros: Tenencia de combustibles y productos químicos en el hogar.

En el Cuestionario Individual

- Antecedentes de la entrevistada
- Reproducción
- Anticoncepción
- Embarazo, parto, puerperio y lactancia
- Inmunización y salud
- Nupcialidad
- Preferencias de fecundidad
- Antecedentes del cónyuge y trabajo de la mujer
- El SIDA y enfermedades transmitidas sexualmente (ETS)
- Mortalidad materna
- Violencia familiar

Glosario de Términos

1. Agua tratada

Es el porcentaje de hogares que tienen acceso a agua segura; entendiéndose como tal, el agua que proviene de la red pública o de aquella que no proviene de la red pública pero que le dan tratamiento al agua antes de beberla; tales como: La hierven, clorifican, desinfectan solarmente o consumen agua embotellada.

2. Anemia

La anemia es una condición en la cual la sangre carece de suficiente glóbulos rojos, o la concentración de hemoglobina es menor que los valores de referencia según edad, sexo y altitud. La hemoglobina es un conglomerado de proteína que contiene hierro, se produce en los glóbulos rojos de los seres humanos y su carencia indica, en principio, que existe una deficiencia de hierro.

3. Bajo Peso al Nacer

Es el porcentaje de niños menores de cinco años que independientemente de su edad gestacional pesaron menos de 2,500 gramos al momento de su nacimiento.

4. Coeficiente de variación

Es una medida estadística que relaciona la desviación estándar con la media estimada en una muestra de una población determinada; y, cuyo cociente expresa el nivel o grado de homogeneidad de los valores materia de estimación en la muestra y es indicativo del nivel de precisión de la estimación obtenida.

5. Controles de Crecimiento y Desarrollo (CRED)

Es el porcentaje de niños menores de 36 meses que han recibido el número de Controles de Crecimiento y Desarrollo recomendados para su edad.

6. Controles prenatales

El control prenatal es el conjunto de acciones y procedimientos sistemáticos y periódicos, destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de los factores que puedan condicionar morbilidad materna y perinatal.

7. Demanda insatisfecha de planificación familiar

Es el porcentaje de mujeres unidas que desean limitar o espaciar sus familias y no están usando método anticonceptivo alguno.

8. Desnutrición Crónica

Es el porcentaje de niños menores de cinco años cuya Talla respecto a la Edad, está dos desviaciones estándar por debajo de la mediana del Patrón de Crecimiento Internacional tomado como Población de Referencia.

9. Enfermedad Diarreica aguda (EDA)

Se define como diarrea a la presencia de tres o más deposiciones sueltas o líquidas en un periodo de 24 horas. Si un episodio de diarrea dura menos de 14 días, se trata de diarrea aguda. Si dura 14 días o más, se la denomina persistente, que es la que suele causar problemas nutricionales y puede producir la muerte de los niños y niñas con diarrea.

10. Índice de Bienestar

Es un índice compuesto que otorga un nivel socioeconómico al Hogar a partir de las características de la vivienda y la disponibilidad de ciertos bienes de consumo duradero, el cual por extensión se asigna a los integrantes del hogar.

11. Infección Respiratoria aguda (IRA)

Las Infecciones Respiratorias Agudas son un complejo y heterogéneo grupo de infecciones causadas por distintos gérmenes, que afectan cualquier parte del aparato respiratorio.

12. Intervalo de Confianza

El intervalo de confianza es un rango de valores (calculado en una muestra) dentro del cual se encuentra el verdadero valor del parámetro, con una probabilidad determinada.

13. Lactancia Materna Exclusiva

Es la alimentación del lactante con leche materna de la madre o de otra mujer, sin ningún suplemento sólido o líquido, incluyendo el agua.

14. Métodos Anticonceptivos Modernos

Son aquellos métodos capaces de evitar un embarazo y son altamente efectivos cuando se usan de manera correcta. Son seguros y no producen efectos secundarios considerables; la mayoría no interfiere con el placer sexual e involucran a la pareja (mujer y hombre) en el mejoramiento de su salud sexual y reproductiva. Además están disponibles en farmacias o centros de salud y hospitales públicos y privados. Están constituidos por los métodos hormonales, de barrera, dispositivos intrauterinos, implantes y métodos quirúrgicos.

15. Métodos Anticonceptivos Tradicionales

Son aquellos métodos que no requieren de ningún aparato, sustancia química o procedimiento quirúrgico para lograr evitar el embarazo; se rigen por la naturaleza del cuerpo y por el reconocimiento de la pareja del periodo fértil. Cuando la mujer se encuentra en periodo fértil, la pareja se abstiene de tener relaciones sexuales. Entre estos métodos figuran la abstinencia periódica, el retiro y los folklóricos: Lavado con vinagre, lavado con limón, bebiendo agua de piripiri, etc.

16. Partos institucionales del último nacimiento

Es el porcentaje de mujeres cuyo último hijo nacido vivo en los cinco años anteriores a la encuesta ocurrió en un establecimiento de salud y que fue atendido por un Médico, obstetra y/o enfermera.

17. Planificación familiar

Es el porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad que conoce algún método de planificación familiar; ya sea un método moderno o un método tradicional.

18. Presupuesto por Resultado

Es un esquema presupuestario que integra la programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto, en una visión de logro de resultados a favor de la población, retroalimentando los procesos anuales para la reasignación, reprogramación y ajustes de las intervenciones.

19. Programa Estratégico Acceso de la Población a la Identidad

Este Programa Estratégico tiene por finalidad reducir la proporción de peruanos cuyo nacimiento no está registrado y como tal no tienen Documento Nacional de Identidad (DNI). Estar indocumentado hace invisible a la persona y no le permite la existencia legal ante el Estado. Por esta razón, no son considerados en los programas sociales, ni favorecidos por los beneficios sociales que ofrece el Estado, restringiéndose su desarrollo personal y el ejercicio de su ciudadanía.

20. Programa Estratégico Articulado Nutricional

Este Programa Estratégico tiene por finalidad reducir la Desnutrición Crónica en niños menores de cinco años, mejorando la alimentación y nutrición del menor de 36 meses, reduciendo la morbilidad en IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes; además, busca reducir la incidencia de bajo peso al nacer.

21. Programa Estratégico Salud Materno Neonatal

El Programa Salud Materno Neonatal busca reducir la Mortalidad Materna y Neonatal, para ello propone dar atención universal a los niños y adolescentes y poner a disposición servicios de planificación familiar, ofrecer atención prenatal de calidad, identificando factores de riesgo, asegurar la atención del parto y del recién nacido por personal calificado; y, fortalecer los servicios de atención obstétrica básica.

22. Programas Estratégicos

Son intervenciones articuladas del Estado, entre sectores y por niveles de gobierno, en torno a la resolución de un problema central que aqueja a la población de un país. Los programas estratégicos, constituyen el elemento fundamental de gestión del presupuesto por resultado; en tal sentido, responden a un modelo causal para lograr resultados, cuyos niveles guardan una relación lógica de medios-fines, a partir de los insumos, subproductos, productos, resultados intermedios y finales asociados con el conjunto de intervenciones que lo constituyen.

23. Quintil de Riqueza

Es la distribución de los Hogares en cinco partes iguales teniendo como unidad de ordenamiento el valor del

Índice de bienestar que éstos alcanzaron, dando lugar a la especificación de un punto de corte para cada uno de ellos.

24. Saneamiento básico

Es el porcentaje de hogares que tienen acceso como mínimo a un pozo ciego o negro para la disposición de sus excretas.

25. Suplemento de hierro de 6 a menos de 36 meses

Es el porcentaje de niños de 6 a menos de 36 meses que han recibido suplemento de hierro con el objetivo de asegurar el suministro adecuado de este nutriente en la dieta de los niños, con el propósito de prevenir y disminuir la prevalencia de anemia.

26. Suplemento de hierro en el último nacimiento

Es el porcentaje de mujeres que en la gestación de su último hijo nacido vivo en los cinco años anteriores a la encuesta recibieron hierro en pastilla, jarabe o inyección.

27. Tasa de Mortalidad Infantil de los cinco años anteriores a la encuesta

Es el número de nacidos vivos que fallece antes de cumplir el primer año de vida por cada mil nacidos vivos. En este caso, la tasa tiene como periodo de referencia las defunciones de menores de 12 meses ocurridas en los últimos cinco años, teniendo como denominador el total de nacidos vivos en ese mismo periodo.

28. Tasa de Mortalidad Neonatal de los diez años anteriores a la encuesta

Es el número de nacidos vivos que fallece antes de cumplir el primer mes de vida por cada mil nacidos vivos. En este caso, la tasa tiene como periodo de referencia las defunciones de menores de 28 días ocurridos en los últimos diez años, teniendo como denominador el total de nacidos vivos en ese mismo periodo.


29. Tasa Global de Fecundidad de los tres años anteriores a la encuesta

Es el número promedio de hijos que una mujer habría tenido al final de sus años reproductivos si la misma se hubiera ajustado a las tasas de fecundidad por edad específica durante cada año de su vida reproductiva; teniendo de base la experiencia reproductiva de las mujeres en edad fértil en los tres años anteriores a la encuesta.

30. Vacunas Básicas completas para su edad

La vacuna es un preparado de antígenos que una vez dentro del organismo provoca la producción de anticuerpos y con ello una respuesta de defensa ante microorganismos patógenos. Las vacunas son una manera sencilla de evitar que los niños se contagien algunas enfermedades que pueden tener, en algunos casos, complicaciones graves (tétanos, poliomielitis, sarampión, etc.). Para lograr una protección suficiente y prolongada es necesario aplicar todas las dosis de vacunas que recomienda el calendario de vacunación vigente, el mismo que es normado y aprobado por el Ministerio de Salud.

Anexo N° 1
Artículo Nutricional



CUADRO N° 01: PROPORCIÓN DE MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO Y CARACTERÍSTICAS, 2000, 2007, 2009 Y 2010
(Patrón de referencia NCHS)

Ámbito geográfico / Características	2000			2007 al			2009			2010			
	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Intervalo de confianza al 95%	C.V.	Casos sin Ponderar	
										Inferior	Superior		
Total	25,4	2,4	11 585	22,6	5,6	2 509	18,3	3,4	9 757	16,7	19,1	3,4	9 189
Área de residencia													
Urbana	13,4	5,4	5 280	11,8	10,0	1 141	9,9	5,6	5 306	9,0	11,3	5,9	4 944
Rural	40,2	2,4	6 305	36,9	5,8	1 368	32,8	3,9	4 451	29,0	33,6	3,7	4 245
Región natural													
Costa													
Lima Metropolitana	11,9	7,3	3 261	9,4	18,0	657	6,5	9,2	2 855	6,9	9,8	8,7	2 812
Resto Costa	7,3	13,9	824	8,6	28,1	152	4,8	17,0	628	4,3	8,4	16,6	591
Sierra	16,4	8,3	2 437	10,4	22,7	505	8,3	10,7	2 227	8,4	12,3	9,6	2 221
Sierra urbana	38,6	2,8	5 393	34,6	6,0	1 166	30,1	3,7	4 052	27,6	25,5	29,7	3 863
Sierra rural	20,9	8,0	1 406	21,0	9,7	304	16,9	8,0	1 394	14,3	11,9	8,7	1 350
Selva	45,2	2,8	3 987	40,6	6,7	862	37,9	3,9	2 658	35,8	32,9	38,6	4,1
Selva urbana	30,2	3,8	2 931	25,5	9,0	686	22,2	5,8	2 850	19,0	24,5	6,4	2 514
Selva rural	21,6	8,0	1 170	18,5	17,1	306	16,1	8,7	1 387	17,7	14,5	20,9	1 193
Edad	35,1	4,1	1 761	30,8	10,1	380	28,0	7,2	1 463	21,0	29,4	8,5	1 321
Menores de 36 meses	21,7	3,1	6 735	19,8	7,2	1 485	16,5	4,1	5 627	15,5	18,2	4,1	5 354
De 36 a 59 meses	30,6	2,9	4 850	26,2	7,3	1 024	20,9	4,2	4 130	17,7	21,1	4,4	3 835
Nivel de educación 1/													
Sin educación/Primaria	39,7	2,3	6 222	38,5	5,4	1 110	32,2	3,7	3 883	30,3	34,7	3,4	3 576
Secundaria	15,0	5,0	3 786	14,5	10,1	886	13,1	5,4	3 882	11,4	10,1	12,7	3 642
Superior	6,9	10,6	1 577	6,2	25,6	417	5,7	12,2	1 665	6,2	4,6	13,2	1 619
Tratamiento del agua													
Con Cloro residual 2/	7,5	9,4	1 467	n.d.	n.d.	n.d.	5,8	14,9	1 133	5,6	3,9	15,0	1 054
La Hlevn	31,3	3,1	3 032	n.d.	n.d.	n.d.	19,3	4,2	5 838	19,0	17,5	20,4	5 647
Red Pública	28,9	6,9	918	n.d.	n.d.	n.d.	17,5	4,8	4 385	17,5	16,0	19,1	4 319
Otra fuente	32,4	3,7	2 114	n.d.	n.d.	n.d.	24,4	8,1	1 453	23,5	20,2	26,8	1 328
Otro tratamiento	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	(41,3)	25,6	34	(11,2)	1,5	20,9	33
Consumen agua embotellada	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	9,7	30,2	164	12,2	2,5	40,6	186
Sin tratamiento	42,4	3,3	2 536	n.d.	n.d.	n.d.	26,2	5,2	2 588	25,3	22,6	5,4	2 269
Quintil de riqueza													
Quintil inferior	47,0	2,5	4 102	39,6	6,2	872	37,1	4,1	3 030	33,3	38,6	3,8	2 930
Segundo quintil	30,6	3,4	3 028	32,6	7,7	710	23,3	4,6	2 707	19,2	23,4	5,0	2 341
Quintil intermedio	16,8	6,6	2 183	11,3	16,3	472	9,7	9,3	2 041	11,6	9,7	13,6	1 971
Cuarto quintil	7,2	12,0	1 451	6,9	26,0	260	5,8	13,2	1 252	5,1	3,5	15,5	1 267
Quintil superior	4,5	21,3	821	4,2	40,9	195	2,3	27,3	727	1,4	4,4	26,8	680
Ámbito JUNTOS	49,1	2,5	3 066	42,1	3,7	2 909	38,7	4,1	2 284	34,7	41,3	4,4	2 021

Nota: Los Estimados con Coeficiente de Variación (C.V.) mayor a 15,0% deben ser considerados como referenciales.

a/ La estimación de cobertura nacional son realizadas con los datos captados en el año 2007; y la estimación del ámbito JUNTOS (638 distritos) son realizadas con información captada en el período 2005-2007, 1er. trimestre 2008 y la ampliación muestral.

1/ La estimación excluye los menores cuyas madres no residen en la vivienda.

2/ Cloro residual libre $\geq 0,5$ mg/l de agua según Decreto Supremo N° 031-2010-SA.

Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2007, 2009 y 2010.

CUADRO Nº 01A: PROPORCIÓN DE MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2000, JUNIO 2007 Y 2010
(Patrón de referencia NCHS)

Departamento	2000			Junio 2007 a/			2009-2010 b/			
	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	
							Intervalo de confianza al 95%			
						Inferior	Superior			
Total	25,4	2,5	11 585	22,6	5,6	2 509	16,7	19,1	3,4	9 189
Amazonas	36,0	7,5	541	28,9	11,7	363	16,7	23,9	9,0	912
Áncash	34,5	10,2	449	30,6	13,0	369	20,0	27,4	8,0	791
Apurímac	43,0	6,2	602	34,3	9,5	351	26,3	35,5	7,5	711
Arequipa	12,3	31,2	302	7,9	40,6	357	5,4	11,0	17,6	521
Ayacucho	33,6	8,0	670	36,8	10,3	396	26,2	34,4	6,9	889
Cajamarca	42,8	9,3	416	37,3	8,7	372	27,3	36,7	7,5	839
Cusco	43,2	6,2	486	31,9	15,4	271	23,8	34,3	9,2	670
Huancavelica	53,4	3,7	641	52,2	6,6	412	38,4	50,9	7,2	711
Huánuco	42,8	7,3	561	41,5	9,8	346	26,3	35,8	7,8	790
Ica	12,1	14,9	331	9,0	15,1	384	7,6	10,3	17,7	681
Junín	31,3	8,4	438	26,2	13,3	261	20,2	29,6	9,6	749
La Libertad	27,9	9,0	433	26,4	15,3	345	13,8	24,7	14,4	755
Lambayeque	23,6	12,5	369	15,6	16,9	403	6,0	20,0	27,4	544
Lima	8,3	11,7	1 016	9,3	14,4	462	4,8	7,5	11,0	1 385
Loreto	32,4	6,8	614	24,5	9,3	535	20,2	29,6	9,6	1 155
Madre de Dios	18,7	15,3	482	9,2	14,8	587	6,0	9,5	11,7	886
Moquegua	9,3	21,5	226	6,4	32,9	269	2,7	6,8	22,2	557
Pasco	26,4	10,9	458	30,9	8,3	424	20,7	29,1	8,5	824
Piura	24,1	10,3	503	22,9	12,4	441	12,4	19,8	11,7	903
Puno	29,7	8,4	593	29,1	10,5	322	15,5	22,4	9,2	767
San Martín	19,9	12,3	402	16,3	14,3	486	16,1	23,2	9,2	826
Tacna	5,4	26,4	241	4,7	35,2	283	0,8	4,0	34,5	376
Tumbes	12,9	12,3	365	7,2	20,6	384	6,9	12,0	13,6	712
Ucayali	33,6	12,6	446	22,7	10,2	531	19,9	28,6	9,1	992

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación (C.V.) mayor a 15,0% deben ser considerados como referenciales.

a/ La estimación a nivel nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007 y la estimación a nivel departamental corresponde a información recopilada en los años 2005, 2007 y 1er. trimestre 2008 más ampliación muestral, la mediana de fecha de entrevistas es Junio 2007.

b/ La estimación a nivel nacional corresponde a información recolectada entre los meses de marzo a diciembre del 2010 y la estimación a nivel departamental corresponde a información recopilada en el año 2009 y 2010.

Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2005, 2007, 2008, 2009 y 2010.

CUADRO N° 02: PROPORCIÓN DE MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO Y CARACTERÍSTICAS, 2007, 2009 Y 2010
(Patrón de referencia OMS)

Ámbito geográfico / Características	2007 al				2009				2010			
	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		C.V.	Casos sin Ponderar	
								Inferior	Superior			
Total	28,5	5,1	2 518	23,8	3,0	9 782	23,2	21,9	24,5	2,9	9 219	
Área de residencia												
Urbana	15,6	9,3	1 144	14,2	5,0	5 320	14,1	12,7	15,5	5,1	4 952	
Rural	45,7	5,1	1 374	40,3	3,3	4 462	38,8	36,6	41,1	3,0	4 267	
Región natural												
Costa	12,5	16,4	659	10,2	7,8	2 862	11,8	10,0	13,6	7,7	2 821	
Lima Metropolitana	10,5	28,4	152	7,5	14,5	630	8,6	6,2	11,0	14,0	592	
Resto Costa	14,5	18,3	507	13,0	8,8	2 232	14,9	12,3	17,4	8,7	2 229	
Sierra	42,4	5,1	1 174	37,5	3,3	4 067	34,4	32,3	36,5	3,2	3 880	
Sierra urbana	25,9	8,8	306	23,2	7,0	1 400	19,7	16,8	22,5	7,4	1 352	
Sierra rural	49,8	5,6	868	45,9	3,4	2 667	43,4	40,7	46,2	3,2	2 528	
Selva	34,1	7,8	685	28,1	4,9	2 853	28,5	25,4	31,6	5,6	2 518	
Selva urbana	25,8	14,4	305	21,6	7,9	1 388	24,9	20,7	29,0	8,5	1 193	
Selva rural	40,3	9,2	380	34,2	5,9	1 465	31,6	27,1	36,1	7,3	1 325	
Edad												
Menores de 36 meses	27,3	5,8	1 494	23,2	3,5	5 653	23,3	21,8	24,9	3,4	5 386	
De 36 a 59 meses	30,0	6,8	1 024	24,6	3,8	4 129	23,1	21,3	24,8	3,9	3 833	
Nivel de educación 1/												
Sin educación/Primaria	47,2	4,6	1 114	39,8	3,2	3 891	40,4	38,2	42,6	2,8	3 592	
Secundaria	18,9	9,0	890	18,7	4,6	3 895	15,7	14,1	17,4	5,3	3 658	
Superior	8,9	22,4	418	7,8	9,8	1 669	8,7	6,9	10,5	10,8	1 618	
Tratamiento del agua												
Con Cloro residual 2/	n.d.	n.d.	n.d.	8,5	12,6	1 135	8,1	6,1	10,1	12,8	1 055	
La Hlevren	n.d.	n.d.	n.d.	25,1	3,7	5 859	24,3	22,7	25,9	3,4	5 664	
Red Pública	n.d.	n.d.	n.d.	23,4	4,3	4 405	23,1	21,3	24,8	3,8	4 331	
Otra fuente	n.d.	n.d.	n.d.	29,9	7,3	1 454	28,1	24,4	31,8	6,7	1 333	
Otro tratamiento	n.d.	n.d.	n.d.	43,1	24,4	34	(13,3)	2,7	23,9	40,6	33	
Consumen agua embotellada	n.d.	n.d.	n.d.	15,0	27,9	164	15,6	5,3	25,8	33,6	187	
Sin tratamiento	n.d.	n.d.	n.d.	33,2	4,5	2 590	32,9	30,1	35,7	4,3	2 280	
Quintil de riqueza												
Quintil inferior	49,2	5,4	879	45,3	3,4	3 037	44,0	41,4	46,7	3,0	2 948	
Segundo quintil	39,6	6,3	712	29,7	4,2	2 714	28,6	26,1	31,0	4,4	2 346	
Quintil intermedio	16,6	14,2	471	14,1	7,1	2 049	15,4	13,2	17,7	7,3	1 977	
Cuarto quintil	8,9	23,1	260	10,1	11,1	1 253	7,2	5,5	9,0	12,4	1 270	
Quintil superior	5,3	34,2	196	4,2	21,4	729	5,2	3,2	7,2	19,5	678	
Ámbito JUNTOS	54,7	3,1	2 118	47,9	3,3	2 293	46,8	43,6	50,0	3,5	2 033	

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación (C.V.) mayor a 15,0% deben ser considerados como referenciales.

a/ La estimación de cobertura nacional son realizadas con los datos captados en el año 2007; y la estimación del ámbito JUNTOS (638 distritos) son realizadas con información captada en el periodo 2005-2007, 1er. trimestre 2008 y la ampliación muestral.

1/ La estimación excluye los menores cuyas madres no residen en la vivienda.

2/ Cloro residual libre >= 0,5 mg/lit de agua según Decreto Supremo N° 031-2010-SA.

Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2007, 2009 y 2010.

CUADRO N° 02A: PROPORCIÓN DE MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA, SEGÚN DEPARTAMENTO, JUNIO 2007 Y 2010
(Patrón de referencia OMS)

Departamento	Junio 2007 a/				2009-2010 b/			
	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		C.V.	Casos sin Ponderar
					Inferior	Superior		
Total	28,5	5,1	2 518	23,2	21,9	24,5	2,9	9 219
Amazonas	37,4	9,5	361	25,2	21,1	29,3	8,3	913
Áncash	38,6	8,8	371	28,6	24,3	32,9	7,6	794
Apurímac	41,7	8,0	351	38,6	33,6	43,6	6,6	714
Arequipa	12,4	25,4	357	12,3	8,2	16,4	17,0	523
Ayacucho	42,2	8,5	398	38,8	34,5	43,1	5,7	898
Cajamarca	46,6	7,6	370	40,5	35,9	45,2	5,9	843
Cusco	36,9	13,9	273	35,4	29,3	41,4	8,7	672
Huancavelica	59,2	5,1	417	54,6	49,0	60,3	5,3	714
Huánuco	49,4	8,1	351	37,4	32,0	42,9	7,4	791
Ica	13,0	12,6	382	10,3	7,7	12,9	12,8	684
Junín	31,9	11,9	261	30,4	25,0	35,8	9,0	753
La Libertad	31,2	13,1	344	26,1	20,5	31,8	11,1	755
Lambayeque	20,1	12,5	406	17,8	11,2	24,4	18,9	546
Lima	11,4	14,1	463	8,9	7,3	10,5	9,2	1 388
Loreto	32,3	7,6	535	31,0	26,0	36,1	8,3	1 155
Madre de Dios	15,7	10,1	586	11,9	9,8	14,1	9,2	889
Moquegua	9,5	26,6	265	5,7	3,5	7,9	19,8	557
Pasco	39,5	6,7	422	32,6	27,6	37,6	7,8	821
Plura	29,6	10,6	442	22,9	18,4	27,3	10,0	908
Puno	36,7	9,5	323	25,5	21,3	29,7	8,4	771
San Martín	25,1	10,8	488	26,8	23,0	30,6	7,2	828
Tacna	6,3	26,9	283	3,0	1,1	4,8	31,7	377
Tumbes	12,2	14,6	384	12,8	9,8	15,9	12,1	713
Ucayali	30,5	7,3	532	31,6	27,4	35,8	6,8	994

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación (C.V.) mayor a 15,0% deben ser considerados como referenciales.

a/ La estimación a nivel nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007 y la estimación a nivel departamental corresponde a información recopilada en los años 2005 y 2007 y 1er trimestre 2008 más ampliación muestral, la mediana de fecha de entrevistas es junio 2007.

b/ La estimación a nivel nacional corresponde a información recolectada entre los meses de marzo a diciembre del 2010 y la estimación a nivel departamental corresponde a información recopilada en los años 2009 y 2010.

Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2005, 2007, 2008, 2009 y 2010.

CUADRO N° 03: PROPORCIÓN DE MENORES DE SEIS MESES DE EDAD CON LACTANCIA EXCLUSIVA, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO Y CARACTERÍSTICAS, 2000, 2007, 2009 Y 2010

Ámbito geográfico / Características	2000			2007 a/			2009			2010			
	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Intervalo de confianza al 95%		C.V.	
										Inferior	Superior		
Total	67,2	1,7	1 161	68,7	5,4	223	68,5	3,0	901	64,1	72,4	3,1	766
Área de residencia													
Urbana	58,6	2,9	526	64,5	8,1	119	60,6	4,7	505	53,9	65,8	5,1	427
Rural	77,3	2,0	635	76,5	5,9	104	82,9	3,0	396	79,7	88,2	2,6	339
Región natural													
Costa	56,0	3,6	310	60,1	13,7	51	59,3	6,1	286	44,9	60,8	7,6	229
Lima Metropolitana	58,0	5,2	81	60,0	19,7	15	57,0	10,4	58	36,9	61,2	12,6	53
Resto Costa	53,9	4,9	229	60,3	17,9	36	61,6	6,6	228	46,7	66,4	8,8	176
Sierra	77,4	2,1	543	72,4	5,0	105	76,2	3,6	364	79,2	88,2	2,8	314
Sierra urbana	66,1	5,3	143	67,8	5,4	42	63,6	8,1	121	64,9	82,9	6,2	112
Sierra rural	81,4	2,1	400	76,1	7,7	63	82,8	3,9	243	85,2	94,3	2,6	202
Selva	72,3	3,1	308	80,8	7,1	67	77,6	4,6	251	70,9	83,6	4,2	223
Selva urbana	69,4	4,5	125	78,8	10,7	33	66,8	8,6	126	66,9	84,7	6,0	117
Selva rural	73,9	4,0	183	82,4	9,3	34	87,9	3,9	125	69,6	87,7	5,9	106
Nivel de educación													
Sin educación/Primaria	72,2	2,4	584	75,0	4,7	94	82,0	3,3	316	71,6	83,7	3,9	273
Secundaria	69,5	2,4	398	69,3	9,0	88	67,8	4,5	420	60,6	74,2	5,1	352
Superior	48,5	7,0	179	54,8	20,0	41	52,7	10,4	165	45,6	67,1	9,7	141
Quintil de riqueza													
Quintil inferior	82,0	2,0	421	77,2	7,3	67	85,1	3,5	267	77,6	87,9	3,2	241
Segundo quintil	71,1	3,7	287	67,8	7,4	67	79,4	3,8	264	67,3	82,0	5,0	194
Quintil intermedio	61,0	4,2	195	74,2	9,7	44	66,2	6,8	192	52,7	72,6	8,1	178
Cuarto quintil	57,0	4,6	159	72,2	17,9	27	56,0	10,4	118	48,6	74,7	10,8	90
Quintil superior	50,3	9,2	99	41,2	39,5	18	35,5	21,3	60	32,0	63,5	16,8	63
Ámbito JUNTOS	83,3	2,0	322	81,1	3,5	240	87,8	2,8	216	81,1	93,5	3,6	159

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación (C.V.) mayor a 15,0% deben ser considerados como referenciales.

a/ La estimación de cobertura nacional son realizadas con los datos captados en el año 2007; y la estimación del ámbito JUNTOS (638 distritos) son realizadas con información captada en el periodo 2005-2007, 1er. trimestre 2008 y la ampliación muestral. Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2007, 2009 y 2010.

CUADRO N° 03A: PROPORCIÓN DE MENORES DE SEIS MESES DE EDAD CON LACTANCIA EXCLUSIVA, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2000, JUNIO 2007, 2009 Y 2010

Departamento	2000				Junio 2007 al				2009				2010			
	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Intervalo de confianza al 95%		C.V.	Casos sin Ponderar
													Inferior	Superior		
Total	67,2	2,7	1 161	68,7	5,4	223	68,5	3,0	901	68,3	3,1	766	64,1	72,4	3,1	766
Amazonas	60,6	9,8	66	70,2	9,8	43	86,1	6,2	40	72,7	12,8	27	54,5	90,9	12,8	27
Áncash	79,2	7,4	48	62,8	11,8	40	60,2	15,7	30	69,1	11,9	25	52,9	85,3	11,9	25
Apurímac	93,5	3,4	62	74,0	9,9	46	90,8	7,5	30	86,3	9,3	21	70,6	102,1	9,3	21
Arequipa	53,7	16,2	41	57,8	12,4	38	38,5	32,2	21	66,7	13,5	25	49,0	84,4	13,5	25
Ayacucho	82,6	6,4	69	93,1	5,3	41	77,6	8,8	42	82,0	7,0	42	70,7	93,2	7,0	42
Cajamarca	82,4	9,2	34	70,3	8,5	41	77,7	7,3	48	77,7	7,8	43	65,7	89,6	7,8	43
Cusco	84,4	7,6	45	86,3	6,8	35	83,4	9,0	29	82,3	8,7	34	68,3	96,4	8,7	34
Huancaavelica	89,1	5,3	64	84,6	5,9	52	89,0	6,5	32	94,7	5,4	19	84,6	104,8	5,4	19
Huanuco	82,5	7,8	57	76,0	8,7	50	74,3	10,6	36	83,4	10,4	35	66,3	100,4	10,4	35
Ica	37,0	23,3	27	43,2	15,7	45	64,0	12,6	40	43,7	20,4	31	26,2	61,2	20,4	31
Junín	64,9	11,8	37	71,1	9,1	36	80,4	7,1	39	91,5	6,8	25	79,3	103,7	6,8	25
La Libertad	67,5	9,5	40	54,4	14,2	46	78,4	8,1	39	76,6	10,7	34	60,5	92,8	10,7	34
Lambayeque	45,5	21,3	33	62,9	12,7	42	42,4	27,4	24	52,5	20,4	22	31,5	73,6	20,4	22
Lima	59,7	8,1	99	55,2	11,0	75	59,1	9,6	67	55,0	11,4	60	42,7	67,2	11,4	60
Loreto	82,3	6,4	62	79,2	5,3	77	82,3	7,3	41	63,0	11,0	35	49,4	76,6	11,0	35
Madre de Dios	72,9	9,2	48	52,7	11,0	71	58,5	13,4	51	58,0	12,9	43	43,3	72,7	12,9	43
Moquegua	56,3	11,1	32	34,8	31,0	23	77,6	10,7	23	72,9	14,1	17	52,7	93,1	14,1	17
Pasco	74,4	9,0	39	79,6	6,4	59	77,8	8,9	44	78,5	10,4	42	62,4	94,6	10,4	42
Plura	52,9	11,2	51	58,7	12,5	39	63,0	12,4	46	43,4	18,6	42	27,5	59,2	18,6	42
Puno	75,9	8,1	58	73,7	10,1	42	70,8	11,8	30	97,3	2,8	29	92,0	102,7	2,8	29
San Martín	61,9	13,0	42	74,2	6,9	58	73,9	13,4	28	76,7	8,7	42	63,6	89,8	8,7	42
Tacna	53,8	16,7	26	65,6	13,9	32	56,7	19,7	24	72,5	17,6	13	47,4	97,6	17,6	13
Tumbes	66,7	14,0	27	47,2	14,9	46	45,2	17,0	38	47,4	28,2	21	21,1	73,6	28,2	21
Ucayali	68,5	8,5	54	79,6	6,2	65	84,5	6,8	59	87,2	5,6	39	77,6	96,8	5,6	39

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación (C.V.) mayor a 15,0% deben ser considerados como referenciales.

1/ La estimación a nivel nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007 y la estimación a nivel departamental corresponde a información recopilada en los años 2005, 2006, 2007 y 1er. trimestre 2008 más ampliación muestral, la mediana de fecha de entrevistas es junio 2007.

Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.

CUADRO Nº 04: PROPORCIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A MENOS DE 36 MESES DE EDAD CON ANEMIA, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO Y CARACTERÍSTICAS, 2000, 2007, 2009 Y 2010

Ámbito geográfico / Características	2000			2007 a/			2009			2010			
	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Intervalo de confianza al 95%		C.V.	Casos sin Ponderar
										Inferior	Superior		
Total	60,9	2,3	1 238	56,8	4,0	1 067	50,4	2,2	4 395	48,3	52,4	2,1	4 434
Área de residencia													
Urbana	60,4	3,1	587	53,3	6,5	482	46,8	3,1	2 425	43,8	49,4	3,1	2 375
Rural	61,6	3,4	651	61,0	4,4	585	56,7	2,9	1 970	53,9	59,4	2,5	2 059
Región natural													
Costa	60,4	3,5	363	50,3	8,2	284	43,4	4,3	1 320	38,0	45,1	4,3	1 379
Lima Metropolitana	59,0	5,8	105	49,1	16,6	53	43,1	7,0	274	36,9	48,6	7,0	284
Resto Costa	61,9	4,0	258	51,2	7,3	231	43,7	5,0	1 046	36,4	44,3	5,0	1 095
Sierra	65,9	3,6	547	65,7	4,5	453	59,8	2,9	1 715	57,2	63,1	2,5	1 814
Sierra urbana	64,5	5,1	148	59,7	10,7	107	56,5	4,6	612	50,4	60,2	4,5	633
Sierra rural	66,4	4,5	399	67,7	4,8	346	61,9	3,7	1 103	59,3	66,8	3,0	1 181
Selva	50,5	5,6	328	52,4	6,4	330	47,6	4,1	1 360	49,2	55,7	3,1	1 241
Selva urbana	45,3	10,3	135	58,9	7,2	155	46,8	5,9	635	47,9	58,3	5,0	577
Selva rural	53,5	6,6	193	47,4	9,9	175	48,3	5,7	725	47,9	55,9	3,9	664
Nivel de educación 1/													
Sin educación/Primaria	63,6	3,1	647	61,6	4,0	460	57,7	2,9	1 655	54,1	60,1	2,7	1 698
Secundaria	58,9	3,1	426	59,6	6,1	410	49,4	3,3	1 861	47,5	53,6	3,1	1 840
Superior	58,2	6,8	165	42,9	13,6	162	41,5	5,8	770	34,6	44,0	6,1	787
Quintil de riqueza													
Quintil inferior	60,4	4,6	453	63,1	4,8	378	55,4	3,5	1 364	56,1	62,7	2,8	1 428
Segundo quintil	65,4	3,9	288	60,9	6,0	303	56,9	3,6	1 194	50,9	58,3	3,5	1 164
Quintil intermedio	66,2	4,4	254	57,2	8,2	226	50,1	4,5	956	45,0	54,3	4,8	965
Cuarto quintil	59,0	6,3	150	38,3	18,8	93	47,8	6,1	594	38,1	48,5	6,1	581
Quintil superior	47,6	9,9	93	51,2	14,3	67	28,3	11,5	287	24,3	37,8	11,1	296
Ámbito JUNTOS	63,0	5,1	313	62,5	3,9	853	61,1	3,7	1 010	59,3	67,9	3,4	946

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación (C.V.) mayor a 15,0% deben ser considerados como referenciales.

a/ La estimación de cobertura nacional son realizadas con los datos captados en el año 2007; y la estimación del ámbito JUNTOS (638 distritos) son realizadas con información captada en el periodo 2005-2007. 1er. trimestre 2008 y la ampliación muestral.

1/ Se excluye los menores cuyas madres no residen en la vivienda.

Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2007, 2009 y 2010.

CUADRO N° 04A: PROPORCIÓN DE NIÑAS Y NIÑAS DE 6 A MENOS DE 36 MESES DE EDAD CON ANEMIA, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2000, JUNIO 2007, 2009 Y 2010

Departamento	2000				Junio 2007 al				2009				2010			
	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Intervalo de confianza al 95%		C.V.	Casos sin Ponderar
													Inferior	Superior		
Total	60,9	3,0	1 238	56,8	4,0	1 067	50,4	2,2	4 395	50,3	2,1	4 434	48,3	52,4	2,1	4 434
Amazonas	60,0	9,5	50	48,5	10,5	168	52,9	8,2	229	52,7	6,9	217	45,6	59,9	6,9	217
Áncash	72,2	12,4	36	54,1	8,7	148	52,6	8,9	180	57,7	7,8	181	48,8	66,5	7,8	181
Apurímac	60,0	12,6	75	64,2	7,2	165	66,1	5,7	169	61,9	6,2	181	54,4	69,3	6,2	181
Arequipa	51,6	14,6	31	50,6	8,5	164	59,0	7,8	127	44,5	10,9	126	35,0	54,0	10,9	126
Ayacucho	58,3	10,9	60	64,6	7,9	139	54,4	6,0	197	52,9	8,0	202	44,6	61,2	8,0	202
Cajamarca	64,4	10,8	45	54,2	7,3	160	41,3	12,9	206	59,8	7,1	200	51,5	68,2	7,1	200
Cusco	79,4	5,8	63	73,1	6,7	112	76,3	6,0	126	58,6	7,8	184	49,6	67,5	7,8	184
Huancavelica	64,2	8,4	67	66,9	6,9	127	68,3	4,3	168	71,5	6,9	154	61,7	81,2	6,9	154
Huanuco	64,2	11,4	67	55,4	11,9	146	53,1	7,5	166	66,5	7,4	161	56,8	76,1	7,4	161
Ica	29,6	37,6	27	50,6	7,0	171	44,9	8,4	171	54,0	8,5	155	45,0	63,1	8,5	155
Junín	65,3	11,9	49	58,2	8,7	96	60,5	8,3	145	41,4	7,8	165	35,1	47,7	7,8	165
La Libertad	45,5	19,1	55	57,8	6,6	165	49,0	9,4	156	46,6	9,1	201	38,3	54,9	9,1	201
Lambayeque	66,7	11,1	33	55,4	6,2	182	30,8	12,6	125	32,2	12,8	136	24,1	40,2	12,8	136
Lima	59,1	7,7	121	51,0	7,7	186	43,0	6,9	312	41,5	6,8	323	35,9	47,1	6,8	323
Loreto	47,6	13,9	82	59,6	7,0	265	45,2	8,3	315	55,9	5,8	286	49,6	62,3	5,8	286
Madre de Dios	64,2	9,8	53	64,2	5,1	288	53,4	5,0	218	58,3	6,3	180	51,1	65,5	6,3	180
Moquegua	47,1	19,6	17	56,2	8,2	107	58,3	9,0	136	42,4	9,2	135	34,7	50,0	9,2	135
Pasco	55,3	14,8	47	65,5	7,7	174	66,6	6,8	151	55,5	8,6	169	46,1	64,9	8,6	169
Piura	68,4	7,9	57	49,3	7,1	203	46,4	9,2	213	36,8	11,1	229	28,7	44,8	11,1	229
Puno	77,5	18,0	40	78,5	5,5	135	72,7	4,7	189	78,1	5,1	171	70,2	86,0	5,1	171
San Martín	38,5	19,5	39	54,1	7,1	233	32,3	10,6	193	44,8	7,3	194	38,4	51,1	7,3	194
Tacna	73,9	14,3	23	51,6	9,3	113	48,6	9,8	75	52,6	8,7	96	43,6	61,5	8,7	96
Tumbes	66,7	11,9	51	58,2	6,1	182	50,8	7,4	181	54,3	7,1	160	46,7	61,9	7,1	160
Ucayali	56,0	12,4	50	49,9	7,4	243	64,1	5,1	247	65,3	5,8	228	57,8	72,7	5,8	228

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación (C.V.) mayor a 15,0% deben ser considerados como referenciales.

a/ La estimación a nivel nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007 y la estimación a nivel departamental corresponde a información recopilada en los años 2005, 2006, 2007 y 1er. trimestre 2008 más ampliación muestral, la mediana de fecha de entrevistas es junio 2007.

Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.

CUADRO N° 05: PROPORCIÓN DE MENORES DE 36 MESES DE EDAD QUE EN LAS DOS SEMANAS ANTERIORES A LA ENCUESTA TUVIERON IRA, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO Y CARACTERÍSTICAS, 2000, 2007, 2009 Y 2010

Ámbito geográfico / Características	2000			2007 al			2009			2010			
	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Intervalo de confianza al 95%		C.V.	
										Inferior	Superior		
Total	21,3	2,8	7 610	24,0	7,0	1 562	17,2	4,2	5 880	16,8	19,7	4,1	5 373
Área de residencia													
Urbana	20,6	4,3	3 475	21,6	10,7	720	14,6	6,5	3 317	16,0	20,0	5,7	2 939
Rural	22,2	3,6	4 135	27,3	8,7	842	22,1	5,0	2 563	16,7	20,7	5,5	2 434
Región natural													
Costa	20,5	4,8	2 085	21,2	13,5	411	15,2	8,3	1 830	15,8	20,8	6,9	1 693
Lima Metropolitana	20,5	7,8	546	25,6	20,8	86	16,5	12,8	423	13,9	21,9	11,4	368
Resto Costa	20,4	5,6	1 539	17,2	14,5	325	13,6	8,6	1 407	15,8	21,6	7,8	1 325
Sierra	20,5	3,9	3 567	24,4	9,6	723	16,1	6,0	2 353	13,7	17,5	6,2	2 209
Sierra urbana	21,3	8,4	946	18,4	21,0	198	10,4	11,9	853	10,4	16,4	11,4	791
Sierra rural	20,2	4,3	2 621	27,2	10,5	525	19,6	6,9	1 500	14,5	19,4	7,3	1 418
Selva	26,2	6,2	1 958	31,4	9,2	428	25,5	5,9	1 697	20,9	28,0	7,5	1 471
Selva urbana	23,8	9,3	803	31,5	13,2	197	22,3	8,7	815	26,4	32,2	11,2	700
Selva rural	27,6	8,1	1 155	31,3	12,8	231	28,6	8,0	882	22,7	27,0	9,5	771
Nivel de educación													
Sin educación/Primaria	23,0	3,7	3 951	29,5	7,7	688	22,6	5,3	2 170	18,8	23,6	5,8	2 056
Secundaria	21,4	4,9	2 559	21,8	11,3	596	16,4	7,1	2 557	16,6	21,1	6,1	2 296
Superior	16,5	8,6	1 100	17,8	20,3	278	11,5	12,2	1 153	9,7	15,1	11,0	1 021
Quintil de riqueza													
Quintil inferior	24,0	4,4	2 724	30,9	9,1	529	24,0	5,3	1 747	18,3	23,5	6,4	1 678
Segundo quintil	21,2	5,4	1 962	24,7	9,8	440	17,3	6,8	1 558	18,0	24,2	7,5	1 387
Quintil intermedio	21,7	7,7	1 367	19,3	15,8	312	16,2	9,2	1 298	15,3	21,8	8,9	1 186
Cuarto quintil	19,9	8,2	962	26,0	20,4	151	14,3	14,9	824	11,0	18,9	13,4	711
Quintil superior	17,0	10,4	595	14,9	23,3	130	10,3	19,7	453	7,8	15,3	16,5	411
Ámbito JUNTOS	21,1	4,2	1 989	25,3	5,7	1 718	18,3	7,7	1 342	14,9	20,5	8,1	1 126

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación (C.V.) mayor a 15,0% deben ser considerados como referenciales.

a/ La estimación de cobertura nacional son realizadas con los datos captados en el año 2007; y la estimación del ámbito JUNTOS (638 distritos) son realizadas con información captada en el periodo 2005-2007, 1er. trimestre 2008 y la ampliación muestral. Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2007, 2009 y 2010.

CUADRO N° 05A: PROPORCIÓN DE MENORES DE 36 MESES DE EDAD QUE EN LAS DOS SEMANAS ANTERIORES A LA ENCUESTA TUVIERON IRA, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2000, JUNIO 2007, 2010

Departamento	2000			Junio 2007 a/			2009-2010 b/				
	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Casos sin Ponderar	
								Inferior	Superior		
Total	21,3	2,8	7 610	24,0	7,0	1 562	18,3	16,8	19,7	4,1	5 373
Amazonas	21,4	15,2	370	23,8	11,0	312	22,3	17,9	26,8	10,2	512
Ancash	19,1	11,1	278	18,7	15,0	273	24,1	19,9	28,3	9,0	437
Apurímac	9,3	14,5	375	21,2	18,0	305	9,3	5,8	12,8	19,1	422
Arequipa	20,8	15,9	226	13,0	17,0	276	10,1	6,4	13,8	18,8	327
Ayacucho	18,0	10,2	433	20,9	13,5	346	13,0	9,9	16,0	11,9	495
Cajamarca	23,8	11,8	265	21,7	12,2	289	18,6	15,0	22,1	9,7	520
Cusco	19,2	12,3	297	13,2	18,3	211	12,1	8,9	15,2	13,3	405
Huancavelica	21,5	7,7	483	26,9	11,0	366	13,8	10,6	16,9	11,7	399
Huánuco	29,7	11,3	370	24,7	12,8	271	24,3	19,6	29,0	9,8	436
Ica	18,6	14,5	221	20,7	10,8	298	12,2	8,9	15,6	14,0	413
Junín	21,4	11,3	281	24,5	14,5	228	15,5	11,0	19,9	14,7	428
La Libertad	10,4	13,4	259	20,4	14,6	300	9,2	6,8	11,5	13,0	460
Lambayeque	32,9	10,0	216	13,9	16,9	293	15,5	11,8	19,2	12,3	329
Lima	21,2	7,2	679	18,4	11,0	441	17,5	14,9	20,0	7,5	891
Loreto	28,6	10,7	413	36,7	9,0	452	33,9	28,8	38,9	7,6	672
Madre de Dios	14,2	14,6	323	20,5	9,7	448	20,5	16,4	24,6	10,2	531
Moquegua	13,0	20,5	193	12,2	19,6	204	13,3	9,0	17,6	16,5	359
Pasco	25,8	9,7	275	25,8	9,8	337	30,3	25,3	35,2	8,3	504
Piura	21,5	10,0	302	23,9	11,5	302	25,1	20,4	29,7	9,5	534
Puno	19,0	12,3	405	12,5	18,9	271	11,7	8,4	15,1	14,6	426
San Martín	21,6	13,7	259	28,9	7,8	350	21,3	16,6	25,9	11,2	471
Tacna	28,7	11,5	167	11,1	17,0	219	11,4	7,6	15,2	17,1	279
Tumbes	7,0	26,6	215	16,9	13,2	308	14,1	10,7	17,4	12,1	415
Ucayali	25,9	9,0	305	20,8	10,2	418	21,0	16,8	25,1	10,1	588

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación (C.V.) mayor a 15,0% deben ser considerados como referenciales.

a/ La estimación a nivel nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007 y la estimación a nivel departamental corresponde a información recopilada en los años 2005, 2006, 2007 y 1er. trimestre 2008 más ampliación muestral. La mediana de fecha de entrevistas es Junio 2007.

b/ La estimación a nivel nacional corresponde a información recolectada entre los meses de marzo a diciembre del 2010 y la estimación a nivel departamental corresponde a información recopilada en los años 2009 y 2010. Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.

CUADRO N° 06: PROPORCIÓN DE MENORES DE 36 MESES DE EDAD QUE EN LAS DOS SEMANAS ANTERIORES A LA ENCUESTA TUVIERON DIARREA, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO Y CARACTERÍSTICAS, 2000, 2007, 2009 Y 2010

Ámbito geográfico / Características	2000			2007 a/			2009			2010				
	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Intervalo de confianza al 95%		Casos sin Ponderar		
										Inferior	Superior			
Total	19,8	2,9	7 604	17,4	7,3	1 562	18,0	3,8	5 880	18,9	17,4	20,4	4,0	5 373
Área de residencia														
Urbana	17,4	4,5	3 474	16,0	11,6	720	17,5	5,2	3 317	19,3	17,2	21,3	5,4	2 939
Rural	22,6	3,8	4 130	19,2	8,1	842	18,9	5,3	2 563	18,3	16,4	20,2	5,4	2 434
Región natural														
Costa	14,2	6,2	2 084	12,6	18,2	411	16,3	7,0	1 830	17,3	14,8	19,9	7,6	1 693
Lima Metropolitana	13,9	9,8	546	10,5	37,6	86	16,6	11,0	423	17,9	13,6	22,2	12,2	368
Resto Costa	14,5	7,5	1 538	14,6	16,2	325	15,9	8,0	1 407	16,7	13,9	19,5	8,4	1 325
Sierra	21,6	4,1	3 566	18,8	8,1	723	15,6	6,1	2 353	17,0	15,1	19,0	5,8	2 209
Sierra urbana	22,7	6,8	945	20,4	10,9	198	17,0	9,4	853	20,1	16,6	23,5	8,7	791
Sierra rural	21,2	5,1	2 621	18,0	11,0	525	14,6	8,1	1 500	15,1	12,9	17,4	7,6	1 418
Selva	30,7	4,6	1 954	27,8	10,2	428	28,4	5,3	1 697	28,1	25,1	31,0	5,3	1 471
Selva urbana	32,0	6,0	803	28,6	15,6	197	26,5	8,3	815	30,0	25,4	34,6	7,8	700
Selva rural	29,8	6,5	1 151	27,1	13,2	231	30,2	6,9	882	26,4	22,6	30,1	7,2	771
Nivel de educación														
Sin educación/Primaria	23,3	3,8	3 946	19,0	8,6	688	20,0	5,9	2 170	20,6	18,3	22,9	5,7	2 056
Secundaria	18,8	5,2	2 558	18,7	12,2	596	19,7	5,8	2 557	20,0	17,7	22,3	5,9	2 296
Superior	12,1	9,0	1 100	12,2	20,1	278	12,1	10,6	1 153	14,0	11,3	16,7	9,9	1 021
Tratamiento del agua														
Con Cloro residual 1/	14,0	8,7	970	n.d.	n.d.	n.d.	16,9	11,6	721	16,9	12,7	21,1	12,6	657
La Híenven	20,1	5,3	1 998	n.d.	n.d.	n.d.	16,5	5,3	3 506	17,2	15,4	19,0	5,4	3 309
Red Pública	22,0	8,0	596	n.d.	n.d.	n.d.	15,2	6,4	2 628	16,9	14,9	18,8	6,0	2 544
Otra fuente	19,3	6,7	1 402	n.d.	n.d.	n.d.	20,3	9,2	878	18,3	14,8	21,8	9,8	765
Otro tratamiento	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	*	94,8	23	(10,0)	-4,0	23,9	71,6	14
Consumen agua embotellada	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	25,9	23,6	92	34,3	21,0	47,6	19,7	114
Sin tratamiento	25,0	5,0	1 669	n.d.	n.d.	n.d.	23,0	6,2	1 538	24,4	21,6	27,3	5,9	1 279
Quintil de riqueza														
Quintil inferior	23,7	4,8	2 721	21,7	9,6	529	19,5	6,1	1 747	19,7	17,3	22,2	6,3	1 678
Segundo quintil	22,9	5,2	1 961	23,5	9,8	440	20,8	6,6	1 558	22,7	19,8	25,5	6,4	1 387
Quintil intermedio	21,6	6,9	1 365	13,5	18,4	312	19,2	8,3	1 298	19,0	15,9	22,1	8,4	1 186
Cuarto quintil	13,9	9,3	962	11,2	27,8	151	14,0	11,7	824	16,2	12,5	20,0	11,9	711
Quintil superior	9,9	14,8	595	10,7	39,7	130	13,8	15,9	453	13,5	9,1	17,9	16,6	411
Ámbito JUNTOS	23,6	4,3	1 988	20,0	6,6	1 718	16,2	7,5	1 342	15,6	13,3	18,0	7,6	1 126

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación (C.V.) mayor a 15,0% deben ser considerados como referenciales.

a/ La estimación de cobertura nacional son realizadas con los datos captados en el año 2007, y la estimación del ámbito JUNTOS (638 distritos) son realizadas con información captada en el periodo 2005-2007, 1er. trimestre 2008 y la ampliación muestral.

1/ Cloro residual libre >= 0,5 mg/lit de agua según Decreto Supremo N° 031-2010-SA.

Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2007, 2009 y 2010.

CUADRO N° 06A: PROPORCIÓN DE MENORES DE 36 MESES DE EDAD QUE EN LAS DOS SEMANAS ANTERIORES A LA ENCUESTA TUVIERON DIARREA, SEGUN DEPARTAMENTO, 2000, JUNIO 2007 Y 2010

Departamento	2000			Junio 2007 a/			2009-2010 b/			
	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Intervalo de confianza al 95%		Casos sin Ponderar	
							Inferior	Superior		
Total	19,8	2,9	7 604	17,4	7,3	1 562	17,4	20,4	4,0	5 373
Amazonas	20,8	16,0	370	23,8	11,5	312	18,7	28,2	10,3	512
Ancash	18,7	13,3	278	13,9	16,5	273	12,0	19,4	11,9	437
Apurimac	29,1	10,5	375	23,9	14,2	305	13,0	21,5	12,7	422
Arequipa	13,3	13,1	226	14,5	16,6	276	7,0	15,0	18,6	327
Ayacucho	25,4	11,0	433	21,8	12,7	346	15,2	22,1	9,5	495
Cajamarca	29,1	10,2	265	21,8	11,0	289	12,4	19,1	10,9	520
Cusco	22,9	10,4	297	19,2	20,6	211	12,2	19,5	11,8	405
Huancavelica	21,3	6,9	483	20,6	15,0	366	11,7	20,5	13,9	399
Huánuco	20,8	12,3	370	16,6	15,0	271	14,2	21,6	10,6	436
Ica	17,2	16,6	221	17,2	14,2	298	14,1	22,2	11,3	413
Junín	26,3	9,5	281	21,1	12,2	228	18,1	27,2	10,2	428
La Libertad	13,9	21,2	259	15,6	16,9	300	7,4	14,7	16,9	460
Lambayeque	19,4	9,2	216	16,4	14,0	293	9,9	17,9	14,7	329
Lima	13,7	9,3	679	15,9	11,3	441	14,4	20,0	14,7	891
Loreto	33,7	8,3	410	32,1	9,1	452	31,4	39,3	5,7	672
Madre de Dios	14,6	13,1	322	29,4	6,4	447	23,4	30,6	6,8	531
Moquegua	11,9	14,8	193	13,3	18,3	204	12,6	19,8	11,4	359
Pasco	29,5	8,6	275	26,1	11,7	337	19,6	27,0	8,1	504
Piura	15,0	14,8	301	19,5	12,1	302	17,3	24,6	8,8	534
Puno	20,2	11,4	405	11,5	19,4	271	14,8	22,6	10,6	426
San Martín	30,9	12,0	259	28,3	8,7	350	24,8	33,1	7,3	471
Tacna	7,8	31,6	167	12,0	19,2	219	11,0	20,6	15,5	279
Tumbes	19,6	14,3	214	12,7	14,3	308	8,3	14,8	14,4	415
Ucayali	29,8	9,7	305	27,7	9,0	418	15,1	23,0	10,6	588

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación (C.V) mayor a 15,0% deben ser considerados como referenciales.

a/ La estimación a nivel nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007 y la estimación a nivel departamental corresponde a información recopilada en los años 2005, 2006, 2007 y 1er. trimestre 2008 más ampliación muestral, la mediana de fecha de entrevistas es junio 2007.

b/ La estimación a nivel nacional corresponde a información recolectada entre los meses de marzo a diciembre del 2010 y la estimación a nivel departamental corresponde a información recopilada en los años 2009 y 2010.

Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.

CUADRO N° 07: PROPORCIÓN DE NACIDOS VIVOS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA CON BAJO PESO AL NACER (<2,5 KG.), SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO Y CARACTERÍSTICAS, 2000, 2007, 2009 Y 2010

Ámbito geográfico / Características	2000			2007 a/			2009			2010				
	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Intervalo de confianza al 95%		Casos sin Ponderar		
										Inferior	Superior			
Total	8,5	4,5	9 290	8,4	10,4	2 222	7,1	5,5	9 035	8,0	7,2	8,9	5,2	8 279
Área de residencia														
Urbana	7,1	6,8	5 354	7,7	15,7	1 140	6,6	7,6	5 377	7,0	6,0	8,0	7,5	4 832
Rural	11,3	5,3	3 936	9,5	11,7	1 082	8,4	6,9	3 658	10,4	9,0	11,7	6,5	3 447
Región natural														
Costa	6,3	8,5	3 249	7,6	17,5	670	5,9	10,3	3 010	6,6	5,3	7,9	10,0	2 770
Lima Metropolitana	5,8	14,4	903	7,1	31,9	154	4,9	18,1	716	6,2	4,0	8,4	18,2	619
Resto Costa	6,8	8,8	2 346	8,1	16,2	516	7,2	11,8	2 294	7,1	5,9	8,4	9,0	2 151
Sierra	11,5	5,9	3 743	9,2	15,2	1 015	8,3	7,2	3 651	9,8	8,6	11,1	6,5	3 415
Sierra urbana	9,1	12,5	1 374	10,6	27,4	311	7,8	12,7	1 387	8,3	6,5	10,1	11,2	1 308
Sierra rural	13,0	6,3	2 369	8,3	16,2	704	8,6	8,6	2 264	10,9	9,2	12,6	7,9	2 107
Selva	10,1	8,1	2 298	8,8	19,9	537	8,6	8,9	2 374	8,6	6,9	10,3	10,1	2 094
Selva urbana	10,7	10,9	1 155	7,7	29,7	277	8,5	13,6	1 285	8,5	6,3	10,8	13,7	1 089
Selva rural	9,5	12,0	1 143	9,8	25,4	260	8,8	11,0	1 089	8,6	6,1	11,2	14,9	1 005
Nivel de educación														
Sin educación/Primaria	11,8	5,7	3 819	9,2	13,6	887	8,7	7,6	3 230	10,7	9,2	12,2	7,2	2 963
Secundaria	7,2	8,0	3 694	6,7	16,1	870	6,6	8,3	3 949	6,5	5,3	7,6	9,2	3 613
Superior	5,7	11,6	1 777	10,0	19,2	465	6,3	14,6	1 856	7,7	5,9	9,4	11,6	1 703
Quintil de riqueza														
Quintil inferior	15,0	6,0	2 187	10,0	15,2	617	8,9	9,0	2 255	11,4	9,6	13,2	8,0	2 209
Segundo quintil	9,0	7,7	2 392	10,0	15,5	643	8,7	9,6	2 580	7,9	6,4	9,5	9,7	2 160
Quintil intermedio	7,3	9,5	2 134	6,5	25,1	470	6,4	11,5	2 072	7,4	5,7	9,1	11,7	1 946
Cuarto quintil	6,6	13,8	1 580	6,0	30,5	268	6,1	17,3	1 315	6,6	4,5	8,7	15,9	1 249
Quintil superior	5,4	14,9	997	9,5	32,4	224	4,9	22,0	813	6,4	3,5	9,3	22,8	715
Ámbito JUNTOS	13,7	4,7	1 717	9,4	8,8	2 053	9,8	9,5	1 922	11,9	9,9	14,0	8,8	1 666

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación (C.V.) mayor a 15,0% deben ser considerados como referenciales.

a/ La estimación de cobertura nacional son realizadas con los datos captados en el año 2007 y la estimación del ámbito JUNTOS (638 distritos) son realizadas con información captada en el periodo 2005-2007, 1er. trimestre 2008 y la ampliación muestral. Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2007, 2009 y 2010.

CUADRO Nº 07A: PROPORCIÓN DE NACIDOS VIVOS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA CON BAJO PESO AL NACER (<2,5 KG.), SEGÚN DEPARTAMENTO, 2000, JUNIO 2007 Y 2010

Departamento	2000			Junio 2007 a/			2009-2010 b/		
	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar
	Intervalo de confianza al 95%								
				Inferior		Superior			
Total	8,5	4,5	9 290	8,4	10,4	2 222	8,0	5,2	8 279
Amazonas	8,2	16,3	378	6,6	22,2	404	8,6	12,1	796
Ancash	10,4	12,1	297	8,7	18,5	402	8,9	12,0	711
Apurímac	10,1	13,2	424	7,2	18,5	458	8,2	14,2	707
Arequipa	7,0	22,1	330	6,3	20,0	430	5,7	17,7	532
Ayacucho	8,8	14,9	490	7,1	18,5	501	10,1	12,9	800
Cajamarca	15,2	27,0	158	8,4	18,4	296	9,1	10,5	668
Cusco	10,8	14,6	398	9,7	19,7	330	11,4	13,0	616
Huancavelica	12,5	11,7	479	7,0	16,4	485	7,5	17,9	625
Huánuco	17,4	12,0	357	11,9	17,5	379	9,6	12,4	701
Ica	9,9	17,5	372	7,7	16,7	487	6,9	16,0	682
Junín	11,4	17,8	385	9,3	22,5	327	9,0	13,1	677
La Libertad	10,0	17,4	281	7,3	18,3	383	7,0	14,8	711
Lambayeque	7,5	23,0	268	6,7	19,3	427	9,0	11,8	527
Lima	5,7	13,2	1 069	6,3	15,7	721	5,9	11,9	1 493
Loreto	12,4	14,1	331	10,7	16,0	449	11,8	13,8	770
Madre de Dios	8,6	17,0	544	4,3	18,4	722	5,8	15,4	893
Moquegua	4,2	27,9	312	5,2	24,6	348	4,3	17,9	581
Pasco	12,4	11,7	338	12,4	11,9	510	10,4	11,6	841
Plura	5,1	18,8	370	8,4	16,2	419	9,0	16,0	796
Puno	8,3	21,1	386	7,7	17,3	373	4,1	23,8	615
San Martín	10,7	15,0	338	7,3	19,1	547	7,2	14,1	721
Tacna	4,3	35,0	277	5,4	25,0	352	3,1	32,4	436
Tumbes	8,7	15,8	345	6,2	18,4	504	8,6	12,0	701
Ucayali	9,6	20,3	363	8,7	13,2	551	9,0	12,6	714

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación (C.V.) mayor a 15,0% deben ser considerados como referendiales.

a/ La estimación a nivel nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007 y la estimación a nivel departamental corresponde a información recopilada en los años 2005, 2006, 2007 y 1er trimestre 2008 más ampliación muestral la mediana de fecha de entrevistas es junio 2007.

b/ La estimación a nivel nacional corresponde a información recolectada entre los meses de marzo a diciembre del 2010 y la estimación a nivel departamental corresponde a información recopilada en los años 2009 y 2010.

Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.

CUADRO N° 08: PROPORCIÓN DE MENORES DE 36 MESES CON VACUNAS BÁSICAS COMPLETAS PARA SU EDAD, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO Y CARACTERÍSTICAS, 2007, 2009, 2010

Ámbito geográfico / Características	2007 al				2009				2010			
	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		C.V.	Casos sin Ponderar	
								Inferior	Superior			
Total	64,3	2,7	1 562	54,8	1,9	5 880	61,8	59,7	63,9	1,7	5 373	
Área de residencia												
Urbana	66,8	3,4	720	56,4	2,4	3 317	63,4	60,7	66,1	2,1	2 939	
Rural	60,8	4,4	842	51,6	2,9	2 563	58,8	55,5	62,2	2,9	2 434	
Región natural												
Costa	65,7	4,3	411	56,4	3,2	1 830	62,8	59,5	66,2	2,7	1 693	
Lima Metropolitana	67,4	6,8	86	54,7	5,5	423	60,8	55,2	66,4	4,7	368	
Resto costa	64,0	5,2	325	58,4	2,9	1 407	64,9	61,3	68,6	2,8	1 325	
Sierra	64,4	3,7	723	55,0	2,5	2 353	63,2	60,1	66,2	2,4	2 209	
Sierra urbana	68,1	4,8	198	54,3	3,8	853	66,6	62,2	71,1	3,4	791	
Sierra rural	62,6	4,9	525	55,4	3,3	1 500	61,0	57,0	65,0	3,4	1 418	
Selva	59,6	6,9	428	49,6	4,1	1 697	55,4	51,0	59,8	4,1	1 471	
Selva urbana	67,5	6,1	197	58,8	4,1	815	63,6	58,2	69,1	4,4	700	
Selva rural	53,3	12,5	231	41,0	7,8	882	48,3	41,7	55,0	7,0	771	
Nivel de educación												
Sin educación/Primaria	61,8	4,0	688	50,4	3,1	2 170	54,7	51,3	58,0	3,1	2 056	
Secundaria	64,0	4,0	596	54,1	2,9	2 557	63,9	61,0	66,9	2,3	2 296	
Superior	69,2	5,6	278	61,9	3,4	1 153	68,4	64,1	72,7	3,2	1 021	
Quintil de riqueza												
Quintil inferior	60,2	5,3	529	47,1	3,7	1 747	54,0	50,1	57,9	3,7	1 678	
Segundo quintil	63,0	4,9	440	57,2	3,0	1 558	62,6	59,3	65,9	2,7	1 387	
Quintil intermedio	62,6	5,3	312	53,6	3,8	1 298	63,7	59,3	68,0	3,5	1 186	
Cuarto quintil	70,9	7,6	151	59,1	4,6	824	63,2	57,8	68,7	4,4	711	
Quintil superior	70,7	8,3	130	60,2	5,4	453	70,3	64,7	75,9	4,1	411	
Ámbito JUNTOS	58,6	3,6	1 718	53,5	3,8	1 342	65,9	61,6	70,3	3,4	1 126	

Nota: - Los Estimadores con Coeficiente de Variación (C.V.) mayor a 15,0% deben ser considerados como referenciales.

- Vacunas Básicas Completas incluye 1 Dosis de BCG, 3 Dosis de DPT, 3 Dosis contra la Poliomielitis y 1 Dosis contra el Sarampión.

a/ La estimación de cobertura nacional son realizadas con los datos captados en el año 2007 y la estimación del ámbito JUNTOS (638 distrito) son realizadas con información captada en el periodo 2005-2007, 1er. Trimestre 2008 y la ampliación muestral. Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2007, 2009 y 2010.

CUADRO Nº 08A: PROPORCIÓN DE MENORES DE 36 MESES CON VACUNAS BÁSICAS COMPLETAS PARA SU EDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO, JUNIO 2007, 2009 Y 2010

Departamento	Junio 2007 a/				2009				2010			
	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		C.V.	Casos sin Ponderar	
								Inferior	Superior			
Total	64,3	2,7	1 562	54,8	1,9	5 880	61,8	59,7	63,9	1,7	5 373	
Amazonas	55,8	9,6	312	60,7	6,7	266	58,0	49,1	66,9	7,8	246	
Ancash	58,8	6,2	273	63,7	5,0	230	69,3	63,2	75,5	4,5	207	
Apurímac	72,1	5,4	305	62,3	5,5	221	79,9	74,2	85,7	3,7	201	
Arequipa	69,2	5,1	276	58,2	5,5	162	64,2	56,3	72,1	6,3	165	
Ayacucho	59,3	6,2	346	60,6	6,5	248	63,0	55,1	70,9	6,4	247	
Cajamarca	66,2	4,4	289	55,4	8,1	271	59,4	50,5	68,4	7,7	249	
Cusco	61,7	6,9	211	53,9	6,1	181	70,5	62,7	78,3	5,6	224	
Huancavelica	59,9	7,1	366	71,4	5,0	219	75,5	69,4	81,6	4,1	180	
Huánuco	58,0	6,1	271	54,8	6,9	231	67,0	59,6	74,4	5,6	205	
Ica	48,3	7,0	298	54,9	7,2	218	55,8	48,7	62,9	6,5	195	
Junín	55,5	7,5	228	51,7	8,5	218	62,9	53,5	72,4	7,7	210	
La Libertad	54,4	6,4	300	50,9	8,4	215	65,2	57,4	73,0	6,1	245	
Lambayeque	57,6	6,3	293	52,2	8,2	162	60,2	48,2	72,2	10,2	167	
Lima	66,8	4,0	441	54,8	5,0	476	60,9	55,6	66,3	4,5	415	
Loreto	51,6	6,6	452	40,7	9,6	354	48,4	38,6	58,2	10,3	318	
Madre de Dios	51,4	5,2	448	44,7	6,5	300	56,9	49,3	64,5	6,8	231	
Moquegua	71,0	4,0	204	71,8	5,1	187	63,5	54,9	72,1	6,9	172	
Pasco	46,3	6,2	337	46,3	9,6	281	71,5	64,5	78,5	5,0	223	
Piura	62,4	6,3	302	55,5	6,6	265	59,2	52,4	66,0	5,9	269	
Puno	62,0	6,2	271	51,8	7,9	224	51,7	44,3	59,1	7,3	202	
San Martín	67,7	5,0	350	51,1	7,5	234	61,2	52,8	69,6	7,0	237	
Tacna	64,1	6,2	219	61,3	6,7	162	66,0	56,3	75,7	7,5	117	
Tumbes	69,7	4,1	308	64,7	5,3	228	75,2	69,4	80,9	3,9	187	
Ucayali	58,8	5,7	418	51,7	8,2	327	55,5	45,6	65,4	9,1	261	

Nota: - Los Estimadores con Coeficiente de Variación (C.V.) mayor a 15,0% deben ser considerados como referenciales.

- Vacunas Básicas Completas incluye 1 Dosis de BCG, 3 Dosis de DPT, 3 Dosis contra la Poliomielitis y 1 Dosis contra el Sarampión.

a/ La estimación a nivel nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007 y la estimación a nivel departamental corresponde a información recopilada en los años 2005, 2006, 2007 y 1er. trimestre 2008 más ampliación muestral, la mediana de fecha de entrevistas es junio 2007.

Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.

CUADRO N° 09: PROPORCIÓN DE MENORES DE 12 MESES CON VACUNAS BÁSICAS COMPLETAS PARA SU EDAD, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO Y CARACTERÍSTICAS, 2007, 2009 Y 2010

Ámbito geográfico / Características	2007 a/			2009			2010			
	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Intervalo de confianza al 95%		C.V.	Casos sin Ponderar
							Inferior	Superior		
Total	68,4	3,7	479	61,5	2,7	2 009	64,1	70,4	2,4	1 679
Área de residencia										
Urbana	70,6	4,6	240	63,3	3,5	1 121	67,0	75,0	2,9	920
Rural	64,8	6,3	239	58,2	3,8	888	60,5	65,4	4,1	759
Región natural										
Costa	70,1	6,3	131	65,0	4,4	625	66,2	76,8	3,8	502
Lima Metropolitana	66,7	8,9	33	62,3	7,5	144	63,9	81,0	6,0	118
Resto costa	74,5	8,9	98	68,1	4,4	481	64,5	76,3	4,3	384
Sierra	69,7	4,8	216	62,4	3,7	794	64,5	69,0	3,6	703
Sierra urbana	73,8	4,5	66	61,5	6,6	279	66,4	73,2	5,2	261
Sierra rural	67,4	7,3	150	62,9	4,3	515	63,2	69,1	4,8	442
Selva	58,5	10,4	132	49,4	5,1	590	62,1	68,6	5,4	474
Selva urbana	68,6	11,6	67	56,6	5,8	281	71,8	78,9	5,0	225
Selva rural	49,1	19,0	65	43,2	9,1	309	54,1	64,3	9,6	249
Nivel de educación										
Sin educación/Primaria	67,2	5,9	191	56,3	4,5	702	52,7	63,3	4,6	592
Secundaria	69,0	6,6	198	60,0	3,7	920	65,4	74,7	3,4	761
Superior	69,4	8,7	90	70,7	4,6	387	68,1	80,1	4,1	326
Quintil de riqueza										
Quintil inferior	63,1	8,4	148	51,1	5,6	590	48,6	59,8	5,3	518
Segundo quintil	64,0	6,2	140	67,2	3,7	535	68,6	73,9	4,0	440
Quintil intermedio	70,2	9,1	94	57,5	6,0	467	69,7	76,6	5,0	369
Cuarto quintil	78,2	9,9	52	66,1	6,7	277	71,7	79,7	5,6	221
Quintil superior	71,6	13,7	45	72,6	6,5	140	81,0	89,3	5,2	131
Ámbito JUNTOS	63,4	4,4	520	56,8	5,3	457	65,6	72,3	5,2	352

Nota: - Los Estimadores con Coeficiente de Variación (C.V.) mayor a 15,0% deben ser considerados como referenciales.

- Vacunas Básicas Completas incluye 1 Dosis de BCG, 3 Dosis de DPT, 3 Dosis contra la Poliomielitis y 1 Dosis contra el Sarampión.

a/ La estimación de cobertura nacional son realizadas con los datos captados en el año 2007; y la estimación del ámbito JUNTOS (638 distrito) son realizadas con información captada en el periodo 2005-2007, 1er. Trimestre 2008 y la ampliación muestral. Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2007, 2009 y 2010.

CUADRO N° 09A: PROPORCIÓN DE MENORES DE 12 MESES CON VACUNAS BÁSICAS COMPLETAS PARA SU EDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO, JUNIO 2007, 2009 Y 2010

Departamento	Junio 2007 al				2009				2010			
	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		C.V.	Casos sin Ponderar	
								Inferior	Superior			
Total	68,4	3,7	479	61,5	2,7	2 009	67,3	64,1	70,4	2,4	1 679	
Amazonas	59,4	11,1	91	62,3	9,8	92	59,4	47,5	71,4	10,2	72	
Áncash	69,6	6,5	90	74,6	5,8	75	76,1	64,3	87,8	7,9	64	
Apurímac	75,3	7,0	101	79,4	6,7	63	80,7	72,1	89,2	5,4	53	
Arequipa	78,4	5,8	88	65,0	12,3	52	57,5	44,2	70,7	11,7	61	
Ayacucho	61,9	8,0	101	70,9	9,8	85	68,6	56,5	80,7	9,0	87	
Cajamarca	74,6	5,8	90	64,1	7,6	104	58,7	46,7	70,7	10,4	88	
Cusco	69,9	7,0	76	72,6	9,0	61	69,1	55,4	82,7	10,1	76	
Huancaavelica	61,7	7,3	112	81,2	5,6	73	74,7	63,2	86,3	7,9	51	
Huanuco	73,2	6,6	90	56,8	11,1	77	69,7	60,4	79,0	6,8	69	
Ica	50,0	12,2	102	64,3	9,3	85	65,2	53,2	77,2	9,4	68	
Junin	57,2	14,5	63	56,7	11,2	76	58,6	41,3	75,9	15,0	74	
La Libertad	45,5	13,5	87	51,8	14,0	83	77,9	66,2	89,5	7,6	62	
Lambayeque	69,4	7,3	97	67,6	11,8	49	53,0	39,2	66,8	13,3	47	
Lima	72,8	4,8	158	64,8	6,7	163	73,2	65,2	81,2	5,6	129	
Loreto	46,9	10,3	155	35,8	11,3	119	46,0	34,5	57,4	12,7	74	
Madre de Dios	62,3	5,6	151	58,5	7,3	107	70,1	57,9	82,3	8,9	88	
Moquegua	77,4	5,7	62	74,6	6,9	63	67,0	51,1	82,9	12,1	49	
Pasco	64,1	6,6	114	48,1	10,8	102	80,2	71,2	89,2	5,7	74	
Piura	65,2	10,0	86	57,3	11,2	86	68,9	56,5	81,4	9,2	87	
Puno	64,6	7,9	80	53,2	11,5	69	58,2	44,2	72,2	12,3	60	
San Martín	72,9	6,3	118	46,8	13,8	72	67,4	58,1	76,8	7,0	87	
Tacna	71,6	8,1	71	74,5	6,0	53	85,7	72,4	98,9	7,9	30	
Tumbes	68,8	7,5	106	72,0	7,9	75	84,0	74,4	93,6	5,8	50	
Ucayali	62,3	8,2	134	50,9	12,0	125	62,9	50,8	75,0	9,8	79	

Nota: - Los Estimadores con Coeficiente de Variación (C.V.) mayor a 15,0% deben ser considerados como referenciales.

- Vacunas Básicas Completas incluye 1 Dosis de BCG, 3 Dosis de DPT, 3 Dosis contra la Poliomielitis y 1 Dosis contra el Sarampión

a/ La estimación a nivel nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007 y la estimación a nivel departamental corresponde a información recopilada en los años 2005, 2006, 2007 y 1er. trimestre 2008 más ampliación muestral la mediana de fecha de entrevistas es junio 2007.

Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.

CUADRO N° 10: PROPORCIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS DE 18 A 29 MESES DE EDAD CON VACUNAS BÁSICAS COMPLETAS, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO Y CARACTERÍSTICAS, 2007, 2009 Y 2010

Ámbito geográfico / Características	2007 a/				2009				2010			
	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		C.V.	Casos sin Ponderar	
								Inferior	Superior			
Total	61,3	4,5	562	51,4	3,1	1 876	58,6	55,4	61,8	2,7	1 884	
Área de residencia												
Urbana	61,3	6,7	243	53,2	3,9	1 077	59,3	55,1	63,5	3,5	1 054	
Rural	61,4	6,0	319	47,9	4,8	799	57,2	52,4	62,0	4,2	830	
Región natural												
Lima Metropolitana	64,0	15,2	25	51,6	9,1	121	53,6	45,2	61,9	7,8	130	
Resto Costa	61,1	7,7	117	52,5	5,1	435	63,3	57,1	69,4	4,9	493	
Sierra	60,4	6,3	274	50,5	4,2	765	60,7	56,4	65,0	3,5	755	
Selva	61,7	7,2	146	52,1	5,6	555	54,1	46,7	61,5	6,8	506	
Nivel de educación												
Sin educación/Primaria	n.d.	n.d.	n.d.	48,5	4,8	720	51,2	46,2	56,3	4,9	722	
Secundaria	n.d.	n.d.	n.d.	50,7	5,2	764	60,4	55,4	65,3	4,1	785	
Superior	n.d.	n.d.	n.d.	56,6	6,3	392	66,6	59,2	74,0	5,5	377	
Quintil de riqueza												
Quintil inferior	n.d.	n.d.	n.d.	45,0	5,7	565	53,8	47,7	59,9	5,7	570	
Segundo quintil	n.d.	n.d.	n.d.	51,8	5,6	483	57,2	51,5	62,9	5,0	472	
Quintil intermedio	n.d.	n.d.	n.d.	53,5	6,0	418	61,9	55,2	68,6	5,4	409	
Cuarto quintil	n.d.	n.d.	n.d.	56,2	7,8	260	61,1	52,2	70,0	7,3	262	
Quintil superior	n.d.	n.d.	n.d.	52,0	11,4	150	61,1	50,8	71,4	8,4	171	

Nota: - Los Estimadores con Coeficiente de Variación (C.V.) mayor a 15,0% deben ser considerados como referenciales.

- Vacunas Básicas Completas incluye 1 Dosis de BCG, 3 Dosis de DP1, 3 Dosis contra la Poliomielitis y 1 Dosis contra el Sarampión.
nd = no disponible.

a/ La estimación de cobertura nacional son realizadas con los datos captados en el año 2007; y la estimación del ámbito JUNTOS (638 distritos) son realizadas con información captada en el periodo 2005-2007, 1er. trimestre 2008 y la ampliación muestral.
Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2007, 2009 y 2010.

CUADRO N° 10A: PROPORCIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS DE 18 A 29 MESES DE EDAD CON VACUNAS BÁSICAS COMPLETAS, SEGÚN DEPARTAMENTO, JUNIO 2007, 2009 Y 2010

Departamento	Junio 2007 a/				2009				2010			
	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		C.V.	Casos sin Ponderar	
								Inferior	Superior			
Total	61,3	4,5	562	51,4	3,1	1 876	58,6	55,4	61,8	2,7	1 884	
Amazonas	52,4	11,9	99	59,2	8,2	94	60,5	48,1	72,8	10,2	83	
Ancash	51,6	13,5	90	58,4	9,7	81	61,1	50,3	71,8	8,8	76	
Apurímac	61,3	10,6	109	54,6	11,1	82	84,4	74,2	94,7	6,1	78	
Arequipa	42,3	12,7	97	46,0	15,8	51	67,7	56,6	78,8	8,2	60	
Ayacucho	52,8	12,0	121	52,7	10,7	82	62,7	49,1	76,4	10,9	69	
Cajamarca	60,1	9,4	105	45,6	14,8	72	59,1	45,6	72,6	11,4	83	
Cusco	50,6	12,7	84	46,3	12,5	66	69,3	59,5	79,1	7,1	75	
Huancavelica	54,3	11,8	114	69,6	9,1	75	81,3	69,6	93,0	7,2	57	
Huánuco	55,2	10,8	81	64,6	9,7	74	59,4	47,9	70,9	9,7	64	
Ica	40,5	11,2	96	55,7	11,7	67	56,7	43,4	69,9	11,7	69	
Junín	54,8	10,4	75	48,3	15,1	69	61,3	48,5	74,2	10,5	69	
La Libertad	45,2	12,5	107	43,8	14,6	67	62,4	50,9	73,9	9,2	100	
Lambayeque	40,6	14,4	89	40,3	17,1	51	68,5	46,4	90,5	16,1	54	
Lima	56,6	7,7	148	52,5	8,0	137	51,7	43,8	59,6	7,6	149	
Loreto	58,1	7,8	153	41,9	11,2	112	53,9	38,3	69,6	14,5	129	
Madre de Dios	28,9	19,9	150	31,9	14,6	101	50,1	38,4	61,9	11,7	76	
Moquegua	56,9	11,6	72	70,8	7,7	66	60,9	46,0	75,7	12,2	64	
Pasco	36,9	14,4	122	36,1	18,0	90	58,9	45,5	72,2	11,3	66	
Piura	62,6	8,6	116	47,5	13,9	74	58,5	46,6	70,5	10,2	93	
Puno	59,5	9,5	100	49,4	12,1	67	47,0	36,2	57,9	11,5	77	
San Martín	55,0	11,6	102	64,7	9,6	81	56,5	44,2	68,7	10,8	75	
Tacna	53,1	11,3	68	52,9	14,4	48	60,0	46,7	73,3	11,1	52	
Tumbes	52,4	11,7	94	67,8	7,0	74	69,9	59,6	80,2	7,4	72	
Ucayali	49,5	9,9	140	56,9	11,0	95	57,1	44,8	69,3	10,8	94	

Nota: - Los Estimadores con Coeficiente de Variación (C.V.) mayor a 15,0% deben ser considerados como referenciales.

- Vacunas Básicas Completas incluye 1 Dosis de BCG, 3 Dosis de DPT, 3 Dosis contra la Poliomielitis y 1 Dosis contra el Sarampión.

a/ La estimación a nivel nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007 y la estimación a nivel departamental corresponde a información recolectada en los años 2005, 2006, 2007 y 1er. trimestre 2008 más ampliación muestral, la mediana de fecha de entrevistas es junio 2007.

Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar: ENDES 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.

CUADRO N° 11: PROPORCIÓN DE MENORES DE 36 MESES CON TODAS SUS VACUNAS BÁSICAS PARA SU EDAD, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO Y CARACTERÍSTICAS, 2009 Y 2010

Ámbito geográfico / Características	2009		2010 a/		Casos sin Ponderar	C.V.	Casos sin Ponderar	
	Valor estimado	C.V.	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%				
				Inferior				Superior
Total	27,4	3,1	22,5	21,0	24,1	3,5	5 373	
Área de residencia								
Urbana	27,8	4,2	23,6	21,5	25,8	4,7	2 939	
Rural	26,7	4,5	20,5	18,6	22,5	4,9	2 434	
Región natural								
Costa	27,6	5,5	22,9	20,2	25,7	6,0	1 693	
Lima Metropolitana	26,4	9,2	24,8	20,2	29,4	9,4	368	
Resto Costa	28,9	5,5	21,0	18,2	23,9	7,0	1 325	
Sierra	28,7	4,1	22,6	20,5	24,8	4,8	2 209	
Sierra urbana	28,0	6,6	23,4	19,7	27,2	8,1	791	
Sierra rural	29,1	5,2	22,1	19,5	24,7	6,0	1 418	
Selva	24,0	6,1	21,1	18,3	23,9	6,7	1 471	
Selva urbana	27,9	6,9	24,2	20,2	28,3	8,6	700	
Selva rural	20,4	11,1	18,4	14,6	22,2	10,6	771	
Nivel de educación								
Sin educación/Primaria	25,1	5,0	18,1	16,1	20,2	5,7	2 056	
Secundaria	26,4	4,7	25,0	22,5	27,5	5,1	2 296	
Superior	32,4	6,1	24,2	20,7	27,6	7,3	1 021	
Quintil de riqueza								
Quintil inferior	23,5	5,5	19,0	16,7	21,3	6,1	1 678	
Segundo quintil	28,2	5,2	21,9	19,1	24,7	6,5	1 387	
Quintil intermedio	27,7	5,8	23,6	20,0	27,2	7,9	1 186	
Cuarto quintil	30,5	7,7	24,1	19,8	28,4	9,1	711	
Quintil superior	28,4	10,0	26,7	21,7	31,8	9,6	411	
Ámbito JUNTOS	28,9	5,5	23,4	20,1	26,6	7,1	1 126	

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación (C.V.) mayor a 15,0% deben ser considerados como referenciales.
a/ Todas sus Vacunas Básicas incluye las indicadas en el Cuadro 08 y 09 más 2 Dosis contra la Influenza, 1 Dosis SPR, 1 Dosis Antiamarilla y 1 Dosis Refuerzo DPT, según RMN° 610-2007/MINSA.
Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2009 y 2010.

CUADRO Nº 11A: PROPORCIÓN DE MENORES DE 36 MESES CON TODAS SUS VACUNAS BÁSICAS PARA SU EDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2009 Y 2010

Departamento	2009			2010 a/			
	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Intervalo de confianza al 95%		C.V.	
				Inferior	Superior		
Total	27,4	3,1	5 880	21,0	24,1	3,5	5 373
Amazonas	32,2	12,4	266	15,2	27,0	14,2	246
Áncash	31,0	8,3	230	18,5	31,4	13,2	207
Apurímac	35,9	9,1	221	19,0	28,9	10,5	201
Arequipa	27,2	13,7	162	16,4	28,2	13,5	165
Ayacucho	34,9	9,9	248	18,3	31,4	13,4	247
Cajamarca	26,3	13,3	271	16,6	28,6	13,5	249
Cusco	42,8	8,5	181	19,2	34,7	14,7	224
Huanavelica	38,6	9,6	219	17,8	30,3	13,2	180
Huánuco	34,9	9,4	231	20,0	31,1	11,1	205
Ica	29,2	12,1	218	16,1	27,2	13,0	195
Junín	20,2	15,3	218	15,1	27,9	15,2	210
La Libertad	25,0	11,1	215	14,5	25,9	14,3	245
Lambayeque	32,9	12,0	162	11,3	22,8	17,2	167
Lima	27,3	8,5	476	20,2	28,8	9,0	415
Loreto	14,4	13,4	354	8,3	15,3	15,1	318
Madre de Dios	32,9	9,6	300	23,2	35,3	10,5	231
Moquegua	29,2	11,4	187	12,0	26,5	19,2	172
Pasco	19,7	13,5	281	24,2	34,1	8,7	223
Piura	22,9	10,0	265	15,4	26,5	13,6	269
Puno	24,0	15,3	224	12,7	25,3	16,9	202
San Martín	21,0	15,3	234	21,5	32,6	10,5	237
Tacna	17,7	17,0	162	14,8	29,4	16,8	117
Tumbes	36,2	9,4	228	20,6	33,2	11,9	187
Ucayali	33,4	10,9	327	13,7	26,1	15,9	261

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación (C.V.) mayor a 15,0% deben ser considerados como referenciales.

a/ Todas sus Vacunas Básicas incluye las indicadas en el Cuadro 08 y 09 más 2 Dosis contra la Influenza, 1 Dosis SPR, 1 Dosis Antiamarílica y 1 Dosis Refuerzo DPT, según RMN° 610-2007/MINSA.

Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES 2009 y 2010

CUADRO N° 12: PROPORCIÓN DE MENORES DE 36 MESES CON CONTROLES DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO (CRED) COMPLETO PARA SU EDAD, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO Y CARACTERÍSTICAS, 2007, 2009 Y 2010

Ámbito geográfico / Características	2007 a/			2009			2010		
	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Intervalo de confianza al 95%		Casos sin Ponderar
							Inferior	Superior	
Total	24,0	6,7	1 562	27,7	3,5	5 880	37,9	42,0	5 373
Área de residencia									
Urbana	23,9	9,3	720	27,3	4,4	3 317	35,0	40,3	2 939
Rural	24,0	9,5	842	28,5	5,6	2 563	41,0	47,3	2 434
Región natural									
Costa	26,7	9,8	411	28,7	5,9	1 830	31,3	38,0	1 693
Lima Metropolitana	27,9	15,5	86	28,9	9,1	423	29,3	40,6	368
Resto Costa	25,6	11,9	325	28,4	7,1	1 407	30,7	37,9	1 325
Sierra	23,1	10,3	723	28,8	4,5	2 353	44,6	50,7	2 209
Sierra urbana	15,7	20,5	198	25,8	7,6	853	41,2	50,1	791
Sierra rural	26,5	11,9	525	30,8	5,4	1 500	44,8	53,0	1 418
Selva	18,4	16,5	428	22,6	8,5	1 697	33,8	41,8	1 471
Selva urbana	22,2	21,6	197	24,0	8,4	815	37,0	47,1	700
Selva rural	15,3	26,1	231	21,2	15,2	882	28,1	40,1	771
Nivel de educación									
Sin educación/Primaria	22,4	9,8	688	22,8	5,9	2 170	35,1	41,6	2 056
Secundaria	21,4	10,1	596	27,1	4,8	2 557	34,7	40,7	2 296
Superior	31,4	12,7	278	35,5	6,0	1 153	42,8	51,7	1 021
Quintil de riqueza									
Quintil inferior	21,6	13,6	529	27,0	7,6	1 747	38,6	46,2	1 678
Segundo quintil	23,1	11,4	440	22,9	6,1	1 558	36,1	43,2	1 387
Quintil intermedio	24,3	16,6	312	24,0	6,9	1 298	31,8	39,6	1 186
Cuarto quintil	21,6	19,1	151	28,1	8,7	824	32,4	42,5	711
Quintil superior	32,5	15,1	130	43,1	6,9	453	40,1	53,4	411
Ámbito JUNTOS	21,7	7,6	1 718	33,1	6,6	1 342	47,2	56,6	1 126

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación (C.V) mayor a 15,0% deben ser considerados como referenciales.

a/ La estimación de cobertura nacional son realizadas con los datos captados en el año 2007 y la estimación del ámbito JUNTOS (638 distritos) son realizadas con información captada en el periodo 2005-2007, 1er. trimestre 2008 y la ampliación muestral.

Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2007, 2009 y 2010.

CUADRO N° 12A: PROPORCIÓN DE MENORES DE 36 MESES CON CONTROLES DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO (CRED) COMPLETO PARA SU EDAD, SEGÚN DEPARTAMENTO, JUNIO 2007, 2009 Y 2010

Departamento	Junio 2007 al			2009			2010				
	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Intervalo de confianza al 95%		Casos sin Ponderar		
							Inferior	Superior			
Total	24,0	6,7	1 562	27,7	3,5	5 880	40,0	37,9	42,0	2,6	5 373
Amazonas	17,0	18,4	312	29,2	13,1	266	38,7	29,4	48,0	12,3	246
Ancash	31,8	9,6	273	41,6	8,5	230	54,7	46,7	62,7	7,5	207
Apurímac	48,6	8,4	305	58,5	7,5	221	62,2	54,1	70,4	6,7	201
Arequipa	26,1	11,2	276	27,5	13,9	162	36,7	27,5	45,9	12,8	165
Ayacucho	19,5	16,2	346	42,3	9,6	248	52,3	44,0	60,6	8,1	247
Cajamarca	27,9	13,3	289	37,6	11,7	271	56,3	46,5	66,2	8,9	249
Cusco	20,8	14,2	211	32,5	10,7	181	50,5	41,3	59,7	9,3	224
Huancaavelica	20,9	14,1	366	15,5	18,7	219	38,7	28,3	49,1	13,7	180
Huánuco	24,1	13,3	271	47,8	7,9	231	69,9	64,1	75,7	4,2	205
Ica	14,1	14,2	298	22,2	18,2	218	26,9	19,6	34,3	14,0	195
Junín	10,7	22,2	228	14,5	16,5	218	37,4	29,0	45,8	11,5	210
La Libertad	19,4	14,0	300	14,2	19,1	215	25,4	18,1	32,7	14,7	245
Lambayeque	21,9	12,4	293	31,4	12,1	162	38,6	29,9	47,4	11,5	167
Lima	29,5	8,1	441	30,4	8,7	476	35,7	30,4	41,0	7,5	415
Loreto	9,0	21,3	452	8,2	21,6	354	24,8	17,4	32,1	15,2	318
Madre de Dios	21,0	9,5	448	26,9	10,2	300	29,8	21,5	38,2	14,3	231
Moquegua	28,4	11,1	204	26,9	13,9	187	51,5	42,7	60,4	8,7	172
Pasco	13,4	15,1	337	27,5	8,8	281	51,1	42,5	59,7	8,6	223
Plura	18,4	16,1	302	23,7	12,2	265	30,2	24,5	35,9	9,7	269
Puno	19,1	16,5	271	18,5	20,7	224	40,2	32,5	47,9	9,8	202
San Martín	24,8	12,6	350	22,0	13,6	234	45,3	37,0	53,5	9,3	237
Tacna	26,9	12,7	219	25,1	12,2	162	42,9	32,9	52,9	11,9	117
Tumbes	22,8	10,8	308	16,6	18,9	228	41,6	32,1	51,1	11,6	187
Ucayali	24,1	13,0	418	24,4	12,5	327	37,3	28,6	46,1	12,0	261

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación (C.V.) mayor a 15,0% deben ser considerados como referendiales.

a/ La estimación a nivel nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007 y la estimación a nivel departamental corresponde a información recopilada los años 2005, 2006, 2007 y 1er. trimestre 2008 más ampliación muestral, la mediana de fecha de entrevistas es junio 2007.

Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar: ENDES 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.

CUADRO Nº 13: PROPORCIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A MENOS DE 36 MESES DE EDAD QUE RECIBIERON SUPLEMENTO DE HIERRO, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO Y CARACTERÍSTICAS, 2007, 2009 Y 2010

Ámbito geográfico / Características	2007 a/			2009			2010 b/			
	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	
							Intervalo de confianza al 95%			
						Inferior	Superior			
Total	12,3	10,7	1 325	14,1	4,8	4 974	16,9	19,9	4,1	4 600
Área de residencia										
Urbana	13,0	15,2	598	12,6	6,7	2 810	14,3	18,1	6,0	2 507
Rural	11,4	13,9	727	17,0	6,5	2 164	20,0	24,7	5,4	2 093
Región natural										
Costa	12,2	20,7	356	12,7	8,8	1 542	12,2	16,9	8,3	1 461
Lima Metropolitana	11,4	36,3	70	13,1	13,1	364	9,8	16,9	13,6	314
Resto Costa	12,8	23,6	286	12,3	11,1	1 178	12,7	18,9	10,1	1 147
Sierra	12,5	12,2	616	15,9	6,2	1 987	23,7	28,7	4,8	1 891
Sierra urbana	11,7	14,2	156	13,2	11,1	732	18,3	25,9	8,7	677
Sierra rural	12,9	16,2	460	17,7	7,5	1 255	25,5	32,1	5,8	1 214
Selva	11,6	24,4	353	14,1	9,2	1 445	9,4	14,2	10,2	1 248
Selva urbana	15,3	35,3	163	13,8	13,1	689	8,3	15,0	14,6	583
Selva rural	8,6	34,2	190	14,4	12,9	756	8,6	15,2	14,3	665
Nivel de educación										
Sin educación/Primaria	13,1	14,1	584	15,8	7,5	1 852	17,8	22,7	6,2	1 780
Secundaria	11,9	17,1	506	13,4	7,3	2 134	14,0	18,3	6,9	1 942
Superior	11,3	23,9	235	13,2	10,8	988	16,6	24,0	9,3	878
Quintil de riqueza										
Quintil inferior	10,0	16,6	454	17,5	8,1	1 477	19,8	25,7	6,6	1 435
Segundo quintil	16,4	12,2	371	13,8	8,4	1 294	16,2	22,1	7,9	1 192
Quintil intermedio	11,4	25,2	266	12,7	11,9	1 105	11,3	16,9	10,2	1 006
Cuarto quintil	4,4	41,7	124	10,4	14,2	705	14,1	22,4	11,6	620
Quintil superior	18,9	26,5	110	16,1	14,2	393	11,5	21,0	15,0	347
Ámbito JUNTOS	14,7	10,4	1 114	20,4	8,0	1 124	27,5	36,1	6,9	966

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación (C.V.) mayor a 15,0% deben ser considerados como referenciales.

a/ La estimación de cobertura nacional son realizadas con los datos captados en el año 2007; y la estimación del ámbito JUNTOS (638 distritos) son realizadas con información captada en el periodo 2005-2007, 1er. trimestre 2008 y la ampliación muestral.

b/ El tema es objeto de investigación a partir del año 2007.

Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2007, 2009 y 2010.

CUADRO N° 13A: PROPORCIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A MENOS DE 36 MESES DE EDAD QUE RECIBIERON SUPLEMENTO DE HIERRO, SEGÚN DEPARTAMENTO, JUNIO 2007 Y 2010

Departamento	Junio 2007 a/			2009-2010 b/			Casos sin Ponderar
	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Intervalo de confianza al 95%		C.V.	
				Inferior	Superior		
Total	12,3	10,7	1 325	16,9	19,9	4,1	4 600
Amazonas	6,2	28,6	195	6,0	13,7	20,0	445
Ancash	15,6	20,1	191	11,6	20,1	13,7	382
Apurímac	32,1	13,6	201	43,8	54,4	5,5	371
Arequipa	12,9	18,7	202	14,8	24,7	12,8	281
Ayacucho	21,4	19,2	247	21,9	31,2	8,9	411
Cajamarca	14,4	20,7	207	14,9	24,4	12,3	426
Cusco	10,5	28,4	138	18,9	30,0	11,5	341
Huancavelica	21,7	18,3	218	36,9	48,4	6,9	348
Huánuco	15,1	18,8	165	26,7	37,8	8,8	364
Ica	6,7	25,4	197	4,5	9,8	19,0	342
Junín	5,6	45,4	151	13,4	17,4	15,1	364
La Libertad	6,0	29,5	198	8,4	11,6	19,5	387
Lambayeque	10,9	21,0	208	20,8	25,8	12,3	283
Lima	10,6	18,1	279	13,3	15,8	9,5	762
Loreto	17,1	22,4	250	14,2	17,3	11,1	596
Madre de Dios	14,0	14,5	323	22,2	27,7	12,7	436
Moquegua	4,1	36,6	146	8,3	11,7	20,7	318
Pasco	12,9	18,9	225	24,1	28,5	9,4	417
Piura	8,4	25,6	208	13,2	16,9	14,6	445
Puno	5,1	33,1	156	7,3	10,3	21,3	367
San Martín	13,8	19,1	232	4,7	7,1	26,2	401
Tacna	8,2	25,3	162	2,9	10,7	29,5	242
Tumbes	14,0	14,4	213	24,1	29,4	11,2	355
Ucayali	13,4	17,9	282	14,5	18,5	13,9	490

Nota: - Los Estimadores con Coeficiente de Variación (C.V.) mayor a 15,0% deben ser considerados como referenciales.

- El tema es objeto de investigación a partir del año 2007.

a/ La estimación a nivel nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007 y la estimación a nivel departamental corresponde a información recolectada en los años 2005, 2006, 2007 y 1er. trimestre 2008 más ampliación muestral, la mediana de fecha de entrevistas es junio 2007.

b/ La estimación a nivel nacional corresponde a información recolectada entre los meses de marzo a diciembre del 2010 y la estimación a nivel departamental corresponde a información recolectada en los años 2009 y 2010.

Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar: ENDES 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.

CUADRO N° 14: PROPORCIÓN DE HOGARES CON ACCESO A AGUA TRATADA, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO Y CARACTERÍSTICAS, 2000, 2007, 2009 Y 2010

Ámbito geográfico / Características	2000			2007 a/			2009			2010				
	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Intervalo de confianza al 95%		C.V.	Casos sin Ponderar	
										Inferior	Superior			
Total	84,4	0,6	28 900	92,9	0,6	7 188	91,1	0,4	26 834	91,5	90,8	92,2	0,4	26 605
Área de residencia														
Urbana	93,9	0,4	15 465	96,8	0,4	3 741	96,3	0,3	15 640	95,9	95,2	96,5	0,3	15 607
Rural	68,1	1,7	13 435	85,3	1,8	3 447	80,4	1,2	11 194	82,2	80,4	83,9	1,1	10 998
Región natural														
Costa	94,1	0,6	9 867	97,9	0,4	2 238	96,5	0,4	9 066	95,9	95,1	96,7	0,4	9 072
Lima Metropolitana	98,1	0,3	2 767	99,8	0,2	623	99,4	0,1	2 200	98,5	97,8	99,2	0,4	2 183
Resto Costa	89,3	1,3	7 100	95,3	0,9	1 615	92,9	0,8	6 866	92,9	91,3	94,5	0,9	6 889
Sierra	77,2	1,3	12 983	91,0	1,4	3 443	88,1	0,9	11 911	90,5	89,2	91,8	0,7	11 978
Sierra urbana	91,3	1,1	4 141	97,0	0,8	1 048	96,2	0,5	4 473	96,4	95,2	97,6	0,7	4 569
Sierra rural	70,0	1,9	8 842	87,3	2,1	2 395	82,7	1,4	7 438	86,3	84,3	88,3	1,2	7 409
Selva	64,7	2,6	6 050	76,9	3,9	1 507	79,0	1,8	5 857	75,3	72,0	78,6	2,2	5 555
Selva urbana	76,4	2,8	2 912	81,9	4,1	739	87,0	1,9	3 167	86,0	82,3	89,7	2,2	3 020
Selva rural	54,4	4,4	3 138	72,1	7,3	768	69,5	3,7	2 690	63,3	57,5	69,1	4,7	2 535
Quintil de riqueza														
Quintil inferior	52,7	2,3	7 886	75,5	2,6	1 993	73,6	1,6	7 060	76,6	74,5	78,7	1,4	7 019
Segundo quintil	81,8	1,2	6 775	93,4	0,9	1 812	88,1	0,8	6 777	86,8	85,1	88,5	1,0	6 363
Quintil intermedio	91,1	0,8	5 960	96,0	0,7	1 378	96,4	0,4	5 691	96,2	95,5	96,9	0,4	5 634
Cuarto quintil	97,7	0,4	4 788	99,7	0,1	1 114	99,4	0,1	4 175	99,3	98,9	99,6	0,2	4 381
Quintil superior	99,8	0,1	3 491	100,0	0,0	891	99,9	0,1	3 131	99,8	99,6	100,0	0,1	3 207
Ámbito JUNTOS	66,2	2,0	5 764	84,1	1,5	6 659	83,5	1,8	5 395	88,7	86,3	91,0	1,3	5 048

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación (C.V.) mayor a 15,0% deben ser considerados como referenciales.
a/ La estimación de cobertura nacional son realizadas con los datos captados en el año 2007; ya la estimación del ámbito JUNTOS (638 distritos) son realizadas con información captada en el periodo 2005-2007, 1er. trimestre 2008 y la ampliación muestral.
Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2007, 2009 y 2010.

CUADRO Nº 14A: PROPORCIÓN DE HOGARES CON ACCESO A AGUA TRATADA, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2000, JUNIO 2007, 2009 Y 2010

Departamento	2000				Junio 2007 a/				2009				2010			
	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Intervalo de confianza al 95%		C.V.	Casos sin Ponderar	
												Inferior	Superior			
Total	84,4	0,6	28 900	92,9	0,6	7 188	91,1	0,4	26 834	91,5	0,4	90,8	92,2	0,4	26 605	
Amazonas	75,4	3,3	1 193	85,3	2,4	1 271	81,0	3,9	1 134	78,6	3,6	73,1	84,2	3,6	1 139	
Áncash	87,8	2,6	1 048	92,7	1,3	1 459	92,7	1,4	1 177	94,6	1,3	92,2	97,0	1,3	1 162	
Apurímac	95,7	0,6	1 318	97,2	0,6	1 439	97,7	0,7	1 066	99,6	0,2	99,2	100,0	0,2	1 060	
Arequipa	91,9	1,9	1 190	97,6	0,7	1 866	98,2	0,7	1 064	97,8	0,6	96,7	99,0	0,6	1 047	
Ayacucho	90,5	11,0	1 550	95,2	0,9	1 556	97,9	0,5	1 289	98,8	0,4	98,0	99,6	0,4	1 291	
Cajamarca	63,2	5,5	930	86,2	2,0	1 203	77,8	3,8	1 057	85,5	3,0	80,5	90,6	3,0	1 064	
Cusco	92,2	11,0	1 067	96,0	1,2	1 104	99,4	0,3	1 047	98,4	0,7	97,1	99,8	0,7	1 063	
Huancavelica	71,7	4,2	1 216	87,8	2,7	1 395	93,8	1,4	935	94,9	1,1	92,9	96,9	1,1	942	
Huánuco	51,6	7,2	1 061	79,4	3,2	1 134	78,0	3,1	1 000	78,0	3,0	73,4	82,6	3,0	983	
Ica	93,6	1,1	993	96,8	0,6	1 451	93,6	1,1	1 074	94,6	1,1	92,6	96,6	1,1	1 090	
Junín	88,9	3,0	1 030	96,3	1,3	1 029	94,1	1,6	1 070	95,1	1,8	91,7	98,4	1,8	1 073	
La Libertad	70,0	5,6	1 104	89,8	2,0	1 221	86,9	3,0	1 060	87,2	2,7	82,5	91,8	2,7	1 049	
Lambayeque	90,6	1,8	922	94,1	1,3	1 297	89,1	2,3	881	91,6	2,2	87,6	95,7	2,2	868	
Lima	97,0	0,5	3 338	99,1	0,2	2 734	98,8	0,3	2 493	98,0	0,4	97,3	98,8	0,4	2 475	
Loreto	51,2	6,3	941	60,5	5,3	1 015	62,8	5,3	895	52,8	6,8	45,8	59,8	6,8	853	
Madre de Dios	71,5	2,4	1 184	90,0	1,3	1 815	86,4	3,0	1 206	85,6	2,7	81,1	90,2	2,7	1 113	
Moquegua	93,5	1,8	1 193	94,4	1,6	1 674	96,5	1,2	1 042	96,2	1,0	94,2	98,1	1,0	1 040	
Pasco	75,0	3,6	1 123	92,1	1,4	1 537	93,6	1,6	1 175	97,3	1,0	95,3	99,3	1,0	1 147	
Piura	86,6	2,2	1 093	90,1	2,6	1 295	89,2	2,3	1 079	91,1	1,9	87,6	94,5	1,9	1 079	
Puno	66,4	4,5	1 659	87,4	2,1	1 608	81,1	2,7	1 432	78,3	3,2	73,4	83,3	3,2	1 405	
San Martín	65,0	7,0	973	82,0	3,0	1 572	79,1	3,7	973	80,1	4,0	73,8	86,3	4,0	967	
Tacna	94,8	1,5	934	95,1	1,2	1 337	92,6	2,2	872	96,0	1,4	93,4	98,6	1,4	881	
Tumbes	78,6	2,8	919	89,4	1,4	1 499	84,5	2,9	910	91,2	1,9	87,8	94,6	1,9	893	
Ucayali	51,9	4,5	921	74,1	3,1	1 326	70,6	4,7	903	73,7	2,9	69,5	77,9	2,9	921	

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación (C.V.) mayor a 15,0% deben ser considerados como referenciales.

a/ La estimación a nivel nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007 y la estimación a nivel departamental corresponde a información recopilada en los años 2005, 2006, 2007 y 1er trimestre 2008 más ampliación muestral. la mediana de fecha de entrevistas es junio 2007.

Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.

CUADRO N° 15: PROPORCIÓN DE HOGARES CON SANEAMIENTO BÁSICO, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO Y CARACTERÍSTICAS, 2000, 2007, 2009 Y 2010

Ámbito geográfico / Características	2000				2007 a/				2009				2010			
	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Intervalo de confianza al 95%		Casos sin Ponderar	
													Inferior	Superior		
Total	75,9	0,9	28 881	81,8	1,6	7 188	83,3	0,8	26 834	85,3	0,6	86,3	84,3	86,3	26 605	
Área de residencia																
Urbana	91,7	0,7	15 453	92,4	1,1	3 741	92,3	0,7	15 640	93,5	0,5	94,4	92,7	94,4	15 607	
Rural	48,6	3,3	13 428	61,0	4,7	3 447	64,7	2,2	11 194	67,8	1,9	70,2	65,3	70,2	10 998	
Región natural																
Costa	90,6	1,0	9 863	93,3	1,9	2 238	92,2	0,9	9 066	93,1	0,7	94,3	91,9	94,3	9 072	
Lima Metropolitana	97,2	0,8	2 765	97,3	1,3	623	98,4	0,3	2 200	97,1	0,6	98,2	96,0	98,2	2 183	
Resto Costa	82,9	1,9	7 098	87,7	3,9	1 615	84,8	2,1	6 866	88,4	1,3	90,6	86,2	90,6	6 889	
Sierra	57,1	2,5	12 979	72,0	3,4	3 443	73,5	1,8	11 911	77,8	1,3	79,8	75,7	79,8	11 978	
Sierra urbana	84,3	1,6	4 138	91,1	2,2	1 048	87,9	1,8	4 473	91,1	1,1	93,1	89,1	93,1	4 569	
Sierra rural	43,3	4,6	8 841	60,3	5,8	2 395	63,9	2,8	7 438	68,4	2,3	71,4	65,4	71,4	7 409	
Selva	71,8	2,6	6 039	66,8	6,3	1 507	79,4	1,7	5 857	77,1	1,9	80,0	74,3	80,0	5 555	
Selva urbana	88,8	1,6	2 906	73,9	7,3	739	89,1	1,9	3 167	89,6	1,5	92,3	86,9	92,3	3 020	
Selva rural	56,7	5,2	3 133	59,9	9,9	768	67,8	3,6	2 690	63,0	3,8	67,7	58,3	67,7	2 535	
Quintil de riqueza																
Quintil inferior	33,6	5,2	7 883	48,4	6,8	1 993	54,9	2,8	7 060	58,6	2,5	61,4	55,8	61,4	7 019	
Segundo quintil	59,6	2,6	6 768	72,8	3,1	1 812	74,3	1,8	6 777	78,7	1,3	80,6	76,7	80,6	6 363	
Quintil intermedio	88,7	1,1	5 956	88,7	2,5	1 378	91,8	0,8	5 691	92,0	0,8	93,4	90,6	93,4	5 634	
Cuarto quintil	98,8	0,5	4 784	98,9	0,4	1 114	98,9	0,3	4 175	99,3	0,2	99,7	98,9	99,7	4 381	
Quintil superior	100,0	0,0	3 490	99,9	0,1	891	100,0	0,0	3 131	100,0	0,0	100,0	99,9	100,0	3 207	
Ámbito JUNTOS	43,0	4,6	5 764	59,2	3,4	6 658	67,1	2,6	5 395	70,5	2,2	73,6	67,4	73,6	5 048	

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación (C.V.) mayor a 15,0% deben ser considerados como referenciales.

a/ La estimación de cobertura nacional son realizadas con los datos captados en el año 2007; y la estimación del ámbito JUNTOS (638 distritos) son realizadas con información captada en el periodo 2005-2007, 1er. trimestre 2008 y la ampliación muestral. Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2007, 2009 y 2010.

CUADRO Nº 15A: PROPORCIÓN DE HOGARES CON SANEAMIENTO BÁSICO, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2000, JUNIO 2007, 2009 Y 2010

Departamento	2000				Junio 2007 al				2009				2010			
	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Intervalo de confianza al 95%		C.V.	Casos sin Ponderar
													Inferior	Superior		
Total	75,9	0,9	28 881	81,8	1,6	7 188	83,3	0,8	26 834	85,3	0,6	26 605	84,3	86,3	0,6	26 605
Amazonas	74,4	3,0	1 193	81,5	3,1	1 271	86,6	2,1	1 134	85,0	2,2	1 139	81,2	88,7	2,2	1 139
Áncash	58,3	8,1	1 048	72,4	4,6	1 459	75,1	4,1	1 177	78,5	3,2	1 162	73,5	83,5	3,2	1 162
Apurímac	46,7	9,8	1 318	66,1	5,6	1 439	73,0	4,4	1 066	71,6	5,0	1 060	64,6	78,5	5,0	1 060
Arequipa	88,5	2,7	1 190	90,7	1,4	1 865	88,2	3,6	1 064	90,1	2,6	1 047	85,5	94,7	2,6	1 047
Ayacucho	53,8	6,5	1 548	70,5	4,6	1 556	67,7	6,7	1 289	76,3	3,2	1 291	71,5	81,1	3,2	1 291
Cajamarca	70,5	5,2	930	81,0	2,7	1 203	87,4	2,5	1 057	85,7	3,3	1 064	80,1	91,3	3,3	1 064
Cusco	52,9	9,3	1 066	63,7	6,6	1 104	80,5	3,8	1 047	79,5	3,9	1 063	73,4	85,6	3,9	1 063
Huancavelica	29,2	15,3	1 216	45,9	11,2	1 395	59,3	6,8	935	65,4	5,0	942	59,0	71,7	5,0	942
Huánuco	51,7	8,2	1 061	67,6	5,0	1 134	74,8	3,2	1 000	72,9	3,6	983	67,8	78,1	3,6	983
Ica	87,0	2,9	993	87,7	2,4	1 451	86,2	2,3	1 074	88,7	1,7	1 090	85,7	91,7	1,7	1 090
Junín	70,4	4,7	1 030	75,1	4,1	1 029	79,6	3,6	1 070	82,4	3,2	1 073	77,2	87,6	3,2	1 073
La Libertad	71,6	5,6	1 104	82,0	3,6	1 219	84,8	3,6	1 060	89,8	2,3	1 049	85,7	93,9	2,3	1 049
Lambayeque	87,7	2,1	922	87,7	2,5	1 295	87,1	2,8	881	90,2	2,0	868	86,7	93,8	2,0	868
Lima	92,8	1,1	3 335	94,6	0,9	2 734	94,2	1,4	2 493	94,2	1,0	2 475	92,5	96,0	1,0	2 475
Loreto	63,0	6,7	941	61,9	7,9	1 015	65,7	5,3	895	60,4	5,8	853	53,5	67,2	5,8	853
Madre de Dios	81,2	2,7	1 181	87,4	3,2	1 815	83,9	4,6	1 206	79,4	4,6	1 113	72,2	86,5	4,6	1 113
Moquegua	83,7	3,3	1 193	86,4	2,5	1 674	85,7	3,4	1 042	89,1	2,5	1 040	84,8	93,4	2,5	1 040
Pasco	47,6	6,7	1 123	50,5	6,4	1 537	54,6	8,7	1 175	66,0	6,8	1 147	57,2	74,8	6,8	1 147
Plura	68,7	6,2	1 093	68,8	5,4	1 294	70,7	5,9	1 079	80,8	3,6	1 079	75,1	86,5	3,6	1 079
Puno	58,3	4,8	1 658	69,5	4,9	1 608	71,7	5,0	1 432	77,4	3,6	1 405	71,9	82,9	3,6	1 405
San Martín	82,7	3,2	971	88,1	2,5	1 571	86,7	2,2	973	89,2	1,7	967	86,3	92,1	1,7	967
Tacna	90,6	2,0	933	91,2	1,4	1 337	90,6	3,2	872	93,7	2,3	881	89,5	97,9	2,3	881
Tumbes	85,2	1,5	919	86,8	2,0	1 499	76,9	3,6	910	81,8	3,2	893	76,6	86,9	3,2	893
Ucayali	80,5	2,7	915	64,1	6,4	1 326	82,3	3,4	903	80,8	2,7	921	76,6	85,1	2,7	921

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación (C.V.) mayor a 15,0%, deben ser considerados como referenciales.

a/ La estimación a nivel nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007 y la estimación a nivel departamental corresponde a información recolectada en los años 2005, 2006, 2007 y 1er. trimestre 2008 más ampliación muestral la mediana de fecha de entrevistas es junio 2007.

Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.

CUADRO N° 16: PROPORCIÓN DE HOGARES RURALES CON SANEAMIENTO BÁSICO, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO Y CARACTERÍSTICAS, 2000, 2007, 2009 Y 2010

Ámbito geográfico / Características	2000				2007 al				2009				2010			
	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Intervalo de confianza al 95%		Casos sin Ponderar	
													Inferior	Superior		
Total	48,6	3,3	13 428	61,0	4,7	3 447	64,7	2,2	11 194	67,8	1,9	10 998	65,3	70,2	1,9	10 998
Área de residencia																
Urbana	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Rural	48,6	3,3	13 428	61,0	4,7	3 447	64,7	2,2	11 194	67,8	1,9	10 998	65,3	70,2	1,9	10 998
Región natural																
Resto Costa	63,0	7,0	1 454	68,8	22,6	284	65,2	9,4	1 066	70,3	5,8	1 054	62,2	78,4	5,8	1 054
Sierra rural	43,3	4,6	8 841	60,3	5,8	2 395	63,9	2,8	7 438	68,4	2,3	7 409	65,4	71,4	2,3	7 409
Selva rural	56,7	5,2	3 133	59,9	9,9	768	67,8	3,6	2 690	63,0	3,8	2 535	58,3	67,8	3,8	2 535
Quintil de riqueza																
Quintil inferior	33,2	5,6	7 350	48,8	7,2	1 850	55,6	3,0	6 315	58,9	2,7	6 338	55,8	62,0	2,7	6 338
Segundo quintil	58,1	3,6	4 498	72,7	4,5	1 169	73,8	2,4	3 641	77,7	1,8	3 414	74,9	80,6	1,8	3 414
Quintil intermedio	80,8	4,4	1 303	79,0	12,0	300	85,5	3,3	1 021	83,0	3,9	972	76,6	89,5	3,9	972
Cuarto quintil	98,3	1,0	225	97,9	2,3	75	97,7	1,1	182	97,5	1,2	210	95,1	99,9	1,2	210
Quintil superior	100,0	0,0	52	100,0	0,0	53	100,0	0,0	35	98,4	1,6	63	95,3	101,4	1,6	63
Ámbito JUNTOS	41,7	5,1	5 364	57,8	3,7	6 132	65,3	2,8	4 747	67,8	2,4	4 466	64,5	71,0	2,4	4 466

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación (C.V.) mayor a 15,0% deben ser considerados como referenciales.
a/ La estimación de cobertura nacional son realizadas con los datos captados en el año 2007; y la estimación del ámbito JUNTOS (638 distritos) son realizadas con información captada en el periodo 2005-2007, 1er. trimestre 2008 y la ampliación muestral.
n.c. = No Corresponde por ser estimaciones para el área rural.
Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2007, 2009 y 2010.

CUADRO N° 16A: PROPORCIÓN DE HOGARES RURALES CON SANEAMIENTO BÁSICO, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2000, JUNIO 2007, 2009 Y 2010

Departamento	2000				Junio 2007 al				2009				2010			
	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Intervalo de confianza al 95%		Casos sin Ponderar	C.V.	
												Inferior	Superior			
Total	48,6	3,3	13 428	61,0	4,7	3 447	64,7	2,2	11 194	67,8	1,9	65,3	70,2	10 998	1,9	
Amazonas	68,1	4,4	903	76,1	4,5	899	80,6	3,3	775	79,6	3,5	74,1	85,1	777	3,5	
Áncash	37,9	18,7	604	55,6	9,9	873	60,5	9,1	639	64,9	7,2	55,8	74,0	626	7,2	
Apurímac	35,9	15,2	1 030	56,7	8,8	1 075	67,0	6,3	790	65,0	7,2	55,7	74,2	780	7,2	
Arequipa	62,0	22,3	234	63,6	9,6	360	75,3	8,4	211	71,6	12,2	54,4	88,7	206	12,2	
Ayacucho	41,7	10,7	1 072	58,7	8,4	1 065	60,2	7,7	830	68,0	5,1	61,2	74,8	837	5,1	
Cajamarca	64,0	7,5	723	76,3	3,7	928	84,6	3,4	807	81,4	4,8	73,7	89,0	812	4,8	
Cusco	40,8	16,3	725	43,5	14,0	674	71,0	6,3	613	71,5	6,6	62,3	80,8	616	6,6	
Huancavelica	27,3	17,9	1 079	42,9	13,0	1 169	56,7	7,4	794	60,2	6,4	52,7	67,7	767	6,4	
Huánuco	39,7	13,6	786	58,5	7,0	788	65,4	4,4	699	61,4	5,9	54,2	68,6	684	5,9	
Ica	70,5	15,1	183	72,8	14,1	268	58,8	10,2	168	62,5	8,8	51,7	73,4	180	8,8	
Junín	53,9	10,4	492	60,2	8,4	528	65,9	7,7	490	65,6	8,8	54,2	77,0	488	8,8	
La Libertad	40,3	20,4	427	60,8	12,3	467	68,7	11,1	322	70,6	10,9	55,4	85,7	324	10,9	
Lambayeque	77,8	3,6	261	71,6	10,5	320	72,6	8,8	200	81,3	4,8	73,5	89,0	196	4,8	
Lima	41,4	21,4	394	29,9	46,1	197	27,3	42,0	113	45,2	20,2	27,2	63,2	109	20,2	
Loreto	39,0	13,5	372	42,1	15,6	380	31,3	17,7	346	28,8	17,9	18,7	38,9	280	17,9	
Madre de Dios	60,1	7,0	537	75,0	7,3	695	71,4	11,3	397	52,9	11,6	40,8	64,9	359	11,6	
Moquegua	56,7	15,5	356	58,0	11,7	426	64,5	9,4	277	74,0	7,1	63,7	84,2	268	7,1	
Pasco	34,6	17,8	572	28,6	16,9	657	51,8	14,5	491	56,0	13,2	41,4	70,5	482	13,2	
Plura	42,0	20,5	405	31,7	25,9	426	49,3	18,0	302	65,6	11,1	51,2	79,9	305	11,1	
Puno	48,9	7,8	1 152	60,1	7,4	1 062	63,3	7,3	942	71,0	5,6	63,2	78,8	922	5,6	
San Martín	64,4	8,4	424	80,2	5,4	681	78,0	5,6	446	81,7	4,3	74,8	88,6	435	4,3	
Tacna	73,3	10,0	172	66,8	8,3	319	76,9	6,3	185	86,5	3,6	80,3	92,7	182	3,6	
Tumbes	59,9	7,4	167	68,5	8,1	216	65,4	6,0	100	78,6	4,0	72,3	84,8	101	4,0	
Ucayali	71,8	6,7	358	52,9	10,9	401	55,7	16,0	257	45,4	15,5	31,6	59,2	262	15,5	

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación (C.V.) mayor a 15,0% deben ser considerados como referenciales.

a/ La estimación a nivel nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007 y la estimación a nivel departamental corresponde a información recopilada en los años 2005, 2006, 2007 y 1er. trimestre 2008 más ampliación muestral, la mediana de fecha de entrevistas es junio 2007.

Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.

CUADRO N° 17: PROPORCIÓN DE GESTANTES QUE RECIBIERON SUPLENTO DE HIERRO EN EL ÚLTIMO NACIMIENTO ANTERIOR A LA ENCUESTA, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO Y CARACTERÍSTICAS, 2000, 2007, 2009 Y 2010

Ámbito geográfico / Características	2000			2007 a/			2009			2010			
	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Intervalo de confianza al 95%		Casos sin Ponderar	
										Inferior	Superior		
Total	60,2	1,2	8 625	74,9	1,9	2 072	80,1	0,8	8 147	85,1	87,2	0,6	7 466
Área de residencia													
Urbana	65,4	1,5	4 663	74,9	2,6	1 007	80,5	1,0	4 747	86,2	88,8	0,8	4 250
Rural	51,1	2,3	3 962	74,8	2,5	1 065	79,3	1,4	3 400	81,5	85,1	1,1	3 216
Región natural													
Costa	67,6	1,6	2 898	78,2	3,1	584	83,7	1,2	2 657	87,7	90,8	0,9	2 454
Lima Metropolitana	73,5	2,3	773	78,8	5,2	137	86,2	1,6	632	88,3	93,2	1,4	537
Resto Costa	61,1	2,1	2 125	77,6	3,1	447	80,8	1,8	2 025	85,8	89,7	1,1	1 917
Sierra	48,8	2,4	3 779	69,7	2,9	969	74,5	1,4	3 351	80,4	84,1	1,1	3 135
Sierra urbana	47,7	3,6	1 197	65,2	5,3	282	69,4	2,4	1 239	80,0	85,2	1,6	1 169
Sierra rural	49,4	3,1	2 582	72,2	3,4	687	77,9	1,7	2 112	79,5	84,5	1,5	1 966
Selva	63,2	2,9	1 948	79,8	3,1	519	82,3	1,7	2 139	83,4	87,8	1,3	1 877
Selva urbana	72,3	3,0	986	83,0	2,5	242	83,9	1,8	1 137	84,5	90,3	1,7	949
Selva rural	54,9	5,0	962	77,2	5,3	277	80,4	3,0	1 002	80,5	87,2	2,0	928
Nivel de educación													
Sin educación/Primaria	47,2	2,4	3 802	71,0	3,1	879	76,0	1,5	3 015	80,2	84,0	1,2	2 753
Secundaria	64,3	1,7	3 246	76,8	2,7	775	81,3	1,1	3 465	84,4	87,5	0,9	3 174
Superior	75,7	1,9	1 577	77,8	3,2	418	83,3	1,5	1 667	90,4	93,9	1,0	1 539
Quintil de riqueza													
Quintil inferior	49,2	3,1	2 228	75,0	3,3	633	79,1	1,8	2 149	81,4	85,8	1,4	2 099
Segundo quintil	50,9	2,7	2 226	74,4	2,7	588	78,0	1,7	2 246	81,7	86,0	1,3	1 898
Quintil intermedio	60,1	2,7	1 895	72,2	4,2	409	78,9	1,7	1 864	81,7	86,7	1,5	1 712
Cuarto quintil	66,6	2,3	1 395	73,4	5,1	244	82,2	1,8	1 171	87,4	91,8	1,2	1 114
Quintil superior	78,1	2,1	881	80,9	3,9	198	84,3	2,1	717	89,9	95,0	1,4	643
Ámbito JUNTOS	51,5	2,9	1 839	71,7	1,9	2 090	78,9	2,0	1 767	82,4	87,5	1,5	1 551

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación (C.V.) mayor a 15,0% deben ser considerados como referenciales.
a/ La estimación de cobertura nacional son realizadas con los datos captados en el año 2007; y la estimación del ámbito JUNTOS (638 distritos) son realizadas con información captada en el periodo 2005-2007, 1er. trimestre 2008 y la ampliación muestral.
Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2007, 2009 y 2010.

CUADRO N° 17A: PROPORCIÓN DE GESTANTES QUE RECIBIERON SUPLEMENTO DE HIERRO EN EL ÚLTIMO NACIMIENTO ANTERIOR A LA ENCUESTA, SEGUN DEPARTAMENTO, 2000, JUNIO 2007, 2009 Y 2010


Departamento	2000				Junio 2007 al				2009				2010			
	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Intervalo de confianza al 95%		C.V.	Casos sin Ponderar
													Inferior	Superior		
Total	60,2	1,2	8 625	74,9	1,9	2 072	80,1	0,8	8 147	86,1	0,6	7 466	85,1	87,2	0,6	7 466
Amazonas	57,5	5,1	306	77,2	3,7	394	82,5	2,3	370	80,6	3,2	353	75,5	85,6	3,2	353
Áncash	55,6	6,1	302	66,7	4,3	380	82,6	2,7	339	85,1	2,9	318	80,2	89,9	2,9	318
Apurímac	66,5	3,2	466	88,1	2,2	403	92,6	1,4	312	92,9	1,7	276	89,9	96,0	1,7	276
Arequipa	51,6	6,1	283	76,5	3,2	391	74,2	4,4	224	79,8	3,4	244	74,4	85,2	3,4	244
Ayacucho	60,8	4,1	457	73,7	4,2	466	88,2	2,8	335	88,9	2,1	367	85,4	92,5	2,1	367
Cajamarca	59,9	6,6	257	79,6	2,3	369	85,3	3,7	343	92,5	1,7	319	89,4	95,7	1,7	319
Cusco	43,3	8,9	390	73,2	3,7	293	81,4	2,6	271	82,5	3,3	305	77,2	87,8	3,3	305
Huancavelica	71,0	3,8	412	63,2	5,2	479	68,4	7,6	291	87,0	2,2	259	83,2	90,8	2,2	259
Huánuco	48,9	6,5	323	73,7	4,0	353	84,2	2,8	335	86,1	2,2	318	82,5	89,8	2,2	318
Ica	60,7	4,9	305	78,3	3,1	407	82,1	2,6	303	82,0	2,7	294	77,6	86,3	2,7	294
Junín	39,1	7,0	304	61,9	4,7	308	67,8	4,7	321	69,4	5,2	291	62,3	76,5	5,2	291
La Libertad	56,2	5,7	297	76,3	3,5	375	60,5	4,8	326	81,9	3,0	322	77,1	86,6	3,0	322
Lambayeque	55,1	4,5	267	77,4	3,3	400	81,7	4,4	230	89,3	3,1	230	84,0	94,7	3,1	230
Lima	70,4	2,3	921	77,6	2,3	627	85,6	1,7	708	90,9	1,3	601	88,6	93,2	1,3	601
Loreto	77,4	3,3	319	81,0	2,4	470	88,8	1,7	395	85,9	2,8	333	81,2	90,6	2,8	333
Madre de Dios	62,4	4,7	404	67,5	3,7	620	69,2	3,2	438	82,9	3,3	320	77,5	88,2	3,3	320
Moquegua	53,3	4,8	289	69,3	4,2	309	68,3	3,5	267	69,7	3,9	246	64,4	75,0	3,9	246
Pasco	39,0	8,2	305	65,3	3,6	447	70,6	3,4	399	87,9	1,9	317	84,7	91,2	1,9	317
Plura	66,5	4,4	370	86,2	2,1	410	87,0	2,6	373	91,8	1,9	372	88,4	95,1	1,9	372
Puno	35,6	9,1	464	50,4	6,8	363	56,1	5,8	325	71,2	3,8	273	65,9	76,5	3,8	273
San Martín	62,0	5,1	326	82,0	2,5	494	86,8	2,5	320	87,0	2,4	328	83,0	91,1	2,4	328
Tacna	51,2	5,7	246	77,1	3,0	319	74,4	4,3	233	85,2	3,2	168	79,9	90,5	3,2	168
Tumbes	76,5	3,3	306	90,4	1,6	448	92,5	2,1	329	96,4	1,1	290	94,3	98,6	1,1	290
Ucayali	76,5	3,8	306	74,9	3,3	489	71,8	4,1	360	85,1	3,2	322	79,8	90,5	3,2	322

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación (C.V.) mayor a 15,0% deben ser considerados como referenciales.

a/ La estimación a nivel nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007 y la estimación a nivel departamental corresponde a información recopilada en los años 2005, 2006, 2007 y 1er. Trimestre 2008 más ampliación muestral, la mediana de fecha de entrevistas es junio 2007.

Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.

Anexo N° 2
Salud Materno Neonatal



CUADRO N° 18: TASA DE MORTALIDAD NEONATAL DE LOS 10 AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA,
SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2000, 2007, 2009 Y 2010
(Por cada mil nacidos vivos)

Área de residencia	2000				2007				2009				2010			
	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Intervalo de confianza al 95%		C.V.	Casos sin Ponderar
													Inferior	Superior		
Total	23	5,0	29 398	15	14,0	6 399	13	7,9	20 613	11	9,0	13,2	9,5	19 218		
Urbana	15	9,2	13 374	11	25,9	3 740	10	11,4	11 136	9	6,7	12,0	14,4	10 285		
Rural	31	5,6	16 024	21	15,1	2 659	17	10,7	9 477	14	10,7	17,5	12,0	8 933		

Nota: - Los Estimadores con Coeficiente de Variación (C.V.) mayor a 15,0% deben ser considerados como referenciales.

- Mortalidad Neonatal: Probabilidad de morir durante el primer mes de vida.

Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2007, 2009 y 2010.

CUADRO N° 18A: TASA DE MORTALIDAD NEONATAL DE LOS 10 AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA,
SEGÚN DEPARTAMENTO, 2000, JUNIO 2007 Y 2010
(Por mil nacidos vivos)

Departamento	2000				Junio 2007 a/				2009-2010 b/			
	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		C.V.	Casos sin Ponderar	
								Inferior	Superior			
Total	23	5,0	29 398	15	14,0	6 399	11	9,0	13,2	9,5	19 218	
Amazonas	25	17,7	1 438	15	28,6	1 101	16	10,0	21,8	18,4	1 839	
Áncash	22	20,7	1 086	19	26,1	1 155	12	5,6	18,1	26,3	1 674	
Apurímac	41	12,9	1 528	18	24,4	1 022	13	6,3	20,2	26,1	1 592	
Arequipa	22	35,6	860	11	27,3	1 699	14	6,0	21,9	28,4	1 095	
Ayacucho	29	20,2	1 574	17	27,5	1 130	10	5,4	14,6	23,0	1 884	
Cajamarca	25	19,6	1 087	17	23,1	1 115	12	6,3	18,0	24,1	1 742	
Cusco	48	13,7	1 196	13	28,2	861	17	7,8	25,3	26,4	1 550	
Huancavelica	43	14,8	1 612	22	16,0	1 001	14	7,7	19,5	21,8	1 675	
Huánuco	36	14,0	1 466	20	26,8	977	13	6,2	19,1	25,5	1 725	
Ica	11	30,2	802	9	38,0	1 425	9	3,9	14,2	28,6	1 398	
Junín	20	19,7	1 098	20	27,7	980	13	7,3	19,3	22,6	1 581	
La Libertad	27	20,6	1 016	14	26,9	1 223	12	4,6	18,6	30,3	1 635	
Lambayeque	15	32,0	957	7	40,6	1 422	9	3,5	14,3	30,2	1 135	
Lima	12	20,2	2 407	6	39,9	2 493	7	3,3	9,8	24,8	3 081	
Loreto	23	20,6	1 466	24	23,3	1 149	21	12,8	28,4	18,9	2 173	
Madre de Dios	12	26,3	1 235	13	23,3	1 673	10	5,2	14,1	23,2	1 792	
Moquegua	13	31,0	714	16	23,9	1 314	13	5,6	20,2	28,3	1 135	
Pasco	32	16,6	1 158	20	23,2	1 275	16	9,1	23,1	21,7	1 722	
Piura	18	20,9	1 227	16	27,4	1 273	14	7,9	19,1	20,9	1 854	
Puno	29	18,0	1 596	20	28,3	1 145	18	10,4	24,7	20,3	1 709	
San Martín	23	23,3	1 153	26	18,6	1 416	20	12,3	26,8	18,5	1 647	
Tacna	9	38,5	654	3	71,4	1 261	12	5,3	19,1	28,3	951	
Tumbes	26	21,6	849	14	28,4	1 493	16	7,8	23,2	24,8	1 366	
Ucayali	26	23,0	1 219	10	33,3	1 352	16	9,3	23,3	21,5	1 878	

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación (C.V.) mayor a 15,0% deben ser considerados como referenciales.

a/ La estimación a nivel nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007 y la estimación a nivel departamental corresponde a información recopilada en los años 2005, 2006, 2007 y 1er. trimestre 2008 más ampliación muestral, la mediana de fecha de entrevistas es junio 2007.

b/ La estimación a nivel nacional corresponde a información recolectada entre los meses de marzo a diciembre del 2010 y la estimación a nivel departamental corresponde a información recopilada en los años 2009 y 2010.

Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar: ENDES 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.

**CUADRO N° 18B: TASA DE MORTALIDAD NEONATAL E INFANTIL DE LOS 5 AÑOS ANTERIORES A
LA ENCUESTA, 2000, 2007 Y 2010
(Por cada mil nacidos vivos)**

Mortalidad	2000			2007			2010 a/		
	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar
Neonatal 1/	18	8,1	14 067	11	23,6	2 777	10	9,3	20 192
Infantil 2/	33	6,0	14 088	18	18,0	2 779	18	6,9	20 208

a/ La estimación a nivel nacional corresponde a información recolectada entre los meses de marzo a diciembre del 2010.

1/ Mortalidad Neonatal: Probabilidad de morir durante el primer mes de vida.

2/ Mortalidad Infantil: Probabilidad de morir durante el primer año de vida.

Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2007, 2009 y 2010

CUADRO N° 19: TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD DE LOS 3 AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO Y CARACTERÍSTICAS, 2000, 2007, 2009 Y 2010

Ámbito geográfico / Características	2000				2007				2009				2010					
	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Intervalo de confianza al 95%	C.V.	Casos sin Ponderar
																Inferior	Superior	
Total	2,9	2,1	27 843	2,4	4,5	6 399	2,6	2,0	24 212	2,5	2,6	2,4	2,6	2,1	2,4	2,6	2,1	22 947
Área de residencia																		
Urbana	2,2	2,3	17 071	1,9	5,6	3 740	2,3	2,4	15 872	2,2	2,3	2,1	2,3	2,6	2,1	2,3	2,6	14 753
Rural	4,3	2,5	10 772	3,7	4,5	2 659	3,6	2,6	8 340	3,5	3,7	3,3	3,7	2,7	3,3	3,7	2,7	8 194
Región natural																		
Lima Metropolitana	2,0	4,2	3 074	1,6	10,7	605	2,1	5,0	2 409	2,0	2,2	1,8	2,2	5,3	1,8	2,2	5,3	2 130
Resto Costa	2,4	3,6	7 066	2,4	8,5	1 624	2,4	3,5	6 798	2,4	2,6	2,3	2,6	3,6	2,3	2,6	3,6	6 404
Sierra	3,7	2,7	11 080	2,9	6,8	2 721	2,9	2,8	9 503	2,8	2,9	2,6	2,9	2,8	2,6	2,9	2,8	9 381
Selva	3,8	4,2	6 023	3,4	8,9	1 449	3,5	3,5	5 502	3,4	3,7	3,2	3,7	4,1	3,2	3,7	4,1	5 032
Nivel de educación																		
Sin educación/Primaria	n.d.	n.d.	n.d.	3,8	4,7	2 206	3,7	4,0	7 611	3,7	3,9	3,5	3,9	2,8	3,5	3,9	2,8	7 119
Secundaria	n.d.	n.d.	n.d.	2,4	5,9	2 554	2,6	7,7	10 845	2,6	2,7	2,4	2,7	2,9	2,4	2,7	2,9	10 171
Superior	n.d.	n.d.	n.d.	1,5	8,9	1 639	1,9	3,6	5 756	1,7	1,8	1,6	1,8	4,0	1,6	1,8	4,0	5 657
Quintil de riqueza																		
Quintil inferior	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	4,2	4,6	4 856	4,0	4,3	3,8	4,3	3,1	3,8	4,3	3,1	4 845
Segundo quintil	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	3,2	4,2	5 740	3,3	3,5	3,1	3,5	3,0	3,1	3,5	3,0	5 130
Quintil intermedio	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	2,5	3,4	5 653	2,5	2,7	2,3	2,7	3,9	2,3	2,7	3,9	5 352
Cuarto quintil	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	2,1	5,4	4 549	1,9	2,1	1,7	2,1	4,7	1,7	2,1	4,7	4 425
Quintil superior	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1,6	8,8	3 414	1,5	1,7	1,3	1,7	6,0	1,3	1,7	6,0	3 195

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación (C.V.) mayor a 15,0% deben ser considerados como referenciales. n.d.= no disponible.

Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2007, 2009 y 2010.

CUADRO N° 19A: TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD DE LOS 3 AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA,
SEGUN DEPARTAMENTO, 2000, JUNIO 2007, 2009 Y 2010

Departamento	2000				Junio 2007 a/				2009				2010					
	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Intervalo de confianza al 95%		Casos sin Ponderar	C.V.
															Inferior	Superior		
Total	2,9	2,1	27 843	2,4	4,5	6 399	2,6	2,0	24 212	2,5	2,6	2,4	2,6	2,1	2,4	2,6	22 947	2,1
Amazonas	3,8	8,2	1 091	3,3	8,8	1 105	3,1	7,5	952	2,8	3,3	2,4	3,3	7,5	2,4	3,3	928	7,5
Ancash	3,4	8,0	945	2,8	8,1	1 155	2,7	7,3	1 031	2,3	2,1	2,1	2,6	5,7	2,1	2,6	957	5,7
Apurímac	4,2	6,3	1 019	3,6	6,8	1 022	3,5	6,1	762	3,4	2,8	2,8	4,0	8,8	2,8	4,0	790	8,8
Arequipa	2,2	11,0	1 150	1,9	7,1	1 699	2,3	8,7	860	2,2	1,9	1,9	2,6	8,1	1,9	2,6	852	8,1
Ayacucho	4,2	6,9	1 208	3,5	7,2	1 130	3,2	7,4	930	2,9	2,4	2,4	3,4	8,6	2,4	3,4	968	8,6
Cajamarca	3,5	7,9	913	3,0	7,1	1 115	3,2	7,6	942	3,0	2,6	2,6	3,5	7,8	2,6	3,5	948	7,8
Cusco	4,0	7,5	923	2,9	9,4	861	2,9	9,5	780	3,0	2,5	2,5	3,6	8,8	2,5	3,6	905	8,8
Huancaavelica	6,1	5,2	911	4,4	7,6	1 001	3,4	13,9	737	3,3	2,7	2,7	3,9	9,1	2,7	3,9	696	9,1
Huánuco	4,3	8,2	1 039	3,3	8,6	975	3,2	7,5	864	2,9	2,5	2,5	3,3	6,9	2,5	3,3	840	6,9
Ica	2,5	6,3	1 018	2,4	6,6	1 421	2,5	6,3	1 011	2,4	1,9	1,9	2,9	9,7	1,9	2,9	944	9,7
Junín	3,2	9,3	1 101	2,8	8,4	980	2,6	8,5	914	2,5	2,0	2,0	3,0	10,0	2,0	3,0	948	10,0
La Libertad	2,9	8,8	1 120	2,8	8,0	1 221	2,5	7,4	1 070	3,0	2,5	2,5	3,4	7,2	2,5	3,4	953	7,2
Lambayeque	2,4	10,8	1 063	2,5	5,9	1 423	2,1	9,2	884	2,2	1,8	1,8	2,7	10,0	1,8	2,7	883	10,0
Lima	2,1	4,0	3 547	1,9	5,1	2 744	2,2	4,7	2 652	2,0	1,8	1,8	2,2	4,9	1,8	2,2	2 350	4,9
Loreto	4,3	7,8	1 068	4,6	7,6	1 149	3,9	7,1	1 052	4,3	3,6	3,6	5,0	8,5	3,6	5,0	865	8,5
Madre de Dios	3,5	6,1	1 048	3,1	4,6	1 673	3,1	6,1	1 093	3,0	2,6	2,6	3,4	6,7	2,6	3,4	928	6,7
Moquegua	2,1	8,1	1 038	1,8	6,3	1 317	2,5	5,8	873	2,4	2,1	2,1	2,8	6,7	2,1	2,8	787	6,7
Pasco	3,3	6,9	1 046	3,1	6,9	1 275	3,0	7,3	1 120	2,8	2,5	2,5	3,1	6,0	2,5	3,1	948	6,0
Plura	2,7	6,7	1 290	2,8	7,1	1 272	2,9	6,4	1 140	2,8	2,4	2,4	3,2	7,0	2,4	3,2	1 103	7,0
Puno	3,8	5,5	1 286	2,8	7,0	1 145	2,5	8,6	1 086	2,6	2,2	2,2	3,1	8,7	2,2	3,1	969	8,7
San Martín	3,0	9,0	980	2,8	7,7	1 416	3,2	8,8	810	3,0	2,4	2,4	3,5	9,1	2,4	3,5	894	9,1
Tacna	2,0	7,3	950	2,0	7,9	1 261	2,3	6,5	800	1,9	1,5	1,5	2,2	9,7	1,5	2,2	720	9,7
Tumbes	2,3	6,0	1 061	2,3	4,8	1 494	2,8	5,1	940	2,7	2,3	2,3	3,1	7,9	2,3	3,1	879	7,9
Ucayali	3,2	8,5	1 028	3,5	4,8	1 352	4,1	6,9	909	3,3	2,8	2,8	3,9	7,8	2,8	3,9	892	7,8

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación (C.V.) mayor a 15,0% deben ser considerados como referenciales.

a/ La estimación a nivel nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007 y la estimación a nivel departamental corresponde a información recolectada en los años 2005, 2006, 2007 y 1er. trimestre 2008 más ampliación muestral, la mediana de fecha de entrevistas es junio 2007.

Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar: ENDES 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.

CUADRO N° 20: PROPORCIÓN DE MUJERES EN EDAD FÉRTIL QUE CONOCE ALGÚN MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2000, 2007, 2009 Y 2010

Ámbito geográfico / Características	2000				2007 al				2009				2010			
	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Intervalo de confianza al 95%		Casos sin Ponderar	C.V.
													Inferior	Superior		
Total	97,9	0,1	27 843	99,2	0,2	6 399	99,3	0,1	24 212	99,6	0,1	22 947	99,5	99,7	0,1	22 947
Área de residencia																
Urbana	99,5	0,1	17 071	99,9	0,0	3 740	99,9	0,0	15 872	99,9	0,0	14 753	99,9	100,0	0,0	14 753
Rural	94,2	0,4	10 772	97,5	0,7	2 659	97,6	0,3	8 340	98,6	0,2	8 194	98,2	98,9	0,2	8 194
Región natural																
Costa																
Lima Metropolitana	99,4	0,1	10 740	100,0	0,0	2 229	99,9	0,0	9 207	99,9	0,0	8 534	99,9	100,0	0,0	8 534
Resto Costa	99,7	0,1	3 074	100,0	0,0	605	100,0	0,0	2 409	100,0	0,0	2 130	100,0	100,0	0,0	2 130
Sierra	98,9	0,2	7 666	100,0	0,0	1 624	99,7	0,1	6 798	99,9	0,1	6 404	99,8	100,0	0,1	6 404
Sierra																
Sierra urbana	95,1	0,3	11 080	98,1	0,5	2 721	98,3	0,2	9 503	99,0	0,2	9 381	98,8	99,3	0,1	9 381
Sierra rural	98,9	0,2	4 379	99,8	0,1	1 007	99,7	0,1	4 184	99,8	0,1	4 170	99,7	100,0	0,1	4 170
Selva																
Selva urbana	92,5	0,5	6 701	96,7	0,9	1 714	97,0	0,4	5 319	98,3	0,3	5 211	97,8	98,8	0,3	5 211
Selva rural	98,2	0,2	6 023	99,5	0,3	1 449	99,5	0,2	5 502	99,4	0,2	5 032	99,0	99,8	0,2	5 032
Nivel de educación																
Sin educación/Primaria	99,2	0,2	3 372	99,6	0,3	781	99,9	0,1	3 296	99,9	0,1	2 944	99,8	100,0	0,1	2 944
Secundaria	97,1	0,4	2 651	99,3	0,6	668	98,8	0,6	2 206	98,8	0,6	2 088	97,9	99,7	0,5	2 088
Superior	94,3	0,3	10 978	97,8	0,6	2 206	97,9	0,3	7 611	98,7	0,2	7 119	98,4	99,1	0,2	7 119
Quintil de riqueza																
Quintil inferior	99,5	0,1	11 488	99,7	0,1	2 554	99,6	0,1	10 845	99,8	0,0	10 171	99,7	99,9	0,0	10 171
Segundo quintil	100,0	0,0	5 377	100,0	0,0	1 639	100,0	0,0	5 756	100,0	0,0	5 657	100,0	100,0	0,0	5 657
Tercer quintil	91,9	0,6	5 636	96,3	1,1	1 379	96,3	0,5	4 856	98,1	0,3	4 845	97,5	98,6	0,3	4 845
Cuarto quintil	96,7	0,3	6 134	99,1	0,4	1 570	99,6	0,1	5 740	99,4	0,1	5 130	99,2	99,7	0,1	5 130
Quinto quintil	99,2	0,1	6 231	99,9	0,1	1 314	99,8	0,1	5 653	99,9	0,0	5 352	99,9	100,0	0,0	5 352
Ámbito JUNTOS																
Quinto quintil	99,7	0,1	5 455	99,9	0,1	1 148	100,0	0,0	4 549	100,0	0,0	4 425	99,9	100,0	0,0	4 425
Quinto superior	99,6	0,1	4 387	100,0	0,0	988	99,9	0,0	3 414	100,0	0,0	3 195	100,0	100,0	0,0	3 195
Ámbito JUNTOS	90,7	0,6	4 602	97,0	0,4	4 928	97,0	0,5	4 122	98,2	0,3	3 853	97,7	98,8	0,3	3 853

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación (C.V.) mayor a 15,0% deben ser considerados como referenciales.

a/ La estimación de cobertura nacional son realizadas con los datos captados en el año 2007; y la estimación del ámbito JUNTOS (638 distritos) son realizadas con información captada en el periodo 2005-2007, 1er. trimestre 2008 y la ampliación muestral. Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2007, 2009 y 2010.

CUADRO N° 20A: PROPORCIÓN DE MUJERES EN EDAD FÉRTIL QUE CONOCE ALGÚN MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2000, JUNIO 2007, 2009 Y 2010

Departamento	2000					Junio 2007 a/					2009					2010				
	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		C.V.	Casos sin Ponderar			
														Inferior	Superior					
Total	97,9	0,1	27 843	99,2	0,2	6 399	99,3	0,1	24 212	99,6	0,1	22 947	99,5	99,7	0,1	22 947				
Amazonas	97,4	0,5	1 091	99,7	0,1	1 099	99,3	0,3	952	99,0	0,3	928	98,3	99,6	0,3	928				
Áncash	93,2	1,4	945	98,1	0,5	1 156	99,6	0,2	1 031	99,9	0,1	957	99,7	100,0	0,1	957				
Apurímac	94,8	0,9	1 019	98,6	0,5	1 022	99,5	0,2	762	99,5	0,3	790	99,0	100,0	0,3	790				
Arequipa	99,6	0,2	1 150	99,8	0,1	1 699	99,7	0,2	860	100,0	0,0	852	100,0	100,0	0,0	852				
Ayacucho	93,1	1,1	1 208	98,3	0,5	1 130	98,4	0,5	930	99,1	0,3	968	98,5	99,7	0,3	968				
Cajamarca	91,9	1,2	913	98,5	0,7	1 115	96,3	1,3	942	98,4	0,4	948	97,6	99,3	0,4	948				
Cusco	95,4	1,0	923	98,6	0,4	861	98,5	0,6	780	99,3	0,3	905	98,7	99,9	0,3	905				
Huancavelica	92,9	1,5	911	97,6	0,6	1 001	96,0	0,9	737	98,0	0,7	696	96,8	99,3	0,7	696				
Huánuco	92,9	1,0	1 039	98,6	0,6	977	99,4	0,3	864	99,2	0,3	840	98,6	99,8	0,3	840				
Ica	99,9	0,1	1 018	99,9	0,1	1 426	99,8	0,1	1 011	99,9	0,1	944	99,7	100,1	0,1	944				
Junín	98,8	0,3	1 101	99,5	0,3	980	99,3	0,3	914	99,6	0,2	948	99,2	100,1	0,2	948				
La Libertad	97,3	0,6	1 120	99,2	0,4	1 223	98,2	0,5	1 070	98,8	0,5	953	97,8	99,8	0,5	953				
Lambayeque	97,4	0,3	1 063	99,6	0,2	1 422	99,8	0,2	884	99,8	0,2	883	99,3	100,2	0,2	883				
Lima	99,7	0,1	3 547	99,9	0,1	2 744	99,9	0,1	2 652	100,0	0,0	2 350	99,9	100,0	0,0	2 350				
Loreto	98,4	0,4	1 068	99,6	0,3	1 149	99,0	0,8	1 052	98,9	0,7	865	97,6	100,1	0,7	865				
Madre de Dios	98,3	0,5	1 048	99,8	0,1	1 673	99,7	0,2	1 093	100,0	0,0	928	100,0	100,0	0,0	928				
Moquegua	99,7	0,2	1 038	99,7	0,1	1 314	100,0	0,0	873	99,9	0,1	787	99,6	100,1	0,1	787				
Pasco	99,3	0,3	1 046	99,4	0,3	1 275	99,8	0,1	1 120	99,8	0,2	948	99,5	100,2	0,2	948				
Plura	98,7	0,4	1 290	99,2	0,3	1 273	99,6	0,2	1 140	99,8	0,1	1 103	99,6	100,1	0,1	1 103				
Puno	96,4	0,7	1 286	97,4	0,6	1 145	99,2	0,3	1 086	99,1	0,3	969	98,5	99,8	0,3	969				
San Martín	99,6	0,2	980	99,9	0,1	1 416	99,9	0,1	810	99,8	0,1	894	99,5	100,1	0,1	894				
Tacna	99,6	0,3	950	99,9	0,1	1 261	100,0	0,0	800	100,0	0,0	720	100,0	100,0	0,0	720				
Tumbes	99,4	0,2	1 061	99,9	0,1	1 493	100,0	0,0	940	100,0	0,0	879	100,0	100,0	0,0	879				
Ucayali	99,9	0,1	1 028	99,9	0,1	1 352	99,6	0,2	909	99,7	0,2	892	99,3	100,1	0,2	892				

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación (C.V.) mayor a 15,0% deben ser considerados como referenciales.

a/ La estimación a nivel nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007 y la estimación a nivel departamental corresponde a información recopilada en los años 2005, 2006, 2007 y 1er. trimestre 2008 más ampliación muestral. La mediana de fecha de entrevistas es junio 2007.

Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar: ENDES 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.

CUADRO N° 21: PROPORCIÓN DE MUJERES EN UNIÓN QUE USA ACTUALMENTE ALGÚN MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO Y CARACTERÍSTICAS, 2000, 2007, 2009 Y 2010

Ámbito geográfico / Características	2000			2007 a/			2009			2010			
	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Intervalo de confianza al 95%		Casos sin Ponderar	
										Inferior	Superior		
Total	68,9	0,7	16 518	73,1	1,3	3 866	73,2	0,7	14 637	73,4	75,4	0,7	13 626
Área de residencia													
Urbana	73,0	0,8	9 099	73,8	1,7	2 052	74,6	0,9	8 860	74,0	76,5	0,9	8 129
Rural	61,5	1,3	7 419	71,8	1,7	1 814	70,0	1,2	5 777	70,8	74,1	1,2	5 497
Región natural													
Costa													
Lima Metropolitana	72,8	1,0	5 721	74,5	2,0	1 221	75,8	1,1	5 053	74,6	77,9	1,1	4 758
Resto Costa	73,4	1,5	1 487	70,5	3,6	295	76,6	1,7	1 205	74,0	79,4	1,8	1 104
Resto Sierra	72,1	1,3	4 234	79,3	1,8	926	74,8	1,3	3 848	74,0	77,4	1,1	3 654
Sierra													
Sierra urbana	63,9	1,2	6 789	73,3	1,6	1 689	70,6	1,1	5 914	71,7	74,5	1,0	5 597
Sierra rural	73,2	1,7	2 310	75,0	2,6	533	72,1	1,6	2 368	72,6	76,2	1,2	2 216
Selva													
Selva urbana	58,8	1,7	4 479	72,3	2,1	1 156	69,4	1,5	3 546	70,0	74,1	1,4	3 381
Selva rural	66,9	1,8	4 008	66,7	2,7	956	70,5	1,4	3 670	68,5	72,5	1,4	3 271
Nivel de educación													
Sin educación/Primaria	71,4	1,9	1 959	68,6	3,9	466	72,0	1,6	1 970	66,6	71,8	1,9	1 742
Secundaria	62,9	3,0	2 049	64,9	4,0	490	68,6	2,4	1 700	68,8	74,9	2,2	1 529
Superior	61,3	1,2	8 295	71,2	2,0	1 727	70,3	1,2	5 971	70,6	73,7	1,1	5 518
Quintil de riqueza													
Quintil inferior	74,6	0,9	5 589	74,6	2,0	1 345	74,4	1,1	5 690	73,3	76,6	1,1	5 253
Segundo quintil	75,5	1,4	2 634	73,8	3,1	794	75,4	1,4	2 976	74,5	78,7	1,4	2 855
Tercer quintil	55,1	2,0	4 050	67,9	2,7	966	68,3	1,7	3 382	67,2	71,2	1,5	3 286
Cuarto quintil	67,3	1,5	3 998	77,3	1,9	1 038	72,3	1,3	3 755	73,5	77,1	1,2	3 241
Quinto quintil	72,8	1,3	3 633	76,3	2,4	798	75,3	1,4	3 387	74,4	78,3	1,3	3 150
Ámbito JUNTOS													
Quinto quintil	74,2	1,5	2 886	74,2	3,0	603	76,0	1,7	2 438	72,4	77,4	1,7	2 379
Quinto superior	73,7	1,5	1 951	68,2	4,6	461	73,6	1,8	1 675	73,1	78,2	1,7	1 570
Ámbito JUNTOS	54,4	1,6	3 164	68,0	1,5	3 303	68,6	1,8	2 745	70,0	74,6	1,6	2 523

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación (C.V.) mayor a 15,0% deben ser considerados como referenciales.

a/ La estimación de cobertura nacional son realizadas con los datos captados en el año 2007; y la estimación del ámbito JUNTOS (638 distritos) son realizadas con información captada en el periodo 2005-2007, 1er. trimestre 2008 y la ampliación muestral. Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2007, 2009 y 2010.

CUADRO N° 21A: PROPORCIÓN DE MUJERES EN UNIÓN QUE USA ACTUALMENTE ALGÚN MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2000, JUNIO 2007, 2009 Y 2010

Departamento	2000				Junio 2007 a/				2009				2010			
	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Intervalo de confianza al 95%		Casos sin Ponderar	C.V.	
												Inferior	Superior			
Total	68,9	0,7	16 518	73,1	1,3	3 866	73,2	0,7	14 637	74,4	0,7	73,4	75,4	13 626	0,7	
Amazonas	64,8	2,6	741	75,1	2,6	724	77,3	2,5	662	77,9	2,6	74,0	81,9	565	2,6	
Ancash	62,5	2,8	560	71,4	2,2	669	78,6	2,3	597	80,1	2,5	76,1	84,1	557	2,5	
Apurímac	63,9	3,0	725	71,8	2,7	663	77,5	2,5	531	76,5	3,0	71,9	81,0	495	3,0	
Arequipa	75,4	3,0	615	77,7	1,9	838	75,7	3,0	497	71,3	3,1	67,0	75,6	461	3,1	
Ayacucho	55,4	4,4	720	71,8	2,3	685	69,0	3,4	565	69,7	3,4	65,1	74,3	583	3,4	
Cajamarca	62,9	3,7	587	72,5	2,7	693	69,6	3,1	617	79,4	2,2	76,0	82,9	562	2,2	
Cusco	67,3	2,7	587	72,5	2,7	530	71,9	3,0	481	70,5	3,2	66,1	74,9	577	3,2	
Huancavelica	49,6	5,1	617	64,7	4,8	681	71,5	4,2	468	70,6	4,0	65,0	76,2	427	4,0	
Huánuco	60,2	5,0	631	68,9	3,2	618	68,2	3,9	522	71,9	2,9	67,9	76,0	522	2,9	
Ica	77,5	2,3	537	75,0	2,0	799	75,8	2,2	559	79,0	2,2	75,6	82,3	544	2,2	
Junín	74,5	3,3	616	71,3	2,5	537	69,0	2,7	546	74,8	2,9	70,6	79,0	546	2,9	
La Libertad	68,3	2,9	612	72,3	3,0	709	66,7	3,3	610	72,9	2,9	68,7	77,1	542	2,9	
Lambayeque	65,6	3,4	587	73,1	2,3	760	74,7	2,8	447	72,8	3,3	68,0	77,5	466	3,3	
Lima	72,9	1,4	1 773	72,2	1,7	1 346	76,2	1,6	1 341	76,5	1,7	74,0	79,0	1 233	1,7	
Loreto	63,1	3,6	700	60,5	3,7	736	67,1	3,1	658	64,3	3,4	60,1	68,6	549	3,4	
Madre de Dios	66,9	4,0	706	72,4	1,8	1 084	70,9	2,6	723	76,4	3,0	72,0	80,9	605	3,0	
Moquegua	75,8	1,9	629	76,2	2,0	772	73,3	2,8	540	78,7	2,6	74,7	82,6	479	2,6	
Pasco	70,9	2,5	570	74,1	2,5	740	73,3	2,6	689	75,1	3,2	70,4	79,8	563	3,2	
Piura	68,9	3,1	739	74,1	2,4	740	73,8	2,5	675	73,6	2,4	70,2	77,1	664	2,4	
Puno	61,4	3,0	819	72,0	2,2	732	68,5	2,9	668	72,5	2,4	69,1	76,0	578	2,4	
San Martín	72,5	2,6	677	73,5	1,9	987	75,1	2,8	589	70,6	2,6	67,1	74,2	604	2,6	
Tacna	79,4	2,2	509	80,6	2,2	690	82,0	1,9	460	74,4	3,0	70,0	78,9	398	3,0	
Tumbes	77,8	2,2	612	76,0	2,0	916	76,8	2,1	590	78,2	2,1	75,0	81,3	548	2,1	
Ucayali	70,4	3,3	649	67,4	2,4	851	64,4	3,6	602	66,9	2,9	63,1	70,7	558	2,9	

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación (C.V.) mayor a 15,0% deben ser considerados como referenciales.

a/ La estimación a nivel nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007 y la estimación a nivel departamental corresponde a información recolectada en los años 2005, 2006, 2007 y 1er. trimestre 2008 mas ampliación muestral, la mediana de fecha de entrevistas es junio 2007.

Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar: ENDES 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.

CUADRO N° 22: PROPORCIÓN DE MUJERES EN UNIÓN QUE USA ACTUALMENTE UN MÉTODO MODERNO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, SEGUN ÁMBITO GEOGRÁFICO Y CARACTERÍSTICAS, 2000, 2007, 2009 Y 2010

Ámbito geográfico / Características	2000			2007 a/			2009			2010				
	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Intervalo de confianza al 95%		C.V.	Casos sin Ponderar	
										Inferior	Superior			
Total	50,4	1,1	16 518	47,8	2,8	3 866	50,0	1,3	14 637	50,5	49,2	51,8	1,3	13 626
Área de residencia														
Urbana	56,1	1,2	9 099	51,9	2,9	2 052	53,3	1,5	8 860	53,6	52,1	55,2	1,5	8 129
Rural	40,3	2,4	7 419	39,9	6,2	1 814	42,3	2,7	5 777	43,4	41,2	45,5	2,5	5 497
Región natural														
Costa	58,2	1,4	5 721	54,3	3,2	1 221	56,3	1,8	5 053	56,6	54,6	58,6	1,8	4 758
Lima Metropolitana	58,8	2,0	1 487	53,2	5,3	295	57,9	2,6	1 205	57,5	54,4	60,6	2,8	1 104
Resto Costa	57,6	2,0	4 234	55,5	3,4	926	54,2	2,3	3 848	55,6	53,3	57,8	2,1	3 654
Sierra	38,9	2,2	6 789	39,4	5,5	1 689	41,4	2,3	5 914	43,0	41,2	44,9	2,2	5 597
Sierra urbana	47,7	2,8	2 310	43,9	6,5	533	44,7	2,8	2 368	45,7	43,2	48,1	2,8	2 216
Sierra rural	34,1	3,4	4 479	36,7	8,2	1 156	38,9	3,6	3 546	41,0	38,5	43,6	3,2	3 381
Selva	50,5	2,7	4 008	49,2	5,8	956	49,3	2,3	3 670	47,2	44,6	49,8	2,8	3 271
Selva urbana	55,5	2,9	1 959	53,6	6,5	466	51,8	2,5	1 970	49,6	46,4	52,8	3,3	1 742
Selva rural	46,1	4,6	2 049	44,9	10,6	490	46,5	4,1	1 700	44,7	40,4	48,9	4,8	1 529
Nivel de educación														
Sin educación/Primaria	42,0	2,1	8 295	39,7	5,3	1 727	43,3	2,3	5 971	44,1	42,1	46,0	2,3	5 518
Secundaria	56,7	1,5	5 589	54,2	3,9	1 345	53,1	1,7	5 690	52,3	50,3	54,2	1,9	5 253
Superior	58,1	2,2	2 634	51,2	5,2	794	54,3	2,3	2 976	57,0	54,6	59,5	2,2	2 855
Quintil de riqueza														
Quintil inferior	36,8	3,5	4 050	35,0	8,1	966	40,4	3,6	3 382	41,0	38,3	43,8	3,4	3 286
Segundo quintil	45,8	2,6	3 998	45,3	5,5	1 038	45,8	2,3	3 755	47,1	44,7	49,4	2,5	3 241
Quintil intermedio	54,4	2,0	3 633	53,7	4,3	798	52,5	2,3	3 387	53,8	51,4	56,3	2,3	3 150
Cuarto quintil	56,3	2,0	2 886	53,1	5,1	603	54,8	2,8	2 438	52,9	49,9	55,9	2,9	2 379
Quintil superior	58,0	2,1	1 951	50,5	5,8	461	55,8	2,6	1 675	57,4	54,5	60,4	2,6	1 570
Ámbito JUNTOS	32,7	3,0	3 164	37,5	4,0	3 303	40,0	3,9	2 745	43,0	39,8	46,2	3,8	2 523

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación (C.V.) mayor a 15,0% deben ser considerados como referenciales.

a/ La estimación de cobertura nacional son realizadas con los datos captados en el año 2007; y la estimación del ámbito JUNTOS (638 distritos) son realizadas con información captada en el periodo 2005-2007, 1er. trimestre 2008 y la ampliación muestral. Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2007, 2009 y 2010.

CUADRO N° 22A: PROPORCIÓN DE MUJERES EN UNIÓN QUE USA ACTUALMENTE UN MÉTODO MODERNO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2000, JUNIO 2007, 2009 Y 2010

Departamento	2000					Junio 2007 al					2009					2010				
	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Intervalo de confianza al 95%		C.V.	Casos sin Ponderar				
													Inferior	Superior						
Total	50,4	1,1	16 518	47,8	2,8	3 866	50,0	1,3	14 637	50,5	1,3	14 637	49,2	51,8	1,3	13 626				
Amazonas	44,3	5,3	741	46,3	5,9	724	50,6	5,4	662	44,9	5,9	662	39,6	50,1	5,9	565				
Ancash	40,9	5,3	560	41,8	5,9	669	46,7	5,7	597	49,5	5,5	597	44,2	54,8	5,5	557				
Apurímac	47,6	5,3	725	47,4	5,5	663	49,7	5,5	531	48,1	8,9	531	39,7	56,4	8,9	495				
Arequipa	57,6	4,6	615	54,5	3,8	838	56,0	4,4	497	48,0	5,3	497	43,0	52,9	5,3	461				
Ayacucho	33,1	6,7	720	37,8	6,1	685	41,2	6,1	565	42,2	6,5	565	36,8	47,6	6,5	583				
Cajamarca	41,2	7,3	587	45,1	6,4	693	44,0	5,7	617	47,7	6,5	617	41,6	53,8	6,5	562				
Cusco	43,8	5,2	587	44,7	7,1	530	40,6	6,2	481	41,4	6,5	481	36,1	46,6	6,5	577				
Huancavelica	24,6	11,5	617	37,2	9,0	681	37,3	12,0	468	37,5	7,9	468	31,7	43,2	7,9	427				
Huánuco	46,0	7,1	631	52,7	5,1	618	52,1	5,3	522	55,3	4,6	522	50,3	60,4	4,6	522				
Ica	60,9	4,1	537	54,6	3,1	799	55,5	4,4	559	56,6	3,4	559	52,9	60,3	3,4	544				
Junín	43,5	5,8	616	46,9	4,8	537	44,9	5,3	546	48,0	5,9	546	42,4	53,6	5,9	546				
La Libertad	46,7	3,9	612	44,6	5,4	709	45,7	5,1	610	50,1	4,9	610	45,3	54,9	4,9	542				
Lambayeque	50,8	5,0	587	49,6	3,6	760	52,1	5,4	447	51,7	6,5	447	45,1	58,3	6,5	466				
Lima	58,1	2,0	1 773	54,7	2,3	1 346	57,6	2,6	1 341	57,4	2,6	1 341	54,5	60,3	2,6	1 233				
Loreto	48,3	5,7	700	40,1	7,4	736	44,5	5,4	658	45,7	6,0	658	40,3	51,1	6,0	549				
Madre de Dios	54,5	4,8	706	54,0	3,6	1 084	49,9	4,9	723	50,1	4,7	723	45,5	54,7	4,7	605				
Moquegua	60,3	2,7	629	55,7	3,5	772	52,2	4,4	540	61,5	4,3	540	56,3	66,7	4,3	479				
Pasco	50,4	4,1	570	56,1	3,4	740	57,3	4,2	689	56,7	4,6	689	51,6	61,8	4,6	563				
Plura	57,0	4,5	739	52,7	5,3	740	52,7	5,5	675	57,2	4,4	675	52,3	62,2	4,4	664				
Puno	24,2	7,3	819	24,7	9,5	732	25,1	8,7	668	24,7	8,1	668	20,8	28,6	8,1	578				
San Martín	57,5	4,1	677	53,8	3,9	987	50,8	4,8	589	47,8	5,2	589	42,9	52,7	5,2	604				
Tacna	60,1	3,3	509	57,2	3,4	690	52,4	5,2	460	46,3	5,9	460	40,9	51,7	5,9	398				
Tumbes	69,1	2,7	612	65,7	2,8	916	67,0	3,3	590	67,6	2,6	590	64,2	71,0	2,6	548				
Ucayali	58,9	4,1	649	50,1	4,2	851	49,7	4,7	602	47,5	5,6	602	42,2	52,7	5,6	558				

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación (C.V.) mayor a 15,0% deben ser considerados como referenciales.

a/ La estimación a nivel nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007 y la estimación a nivel departamental corresponde a información recolectada en los años 2005, 2006, 2007 y 1er. trimestre 2008 más ampliación muestral, la mediana de fecha de entrevistas es junio 2007.

Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar: ENDES 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.

CUADRO N° 23: PROPORCIÓN DE MUJERES EN UNIÓN QUE USA ACTUALMENTE UN MÉTODO TRADICIONAL DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO Y CARACTERÍSTICAS, 2000, 2007, 2009 Y 2010

Ambito geográfico / Características	2000			2007 al			2009			2010		
	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Intervalo de confianza al 95%		Casos sin Ponderar
										Inferior	Superior	
Total	18,5	2,2	16 518	25,3	4,0	3 866	23,2	2,3	14 637	23,9	2,1	13 626
Área de residencia												
Urbana	16,9	2,9	9 099	21,9	5,6	2 052	21,3	3,0	8 860	21,6	2,8	8 129
Rural	21,2	3,3	7 419	31,9	5,7	1 814	27,8	3,4	5 777	29,0	2,8	5 497
Región natural												
Costa	14,6	3,8	5 721	20,2	7,7	1 221	19,5	4,1	5 053	19,7	3,6	4 758
Lima Metropolitana	14,7	6,1	1 487	17,3	14,4	295	18,7	6,8	1 205	19,3	5,9	1 104
Resto Costa	14,5	4,2	4 234	23,8	7,0	926	20,6	4,4	3 848	20,1	3,9	3 654
Sierra	24,9	2,8	6 789	33,9	4,6	1 689	29,2	2,9	5 914	30,0	2,8	5 597
Sierra urbana	25,5	3,8	2 310	31,0	5,8	533	27,4	4,1	2 368	28,8	4,4	2 216
Sierra rural	24,6	3,8	4 479	35,6	6,2	1 156	30,5	4,0	3 546	31,0	3,6	3 381
Selva	16,4	5,8	4 008	17,5	10,1	956	21,1	4,8	3 670	23,3	4,5	3 271
Selva urbana	15,9	6,1	1 959	15,0	15,6	466	20,2	6,0	1 970	19,6	7,4	1 742
Selva rural	16,8	9,3	2 049	19,9	13,8	490	22,1	7,6	1 700	27,2	5,5	1 529
Nivel de educación												
Sin educación/Primaria	19,3	3,1	8 295	31,6	5,1	1 727	27,0	3,1	5 971	28,1	2,8	5 518
Secundaria	17,9	3,5	5 589	20,4	7,5	1 345	21,2	3,7	5 690	22,7	3,3	5 253
Superior	17,4	5,3	2 634	22,6	9,7	794	21,2	4,8	2 976	19,6	4,8	2 855
Quintil de riqueza												
Quintil inferior	18,4	4,9	4 050	32,9	7,1	966	27,9	3,9	3 382	28,2	3,7	3 286
Segundo quintil	21,6	4,2	3 998	32,0	6,3	1 038	26,5	3,7	3 755	28,2	3,8	3 241
Quintil intermedio	18,4	4,4	3 633	22,6	9,2	798	22,8	4,5	3 387	22,5	4,6	3 150
Cuarto quintil	18,0	4,8	2 886	21,1	9,9	603	21,1	5,0	2 438	22,0	5,7	2 379
Quintil superior	15,7	5,8	1 951	17,7	14,2	461	17,8	6,6	1 675	18,2	6,4	1 570
Ámbito JUNTOS	21,8	3,2	3 164	30,5	4,0	3 303	28,6	4,4	2 745	29,3	4,4	2 523

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación (C.V.) mayor a 15,0% deben ser considerados como referenciales.

a/ La estimación de cobertura nacional son realizadas con los datos captados en el año 2007; y la estimación del ámbito JUNTOS (638 distritos) son realizadas con información captada en el periodo 2005-2007. 1er. trimestre 2008 y la ampliación muestral. Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2007, 2009 y 2010.

CUADRO N° 23A: PROPORCIÓN DE MUJERES EN UNIÓN QUE USA ACTUALMENTE UN MÉTODO TRADICIONAL DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2000, JUNIO 2007, 2009 Y 2010

Departamento	2000				Junio 2007 a/				2009				2010				
	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		C.V.	Casos sin Ponderar
														Inferior	Superior		
Total	18,5	2,2	16 518	25,3	4,0	3 866	23,2	2,3	14 637	23,9	2,1	13 626	22,9	24,8	2,1	13 626	
Amazonas	20,5	7,0	741	28,8	6,4	724	26,7	9,3	662	33,1	6,7	565	28,7	37,5	6,7	565	
Ancash	21,6	6,7	560	29,5	7,3	669	31,9	7,6	597	30,6	6,0	557	27,1	34,2	6,0	557	
Apurímac	16,3	8,6	725	24,5	9,3	663	27,9	7,7	531	28,4	11,7	495	21,9	34,9	11,7	495	
Arequipa	17,9	8,0	615	23,2	7,2	838	19,7	8,7	497	23,3	10,3	461	18,6	28,0	10,3	461	
Ayacucho	22,4	7,2	720	34,0	5,8	685	27,7	7,0	565	27,6	7,1	583	23,7	31,4	7,1	583	
Cajamarca	21,6	9,4	587	27,4	8,3	693	25,6	9,2	617	31,8	8,2	562	26,6	36,9	8,2	562	
Cusco	23,5	8,8	587	27,9	8,5	530	31,3	8,6	481	29,2	9,4	577	23,8	34,5	9,4	577	
Huancavelica	25,0	5,7	617	27,5	6,9	681	34,2	8,5	468	33,1	6,0	427	29,2	37,0	6,0	427	
Huánuco	14,3	8,6	631	16,2	10,1	618	16,1	14,6	522	16,6	11,1	522	13,0	20,2	11,1	522	
Ica	16,6	11,0	537	20,4	7,4	799	20,3	10,0	559	22,4	8,5	544	18,6	26,1	8,5	544	
Junín	31,0	8,6	616	24,4	6,8	537	24,1	8,3	546	26,8	7,3	546	23,0	30,6	7,3	546	
La Libertad	21,6	8,9	612	27,8	7,5	709	21,0	8,8	610	22,8	8,9	542	18,8	26,7	8,9	542	
Lambayeque	14,8	9,1	587	23,5	5,8	760	22,6	11,0	447	21,1	9,7	466	17,1	25,1	9,7	466	
Lima	14,8	5,7	1 773	17,5	5,6	1 346	18,5	6,5	1 341	19,1	5,6	1 233	17,0	21,2	5,6	1 233	
Loreto	14,9	8,7	700	20,4	7,5	736	22,6	10,8	658	18,7	10,4	549	14,8	22,5	10,4	549	
Madre de Dios	12,3	9,8	706	18,4	7,5	1 084	20,9	7,9	723	26,3	8,6	605	21,9	30,8	8,6	605	
Moquegua	15,6	8,5	629	20,5	6,7	772	21,1	8,6	540	17,2	8,5	479	14,3	20,0	8,5	479	
Pasco	20,5	8,3	570	17,9	8,0	740	16,0	11,2	689	18,4	10,1	563	14,8	22,1	10,1	563	
Plura	11,9	10,0	739	21,4	10,3	740	21,1	9,8	675	16,4	8,9	664	13,5	19,3	8,9	664	
Puno	37,2	4,2	819	47,3	5,4	732	43,3	5,7	668	47,8	5,5	578	42,7	53,0	5,5	578	
San Martín	15,1	8,3	677	19,6	9,6	987	24,3	8,4	589	22,8	9,5	604	18,6	27,0	9,5	604	
Tacna	19,3	9,5	509	23,4	7,3	690	29,6	7,8	460	28,1	7,7	398	23,9	32,4	7,7	398	
Tumbes	8,7	14,0	612	10,4	8,9	916	9,8	15,4	590	10,5	14,4	548	7,6	13,5	14,4	548	
Ucayali	11,6	7,7	649	17,3	8,9	851	14,7	10,0	602	19,4	10,5	558	15,4	23,4	10,5	558	

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación (C.V.) mayor a 15,0% deben ser considerados como referenciales.

a/ La estimación a nivel nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007 y la estimación a nivel departamental corresponde a información recopilada en los años 2005, 2006, 2007 y 1er. trimestre 2008 más ampliación muestral, la mediana de fecha de entrevistas es junio 2007.

Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar: ENDES 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.

CUADRO N° 24: PROPORCIÓN DE PARTO INSTITUCIONAL DE GESTANTES PROCEDENTES DEL ÁREA RURAL DEL ÚLTIMO NACIMIENTO EN LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO Y CARACTERÍSTICAS, 2000, 2007, 2009 Y 2010

Ámbito geográfico / Características	2000				2007 a/				2009				2010			
	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Intervalo de confianza al 95%		C.V.	Casos sin Ponderar
													Inferior	Superior		
Total	23,4	4,1	5 344	49,4	8,1	1 122	55,0	3,2	4 637	58,4	3,0	4 637	54,9	61,9	3,0	4 251
Área de residencia	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Urbana	23,4	4,1	5 344	49,4	8,1	1 122	55,0	3,2	4 637	58,4	3,0	4 637	54,9	61,9	3,0	4 251
Rural																
Región natural																
Resto Costa	50,9	8,3	507	80,1	11,6	104	78,6	5,1	339	72,9	8,1	339	61,3	84,6	8,1	400
Sierra rural	17,9	5,8	3 364	46,0	9,4	711	55,6	3,9	2 778	61,0	3,6	2 778	56,7	65,4	3,6	2 525
Selva rural	21,9	7,7	1 473	43,2	14,7	307	43,0	6,5	1 520	44,1	7,0	1 520	38,1	50,2	7,0	1 326
Nivel de educación																
Sin educación/Primaria	15,0	5,5	3 960	39,1	10,1	723	47,2	4,2	3 006	51,0	4,0	3 006	47,0	55,0	4,0	2 714
Secundaria	40,1	5,2	1 136	67,2	7,2	338	67,5	3,4	1 437	69,5	3,3	1 437	65,0	74,0	3,3	1 318
Superior	81,2	3,3	248	91,6	4,2	61	85,0	5,1	194	88,8	2,8	194	83,9	93,6	2,8	219
Quintil de riqueza																
Quintil inferior	13,7	6,0	3 071	35,0	10,3	620	45,5	4,7	2 809	49,4	4,2	2 809	45,3	53,4	4,2	2 660
Segundo quintil	26,9	6,0	1 767	61,2	7,6	385	66,5	3,2	1 407	71,3	2,8	1 407	67,4	75,2	2,8	1 205
Quintil intermedio	57,0	5,6	413	81,9	6,9	85	82,4	3,9	368	81,4	3,7	368	75,5	87,3	3,7	320
Cuarto quintil	77,9	6,5	79	98,9	1,2	26	99,8	0,2	46	82,0	9,5	46	66,7	97,2	9,5	48
Quintil superior	83,6	7,4	14	71,7	36,0	6	100,0	0,0	7	98,6	1,6	7	95,5	101,6	1,6	18
Ámbito JUNTOS	13,6	6,1	2 375	42,2	5,4	2 062	50,9	4,8	2 161	56,8	4,7	2 161	51,5	62,0	4,7	1 815

Nota: - Los Estimadores con Coeficiente de Variación (C.V.) mayor a 15,0% deben ser considerados como referenciales.

- Parto institucional se refiere a los partos ocurridos en establecimiento de salud y que fueron atendidos por profesional de la salud: Médico, Obstetiz y/o Enfermera.

n.c = No Corresponde por ser información para el área rural.

a/ La estimación de cobertura nacional son realizadas con los datos capturados en el año 2007; y, la estimación del ámbito JUNTOS (638 distritos) son realizadas con información captada en el periodo 2005-2007, 1er. trimestre 2008 y la ampliación muestral.

Fuente: INE-I Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2007, 2009 y 2010.

CUADRO Nº 24A: PROPORCIÓN DE PARTO INSTITUCIONAL DE GESTANTES PROCEDENTES DEL ÁREA RURAL DEL ÚLTIMO NACIMIENTO EN LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA, SEGUN DEPARTAMENTO, 2000, JUNIO 2007 Y 2009-2010

Departamento	2000				Junio 2007 a/				2009-2010 b/			
	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		C.V.	Casos sin Ponderar	
								Inferior	Superior			
Total	23,4	4,1	5 344	49,4	8,1	1 122	58,4	54,9	61,9	3,0	4 251	
Amazonas	19,3	16,9	394	36,2	14,0	343	50,7	43,2	58,2	7,5	674	
Áncash	16,3	20,4	246	53,0	9,3	234	68,5	60,0	77,1	6,4	477	
Apurímac	34,5	7,2	406	83,3	3,8	293	93,8	91,8	95,9	1,1	542	
Arequipa	45,8	32,3	59	69,4	20,4	72	79,6	62,7	96,6	10,8	90	
Ayacucho	31,8	14,4	400	58,3	9,7	312	86,8	80,2	93,3	3,9	599	
Cajamarca	12,1	21,5	314	36,4	14,8	313	48,1	40,5	55,8	8,1	685	
Cusco	23,7	13,0	291	65,8	11,0	193	68,0	57,1	78,8	8,1	446	
Huancaavelica	14,0	14,7	464	51,6	8,9	403	61,8	53,6	69,9	6,7	648	
Huanuco	15,2	24,0	396	52,4	10,7	267	67,2	59,7	74,7	5,7	613	
Ica	82,1	6,1	67	93,1	4,1	87	97,3	94,2	100,4	1,6	91	
Junín	28,4	15,2	204	55,7	13,3	183	44,7	30,0	59,4	16,8	382	
La Libertad	16,4	23,0	171	29,5	22,9	183	38,5	21,3	55,7	22,7	332	
Lambayeque	33,0	21,3	115	59,7	10,5	124	63,1	31,9	94,3	25,2	175	
Lima	51,1	18,1	122	79,2	13,4	53	76,6	61,2	91,9	10,2	55	
Loreto	11,2	22,1	232	11,9	24,5	227	14,3	10,9	17,7	12,2	543	
Madre de Dios	59,7	6,9	196	74,6	5,8	224	73,4	62,0	84,9	7,9	325	
Moquegua	57,4	15,0	68	66,7	17,9	48	81,0	66,9	95,1	8,9	123	
Pasco	29,9	22,6	197	56,8	10,5	190	61,8	50,0	73,6	9,7	407	
Piura	36,4	15,2	154	44,0	21,1	150	55,6	38,5	72,7	15,7	257	
Puno	10,3	15,3	358	27,8	13,1	248	46,5	37,9	55,2	9,5	454	
San Martín	28,1	16,3	203	61,1	9,0	275	56,1	45,2	67,1	9,9	458	
Tacna	45,2	11,3	42	61,3	20,0	80	74,9	65,2	84,6	6,6	66	
Tumbes	83,9	6,1	56	90,1	5,0	71	83,8	63,8	103,8	12,1	81	
Ucayali	20,6	28,9	189	31,7	22,4	164	24,1	11,8	36,4	26,0	365	

Nota: - Los Estimadores con Coeficiente de Variación (C.V.) mayor a 15,0% deben ser considerados como referenciales.

- Refiere a los partos ocurridos en establecimiento de salud y que fueron atendidos por profesional de la salud: Médico, Obstetiz y/o Enfermera.

a/ La estimación a nivel nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007 y la estimación a nivel departamental corresponde a información recolectada en los años 2005, 2006, 2007 y Ter. trimestre 2008 más ampliación muestral. La mediana de fecha de entrevistas es junio 2007.

b/ La estimación a nivel nacional corresponde a información recolectada entre los meses de marzo a diciembre del 2010 y la estimación a nivel departamental corresponde a información recolectada en el año 2009 y 2010.

Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar: ENDES 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.

CUADRO N° 25: PROPORCIÓN DE PARTO INSTITUCIONAL DEL ÚLTIMO NACIMIENTO EN LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA, SEGUN AMBITO GEOGRAFICO Y CARACTERISTICAS, 2000, 2007, 2009 Y 2010

Ámbito geográfico / Características	2000			2007 a/			2009			2010				
	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Intervalo de confianza al 95%		Casos sin Ponderar		
										Inferior	Superior			
Total	57,6	1,4	10 499	76,0	2,5	2 149	79,1	1,0	10 289	81,0	79,3	82,7	1,1	9 252
Área de residencia														
Urbana	82,1	1,0	5 155	93,6	1,2	1 027	92,5	0,7	5 652	93,7	92,4	94,9	0,7	5 001
Rural	23,4	4,1	5 344	49,4	8,1	1 122	55,0	3,2	4 637	58,4	54,9	61,8	3,0	4 251
Región natural														
Costa	83,3	1,2	3 132	96,1	1,2	592	94,9	0,6	3 102	94,3	92,8	95,8	0,8	2 846
Lima Metropolitana	93,3	1,0	802	97,8	1,2	137	97,3	0,7	725	98,8	98,0	99,6	0,4	623
Resto Costa	73,1	2,3	2 330	94,3	2,1	455	92,1	1,1	2 377	89,5	86,8	92,2	1,5	2 223
Sierra	33,3	3,5	4 733	60,3	5,6	995	67,0	2,4	4 260	72,9	69,8	76,1	2,2	3 895
Sierra urbana	69,0	3,1	1 369	87,9	3,5	284	86,1	2,1	1 482	91,8	88,9	94,7	1,6	1 370
Sierra rural	17,9	5,8	3 364	46,0	9,4	711	55,6	3,9	2 778	61,0	56,7	65,4	3,6	2 525
Selva	40,4	4,4	2 634	58,6	6,5	562	62,3	3,2	2 927	61,4	56,9	66,0	3,8	2 511
Selva urbana	66,9	3,7	1 161	77,8	7,4	255	83,2	2,7	1 407	81,9	75,7	88,0	3,8	1 185
Selva rural	21,9	7,7	1 473	43,2	14,7	307	43,0	6,5	1 520	44,1	38,1	50,2	7,0	1 326
Nivel de educación														
Sin educación/Primaria	27,7	3,8	5 267	52,9	6,2	938	57,2	2,7	4 196	61,0	57,7	64,3	2,7	3 735
Secundaria	75,7	1,3	3 616	86,0	2,1	790	88,2	0,9	4 207	89,4	87,9	90,9	0,9	3 804
Superior	93,0	0,9	1 616	97,8	0,6	421	96,0	0,7	1 886	97,5	96,7	98,3	0,4	1 713
Quintil de riqueza														
Quintil inferior	15,7	5,8	3 315	38,3	9,2	680	47,9	4,1	3 157	51,2	47,4	55,1	3,8	2 944
Segundo quintil	40,6	3,7	2 739	70,7	4,4	608	75,7	1,8	2 824	79,8	77,2	82,3	1,6	2 340
Quintil intermedio	73,4	1,9	2 086	92,0	2,0	413	93,2	1,0	2 154	93,3	91,8	94,8	0,8	1 997
Cuarto quintil	89,1	1,1	1 463	98,0	0,7	249	96,8	0,7	1 336	97,5	96,3	98,7	0,6	1 261
Quintil superior	96,1	0,8	896	98,1	1,3	199	97,2	0,7	818	99,0	98,2	99,7	0,4	710
Ámbito JUNTOS	14,7	5,4	2 523	44,1	5,0	2 232	54,5	4,3	2 409	60,4	55,4	65,5	4,3	2 030

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación (C.V.) mayor a 15,0% deben ser considerados como referenciales.

a/ La estimación de cobertura nacional son realizadas con los datos captados en el año 2007, y la estimación del ámbito JUNTOS (638 distritos) son realizadas con información captada en el periodo 2005-2007, 1er. trimestre 2008 y la ampliación muestral.

Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2007, 2009 y 2010.

CUADRO N° 25A: PROPORCIÓN DE PARTO INSTITUCIONAL DEL ÚLTIMO NACIMIENTO EN LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2000, JUNIO 2007, 2009 Y 2010

Departamento	2000				Junio 2007 a/				2009				2010			
	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Intervalo de confianza al 95%		C.V.	Casos sin Ponderar
													Inferior	Superior		
Total	57,6	1,4	10 499	76,0	2,5	2 149	79,1	1,0	10 289	81,0	1,1	9 252	79,3	82,7	1,1	9 252
Amazonas	27,1	11,3	498	47,6	9,5	435	59,6	7,0	479	63,3	6,4	423	55,4	71,3	6,4	423
Áncash	38,4	9,2	385	71,7	4,9	394	78,9	5,1	421	78,9	4,4	357	72,1	85,6	4,4	357
Apurímac	45,6	5,0	511	87,3	2,7	405	93,6	1,5	392	96,8	1,0	340	94,8	98,7	1,0	340
Arequipa	77,8	6,1	316	88,9	3,4	395	91,9	2,2	265	95,2	1,8	280	91,8	98,6	1,8	280
Ayacucho	46,5	8,1	561	72,0	5,7	473	90,9	2,2	431	88,5	3,8	461	81,9	95,0	3,8	461
Cajamarca	21,6	14,7	379	46,6	9,8	394	58,3	6,7	437	56,8	7,9	415	48,1	65,6	7,9	415
Cusco	38,9	8,8	409	77,3	6,2	297	76,4	6,5	334	80,0	5,1	378	71,9	88,1	5,1	378
Huancavelica	19,4	12,0	525	56,7	7,4	489	63,0	7,6	400	67,8	6,5	336	59,2	76,4	6,5	336
Huánuco	28,3	12,6	488	63,7	7,4	369	71,7	5,4	425	78,7	3,9	382	72,6	84,7	3,9	382
Ica	92,5	1,5	320	96,3	1,2	416	96,4	1,0	360	97,3	1,2	343	95,0	99,7	1,2	343
Junín	46,0	8,7	387	72,6	6,3	327	66,7	6,8	399	69,7	8,0	362	58,7	80,6	8,0	362
La Libertad	51,3	5,7	378	69,8	6,3	406	69,0	6,5	414	78,0	4,3	403	71,4	84,6	4,3	403
Lambayeque	57,4	6,6	326	83,3	2,5	414	89,1	5,2	275	82,4	9,2	285	67,6	97,3	9,2	285
Lima	89,3	1,5	979	97,2	0,7	636	96,3	0,7	818	97,5	0,6	697	96,4	98,7	0,6	697
Loreto	39,4	10,3	505	46,7	8,7	532	50,8	6,0	632	46,0	8,6	538	38,2	53,8	8,6	538
Madre de Dios	74,9	3,1	458	89,9	1,8	637	88,3	2,3	529	84,2	4,3	391	77,2	91,3	4,3	391
Moquegua	83,2	3,6	304	90,6	2,9	313	95,2	1,7	304	92,5	3,0	287	87,1	98,0	3,0	287
Pasco	50,0	9,2	408	75,0	4,5	474	74,3	5,7	506	80,2	5,5	382	71,4	88,9	5,5	382
Plura	63,4	4,9	437	75,4	4,8	427	81,3	3,6	458	81,3	4,9	446	73,5	89,2	4,9	446
Puno	20,5	10,1	531	43,4	7,9	377	56,3	7,9	419	62,9	6,1	347	55,3	70,4	6,1	347
San Martín	45,0	8,0	389	71,6	5,0	508	63,4	7,5	418	72,7	6,3	416	63,8	81,6	6,3	416
Tacna	82,2	3,1	259	88,0	3,8	330	92,2	2,0	259	91,7	2,9	190	86,5	96,8	2,9	190
Tumbes	85,7	2,9	329	94,0	1,5	458	94,0	1,5	380	94,9	2,5	336	90,2	99,6	2,5	336
Ucayali	45,6	9,0	417	72,6	5,0	518	60,4	7,4	534	65,8	7,3	457	56,4	75,2	7,3	457

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación (C.V.) mayor a 15,0% deben ser considerados como referenciales.

a/ La estimación a nivel nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007 y la estimación a nivel departamental corresponde a información recolectada en los años 2005, 2006, 2007 y 1er. trimestre 2008 más ampliación muestral, la mediana de fecha de entrevistas es Junio 2007.

Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar: ENDES 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.

CUADRO N° 26: PROPORCIÓN DE GESTANTES QUE DIERON PARTO POR CESÁREA PROCEDENTES DEL ÁREA RURAL DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO Y CARACTERÍSTICAS, 2000, 2007, 2009 Y 2010

Ambito geográfico / Características	2000				2007 a/				2009				2010			
	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Intervalo de confianza al 95%		Casos sin Ponderar	C.V.	
												Inferior	Superior			
Total	3,7	7,5	7 480	7,0	15,1	1 481	7,5	8,7	4 637	8,4	7,5	7,2	9,7	4 253	7,5	
Área de residencia																
Urbana	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	
Rural	3,7	7,5	7 480	7,0	15,1	1 481	7,5	8,7	4 637	8,4	7,5	7,2	9,7	4 253	7,5	
Región natural																
Resto Costa	9,9	14,1	649	18,5	12,6	133	21,4	14,3	339	14,4	17,5	9,5	19,4	400	17,5	
Sierra rural	2,6	10,8	4 792	6,0	19,9	932	6,4	12,2	2 778	7,5	9,5	6,1	8,9	2 527	9,5	
Selva rural	3,4	17,5	2 039	3,7	28,9	416	4,5	15,8	1 520	8,1	16,3	5,5	10,6	1 326	16,3	
Nivel de educación																
Sin educación/Primaria	2,8	9,7	5 759	4,5	23,2	972	4,5	12,5	3 006	6,6	9,7	5,3	7,8	2 714	9,7	
Secundaria	5,7	14,1	1 426	9,4	21,9	438	10,7	12,3	1 437	9,5	12,1	7,2	11,7	1 319	12,1	
Superior	13,3	13,1	295	29,7	24,1	71	30,0	18,5	194	25,0	13,2	18,5	31,5	220	13,2	
Quintil de riqueza																
Quintil inferior	2,2	12,6	4 531	3,6	25,6	866	4,6	13,7	2 809	6,0	10,2	4,8	7,2	2 661	10,2	
Segundo quintil	4,1	12,0	2 335	10,0	16,9	477	9,2	12,2	1 407	10,2	10,9	8,0	12,3	1 206	10,9	
Quintil intermedio	9,9	17,9	501	14,5	31,4	99	20,4	16,2	368	20,2	17,4	13,3	27,1	320	17,4	
Cuarto quintil	15,1	33,7	97	26,5	33,6	31	45,0	37,9	46	20,8	32,8	7,4	34,3	48	32,8	
Quintil superior	53,6	9,6	16	15,5	97,1	8	66,6	34,2	7	30,8	52,2	-0,8	62,5	18	52,2	
Ámbito JUNTOS	1,8	12,2	3 466	4,4	10,8	2 806	4,8	12,7	2 161	5,7	11,4	4,4	6,9	1 816	11,4	

Nota: - Los Estimadores con Coeficiente de Variación (C.V.) mayor a 15,0% deben ser considerados como referenciales.

N.C.: No Corresponde por ser información para el área rural.

a/ La estimación de cobertura nacional son realizadas con los datos captados en el año 2007; y, la estimación del ámbito JUNTOS (638 distritos) son realizadas con información captada en el periodo 2005-2007, 1er. trimestre 2008 y la ampliación muestral.

Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2007, 2009 y 2010.

CUADRO Nº 26A: PROPORCIÓN DE GESTANTES QUE DIERON PARTO POR CESÁREA PROCEDENTES DEL ÁREA RURAL DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2000, JUNIO 2007 Y 2010

Departamento	2000				Junio 2007 a/				2009-2010 b/			
	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		C.V.	Casos sin Ponderar	
								Inferior	Superior			
Total	3,7	7,5	7 480	7,0	15,1	1 481	8,4	7,2	9,7	7,5	4 253	
Amazonas	4,3	24,4	541	3,3	25,2	449	8,6	5,8	11,4	16,8	674	
Áncash	2,0	44,3	345	8,9	21,6	304	10,1	6,4	13,9	18,9	478	
Apurímac	3,9	28,0	543	8,0	16,0	373	9,0	5,7	12,3	18,5	543	
Arequipa	7,3	67,7	82	12,2	37,9	90	30,2	11,6	48,9	31,5	90	
Ayacucho	1,9	33,4	571	5,4	22,2	426	6,6	4,3	8,8	17,5	599	
Cajamarca	1,6	45,6	429	4,0	31,1	402	6,9	4,6	9,1	16,8	685	
Cusco	3,2	29,7	411	6,1	31,0	263	6,8	3,3	10,3	26,1	446	
Huancavelica	2,6	16,5	739	5,4	20,2	554	4,2	2,3	6,1	23,2	648	
Huánuco	2,5	33,8	560	2,7	29,7	374	6,5	3,7	9,2	21,6	613	
Ica	17,3	33,9	81	22,9	21,4	109	19,8	5,7	33,9	36,1	91	
Junín	3,1	35,9	290	4,0	28,0	226	7,0	3,5	10,5	25,3	382	
La Libertad	5,5	30,7	253	5,2	44,8	248	4,2	1,2	7,3	37,0	332	
Lambayeque	7,0	28,4	157	12,0	27,1	158	12,6	2,7	22,6	40,1	175	
Lima	6,7	32,2	159	13,4	28,4	67	21,0	11,9	30,1	22,0	55	
Loreto	1,7	45,0	351	1,2	57,6	342	0,7	0,0	1,3	50,3	543	
Madre de Dios	3,1	41,6	255	6,6	22,4	286	10,3	5,9	14,6	21,6	325	
Moquegua	8,5	37,7	82	25,5	35,3	55	15,8	7,5	24,1	26,7	123	
Pasco	4,5	40,6	266	5,7	34,9	247	7,4	4,2	10,6	21,9	407	
Piura	6,1	23,1	214	10,6	26,9	207	15,3	8,7	22,0	22,1	257	
Puno	2,8	26,8	501	4,3	23,4	327	5,5	3,5	7,4	18,5	454	
San Martín	4,9	26,5	267	6,9	20,0	346	9,3	5,4	13,3	21,4	458	
Tacna	12,5	56,7	48	23,9	27,0	92	25,2	17,2	33,2	16,2	66	
Tumbes	19,4	29,0	67	32,1	13,7	81	30,4	16,6	44,2	23,2	81	
Ucayali	5,2	37,8	268	3,9	39,9	229	3,6	1,3	5,8	32,1	365	

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación (C.V.) mayor a 15,0% deben ser considerados como referenciales.

a/ La estimación a nivel nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007 y la estimación a nivel departamental corresponde a información recopilada en los años 2005, 2006, 2007 y 1er. trimestre 2008 más ampliación muestral, la mediana de fecha de entrevistas es junio 2007.

b/ La estimación a nivel nacional corresponde a información recolectada entre los meses de marzo a diciembre del 2010 y la estimación a nivel departamental corresponde a información recopilada en el año 2009 y 2010.

Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar: ENDES 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.

CUADRO N° 27: PROPORCIÓN DE NACIMIENTOS POR CESÁREA DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO Y CARACTERÍSTICAS, 2000, 2007, 2009 Y 2010

Ámbito geográfico / Características	2000				2007 a/				2009				2010			
	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Intervalo de confianza al 95%		Casos sin Ponderar	C.V.	
												Inferior	Superior			
Total	12,7	4,0	13 697	16,9	8,8	2 696	21,4	3,4	10 289	20,4	3,7	18,9	21,9	9 281	3,7	
Área de residencia																
Urbana	20,2	4,2	6 217	24,2	9,7	1 215	29,1	3,6	5 652	27,1	4,1	24,9	29,3	5 028	4,1	
Rural	3,7	7,5	7 480	7,0	15,1	1 481	7,5	8,7	4 637	8,4	7,5	7,2	9,6	4 253	7,5	
Región natural																
Costa	22,0	4,9	3 747	29,0	10,3	700	33,6	4,2	3 102	29,6	4,9	26,7	32,4	2 873	4,9	
Lima Metropolitana	26,7	7,0	940	35,6	14,6	160	38,4	5,9	725	31,6	7,7	26,8	36,4	628	7,7	
Resto Costa	17,4	5,7	2 807	22,1	9,9	540	28,1	4,9	2 377	27,4	5,2	24,6	30,2	2 245	5,2	
Sierra	5,0	6,5	6 502	8,2	15,9	1 268	11,0	6,6	4 260	13,1	6,0	11,5	14,6	3 897	6,0	
Sierra urbana	11,5	7,4	1 710	12,7	22,6	336	18,6	7,8	1 482	21,9	7,2	18,8	25,0	1 370	7,2	
Sierra rural	2,6	10,8	4 792	6,0	19,9	932	6,4	12,2	2 778	7,5	9,5	6,1	8,9	2 527	9,5	
Selva	6,8	9,7	3 448	7,1	20,8	728	11,0	8,1	2 927	11,1	9,3	9,1	13,2	2 511	9,3	
Selva urbana	12,5	10,8	1 409	11,9	28,7	312	18,0	8,4	1 407	14,8	11,1	11,6	18,0	1 185	11,1	
Selva rural	3,4	17,5	2 039	3,7	28,9	416	4,5	15,8	1 520	8,1	16,3	5,5	10,6	1 326	16,3	
Nivel de educación																
Sin educación/Primaria	5,3	7,7	7 442	6,6	17,9	1 242	8,1	7,8	4 196	9,8	8,0	8,2	11,3	3 737	8,0	
Secundaria	15,1	5,3	4 390	17,6	10,6	971	23,0	4,6	4 207	19,8	5,3	17,8	21,9	3 821	5,3	
Superior	29,8	5,6	1 865	35,1	10,9	483	39,1	4,6	1 886	39,6	4,6	36,0	43,2	1 723	4,6	
Quintil de riqueza																
Quintil inferior	2,3	11,8	4 869	3,5	24,4	943	5,9	10,8	3 157	6,1	9,6	5,0	7,3	2 946	9,6	
Segundo quintil	6,1	11,0	3 589	9,5	16,7	758	12,4	7,6	2 824	14,0	7,8	11,8	16,1	2 343	7,8	
Quintil intermedio	14,9	7,3	2 518	17,5	16,3	488	23,6	6,1	2 154	21,0	7,1	18,1	23,9	2 004	7,1	
Cuarto quintil	19,9	6,9	1 701	26,1	13,7	279	32,9	6,7	1 336	29,5	6,5	25,8	33,3	1 269	6,5	
Quintil superior	36,1	6,0	1 020	46,1	11,5	228	47,0	5,4	818	46,9	5,6	41,8	52,0	719	5,6	
Ámbito JUNTOS	2,0	11,2	3 659	4,8	10,5	3 017	6,4	11,9	2 409	6,7	11,1	5,2	8,1	2 031	11,1	

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación (C.V.) mayor a 15,0% deben ser considerados como referenciales.

a/ La estimación de cobertura nacional son realizadas con los datos captados en el año 2007; y la estimación del ámbito JUNTOS (638 distritos) son realizadas con información captada en el periodo 2005-2007, 1er. trimestre 2008 y la ampliación muestral. Fuente: INE-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2007, 2009 y 2010.

CUADRO N° 27A: PROPORCIÓN DE NACIMIENTOS POR CESÁREA DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2000, JUNIO 2007, 2009 Y 2010

Departamento	2000					Junio 2007 a/					2009					2010				
	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Intervalo de confianza al 95%		C.V.	Casos sin Ponderar	
																Inferior	Superior			
Total	12,7	4,0	13697	16,9	8,8	2696	21,4	3,4	10289	20,4	3,7	9281	18,9	21,9	3,7	18,9	21,9	3,7	9281	
Amazonas	5,7	20,1	663	6,1	18,5	553	9,9	19,1	479	16,1	12,7	423	12,1	20,1	12,7	12,1	20,1	12,7	423	
Ancash	6,8	24,1	513	15,0	11,1	495	14,7	14,8	421	18,6	14,3	379	13,4	23,8	14,3	13,4	23,8	14,3	379	
Apurímac	6,2	22,4	677	11,1	11,4	499	13,1	19,7	392	10,1	16,4	341	6,9	13,3	16,4	6,9	13,3	16,4	341	
Arequipa	18,3	12,5	389	21,5	12,4	452	27,4	14,8	265	28,8	14,6	280	20,6	37,1	14,6	20,6	37,1	14,6	280	
Ayacucho	3,5	21,0	772	9,0	14,0	613	9,0	21,1	431	8,9	17,6	461	5,8	11,9	17,6	5,8	11,9	17,6	461	
Cajamarca	3,6	21,5	506	5,4	23,7	492	11,0	16,2	437	13,0	13,8	415	9,5	16,6	13,8	9,5	16,6	13,8	415	
Cusco	5,6	22,0	554	11,5	20,2	385	11,7	16,5	334	13,7	17,2	378	9,1	18,4	17,2	9,1	18,4	17,2	378	
Huancavelica	3,0	16,3	827	6,0	16,9	649	5,5	22,7	400	5,8	23,6	336	3,1	8,5	23,6	3,1	8,5	23,6	336	
Huánuco	6,4	22,6	675	5,5	22,5	493	8,8	15,1	425	10,7	19,7	382	6,6	14,8	19,7	6,6	14,8	19,7	382	
Ica	20,5	11,9	381	27,9	9,0	506	23,4	9,5	360	27,3	8,7	343	22,6	31,9	8,7	22,6	31,9	8,7	343	
Junín	5,6	19,2	516	10,2	17,8	397	13,4	15,0	399	16,6	17,2	362	11,0	22,2	17,2	11,0	22,2	17,2	362	
La Libertad	15,8	12,7	495	16,7	13,8	516	20,5	11,6	414	21,4	11,9	403	16,4	26,4	11,9	16,4	26,4	11,9	403	
Lambayeque	15,4	15,7	415	25,4	11,3	496	27,2	10,7	275	26,6	15,1	285	18,7	34,5	15,1	18,7	34,5	15,1	285	
Lima	24,4	6,8	1161	32,3	7,0	744	36,4	5,8	818	30,3	7,5	702	25,9	34,8	7,5	25,9	34,8	7,5	702	
Loreto	5,2	21,2	696	6,4	17,9	730	9,5	16,4	632	6,5	24,2	538	3,4	9,6	24,2	3,4	9,6	24,2	538	
Madre de Dios	9,2	14,2	579	15,3	8,8	767	16,2	10,6	529	15,1	16,7	391	10,1	20,1	16,7	10,1	20,1	16,7	391	
Moquegua	18,0	13,9	350	31,2	8,8	356	30,9	11,1	304	33,3	9,4	287	27,2	39,4	9,4	27,2	39,4	9,4	287	
Pasco	8,0	23,2	522	10,9	14,9	591	10,4	17,6	506	11,7	17,6	382	7,6	15,7	17,6	7,6	15,7	17,6	382	
Piura	12,0	12,3	559	18,6	12,4	548	27,5	10,4	458	28,8	9,6	447	23,4	34,3	9,6	23,4	34,3	9,6	447	
Puno	3,0	20,6	734	7,1	15,1	485	7,4	20,9	419	8,2	18,8	347	5,2	11,2	18,8	5,2	11,2	18,8	347	
San Martín	9,0	17,5	487	11,5	14,3	615	12,9	13,8	418	15,8	13,6	416	11,6	20,0	13,6	11,6	20,0	13,6	416	
Tacna	21,6	13,4	296	31,0	8,5	371	29,6	14,9	259	20,7	14,3	190	14,9	26,5	14,3	14,9	26,5	14,3	190	
Tumbes	26,7	9,5	389	39,9	6,1	523	35,5	8,8	380	35,7	9,6	336	29,0	42,4	9,6	29,0	42,4	9,6	336	
Ucayali	7,0	19,9	541	9,3	13,5	661	7,0	16,3	534	9,0	17,7	457	5,9	12,2	17,7	5,9	12,2	17,7	457	

Nota: Los Esimadores con Coeficiente de Variación (C.V.) mayor a 15,0% deben ser considerados como referenciales.

a/ La estimación a nivel nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007 y la estimación a nivel departamental corresponde a información recopilada en los años 2005, 2006, 2007 y 1er. trimestre 2008 más ampliación muestral. la mediana de fecha de entrevistas es junio 2007.

Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar: ENDES 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.

CUADRO N° 28: PROPORCIÓN DE PARTOS EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE GESTANTES DEL ÁREA RURAL DEL ÚLTIMO NACIMIENTO DE LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO Y CARACTERÍSTICAS, 2000, 2007, 2009 Y 2010

Ámbito geográfico / Características	2000				2007 a/				2009				2010			
	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Intervalo de confianza al 95%		C.V.	Casos sin Ponderar
													Inferior	Superior		
Total	23,8	4,1	5 344	50,5	7,9	1 122	56,5	3,1	4 637	60,0	3,0	4 251	56,5	63,5	3,0	4 251
Área de residencia																
Urbana	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.	N.C.
Rural	23,8	4,1	5 344	50,5	7,9	1 122	56,5	3,1	4 637	60,0	3,0	4 251	56,5	63,5	3,0	4 251
Región natural																
Resto Costa	51,3	8,4	507	80,1	11,6	104	78,6	5,1	339	72,9	8,1	400	61,3	84,6	8,1	400
Sierra rural	18,3	5,7	3 364	46,8	9,4	711	57,1	3,8	2 778	62,9	3,6	2 525	58,5	67,3	3,6	2 525
Selva rural	22,1	7,6	1 473	46,1	12,5	307	45,6	6,3	1 520	45,8	6,8	1 326	39,7	52,0	6,8	1 326
Nivel de educación																
Sin educación/Primaria	15,3	5,4	3 960	40,4	9,8	723	49,1	4,0	3 006	52,9	4,0	2 714	48,8	57,1	4,0	2 714
Secundaria	40,6	5,1	1 136	68,0	7,0	338	68,6	3,3	1 437	70,5	3,3	1 318	66,0	75,0	3,3	1 318
Superior	83,0	3,2	248	91,6	4,2	61	85,0	5,1	194	89,7	2,7	219	85,0	94,4	2,7	219
Quintil de riqueza																
Quintil inferior	14,1	5,9	3 071	36,8	10,1	620	47,4	4,5	2 809	51,5	4,2	2 660	47,2	55,7	4,2	2 660
Segundo quintil	27,1	6,0	1 767	61,6	7,6	385	67,8	3,0	1 407	72,3	2,7	1 205	68,5	76,1	2,7	1 205
Quintil intermedio	57,8	5,8	413	81,9	6,9	85	82,9	3,9	368	81,6	3,7	320	75,7	87,5	3,7	320
Cuarto quintil	79,4	6,8	79	98,9	1,2	26	99,8	0,2	46	82,0	9,5	48	66,7	97,2	9,5	48
Quintil superior	90,1	5,8	14	71,7	36,0	6	100,0	0,0	7	98,6	1,6	18	95,5	101,6	1,6	18
Ámbito JUNTOS	14,0	5,8	2 375	43,4	5,4	2 062	52,1	4,7	2 161	58,9	4,6	1 815	53,5	64,2	4,6	1 815

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación (C.V.) mayor a 15,0% deben ser considerados como referenciales.

N.C.: No Corresponde por ser información para el área rural.

a/ La estimación de cobertura nacional son realizadas con los datos captados en el año 2007, y la estimación del ámbito JUNTOS (638 distritos) son realizadas con información captada en el periodo 2005-2007, 1er. trimestre 2008 y la ampliación muestral. Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2007, 2009 y 2010.

CUADRO N° 28A: PROPORCIÓN DE PARTO EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE GESTANTES DEL ÁREA RURAL DEL ÚLTIMO NACIMIENTO DE LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2000, JUNIO 2007 Y 2010

Departamento	2000			Junio 2007 a/			2009-2010 b/			
	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Intervalo de confianza al 95%		Casos sin Ponderar	
							Inferior	Superior		
Total	23,8	4,1	5 344	50,5	7,9	1 122	56,5	63,5	3,0	4 251
Amazonas	19,5	16,5	394	39,1	13,2	343	46,2	62,0	7,4	674
Ancash	16,3	20,4	246	53,4	9,3	234	64,3	81,8	6,1	477
Apurímac	39,2	7,5	406	88,7	2,3	293	92,4	96,3	1,1	542
Arequipa	49,2	33,8	59	69,4	20,4	72	62,7	96,6	10,8	90
Ayacucho	32,8	14,1	400	61,2	9,5	312	81,1	94,2	3,8	599
Cajamarca	12,4	20,1	314	36,4	14,8	313	41,7	57,1	7,9	685
Cusco	23,7	13,0	291	66,8	10,9	193	58,2	80,2	8,1	446
Huancavelica	14,2	14,4	464	54,3	8,0	403	64,3	72,2	6,3	648
Huánuco	15,2	24,0	396	55,1	10,2	267	68,2	75,6	5,5	613
Ica	82,1	6,1	67	93,1	4,1	87	97,3	100,4	1,6	91
Junín	28,4	15,2	204	55,7	13,3	183	45,2	60,1	16,9	382
La Libertad	16,4	23,0	171	29,5	22,9	183	38,5	55,7	22,7	332
Lambayeque	33,0	21,3	115	59,7	10,5	124	63,1	94,3	25,2	175
Lima	51,1	18,1	122	79,2	13,4	53	76,6	91,9	10,2	55
Loreto	11,2	22,1	232	14,5	28,2	227	17,3	21,6	12,5	543
Madre de Dios	59,7	6,9	196	77,2	5,0	224	75,4	85,8	7,1	325
Moquegua	57,4	15,0	68	66,7	17,9	48	81,0	95,1	8,9	123
Pasco	31,0	23,0	197	57,4	10,4	190	63,5	75,3	9,5	407
Piura	36,4	15,2	154	44,0	21,1	150	55,6	72,7	15,7	257
Puno	10,3	15,3	358	28,2	13,0	248	48,8	57,4	8,9	454
San Martín	29,6	15,9	203	68,7	6,7	275	60,0	71,2	9,5	458
Tacna	45,2	11,3	42	61,3	20,0	80	74,9	84,6	6,6	66
Tumbes	83,9	6,1	56	90,1	5,0	71	83,8	103,8	12,1	81
Ucayali	20,6	28,9	189	32,3	22,1	164	25,4	38,0	25,3	365

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación (C.V.) mayor a 15.0% deben ser considerados como referenciales.

a/ La estimación a nivel nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007 y la estimación a nivel departamental corresponde a información recolectada en los años 2005, 2006, 2007 y 1er. trimestre 2008 más ampliación muestral.

b/ La estimación a nivel nacional corresponde a información recolectada entre los meses de marzo a diciembre del 2010 y la estimación a nivel departamental corresponde a información recolectada en el año 2009 y 2010.

Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar- ENDES 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.

CUADRO N° 29: PROPORCIÓN DE PARTO EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL ÚLTIMO NACIMIENTO EN LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO Y CARACTERÍSTICAS, 2000, 2007, 2009 Y 2010

Ámbito geográfico / Características	2000			2007 a/			2009			2010				
	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Intervalo de confianza al 95%		C.V.	Casos sin Ponderar	
										Inferior	Superior			
Total	57,9	1,4	10 499	76,6	2,5	2 149	79,8	1,0	10 289	81,8	80,1	83,4	1,0	9 252
Área de residencia														
Urbana	82,4	1,0	5 155	93,7	1,2	1 027	92,7	0,7	5 652	94,0	92,8	95,1	0,6	5 001
Rural	23,8	4,1	5 344	50,5	7,9	1 122	56,5	3,1	4 637	60,0	56,5	63,5	3,0	4 251
Región natural														
Costa	83,6	1,2	3 132	96,1	1,2	592	95,0	0,6	3 102	94,3	92,9	95,8	0,8	2 846
Lima Metropolitana	93,5	1,0	802	97,8	1,2	137	97,6	0,7	725	98,8	98,0	99,6	0,4	623
Resto Costa	73,3	2,3	2 330	94,3	2,1	455	92,1	1,1	2 377	89,6	86,9	92,3	1,5	2 223
Sierra	33,8	3,5	4 733	60,8	5,6	995	68,0	2,3	4 260	74,3	71,2	77,4	2,2	3 895
Sierra urbana	69,6	3,1	1 369	87,9	3,5	284	86,4	2,1	1 482	92,3	89,8	94,9	1,4	1 370
Sierra rural	18,3	5,7	3 364	46,8	9,4	711	57,1	3,8	2 778	62,9	58,5	67,3	3,6	2 525
Selva	40,6	4,4	2 634	61,1	5,5	562	63,9	3,2	2 927	63,0	58,5	67,5	3,6	2 511
Selva urbana	67,3	3,7	1 161	79,7	6,0	255	83,8	2,6	1 407	83,3	77,5	89,2	3,6	1 185
Selva rural	22,1	7,6	1 473	46,1	12,5	307	45,6	6,3	1 520	45,8	39,7	52,0	6,8	1 326
Nivel de educación														
Sin educación/Primaria	27,9	3,7	5 267	53,9	6,1	938	58,6	2,7	4 196	62,6	59,3	65,9	2,7	3 735
Secundaria	76,2	1,2	3 616	86,5	2,0	790	88,6	0,8	4 207	89,8	88,3	91,3	0,9	3 804
Superior	93,3	0,9	1 616	97,8	0,6	421	96,3	0,6	1 886	97,6	96,8	98,4	0,4	1 713
Quintil de riqueza														
Quintil inferior	16,0	5,8	3 315	40,1	9,0	680	49,6	4,0	3 157	53,2	49,3	57,2	3,8	2 944
Segundo quintil	41,0	3,7	2 739	71,2	4,2	608	76,5	1,8	2 824	80,6	78,2	83,0	1,5	2 340
Quintil intermedio	73,7	2,0	2 086	92,0	2,0	413	93,3	1,0	2 154	93,6	92,1	95,1	0,8	1 997
Cuarto quintil	89,5	1,1	1 463	98,0	0,7	249	97,0	0,6	1 336	97,5	96,3	98,7	0,6	1 261
Quintil superior	96,3	0,8	896	98,1	1,3	199	97,6	0,7	818	99,1	98,4	99,8	0,4	710
Ámbito JUNTOS	15,1	5,1	2 523	45,2	5,0	2 232	55,5	4,2	2 409	62,3	57,2	67,4	4,1	2 030

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación (C.V.) mayor a 15,0% deben ser considerados como referenciales.

a/ La estimación de cobertura nacional son realizadas con los datos captados en el año 2007; y la estimación del ámbito JUNTOS (638 distritos) son realizadas con información captada en el periodo 2005-2007, 1er. trimestre 2008 y la ampliación muestral. Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2007, 2009 y 2010.

CUADRO N° 29A: PROPORCIÓN DE PARTO EN ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL ÚLTIMO NACIMIENTO EN LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2000, JUNIO 2007, 2009 Y 2010

Departamento	2000				Junio 2007 a/				2009				2010				
	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		C.V.	Número de Casos sin Ponderar
														Inferior	Superior		
Total	57,9	1,4	10 499	76,6	2,5	2 149	79,8	1,0	10 289	81,8	1,0	83,4	80,1	83,4	1,0	9 252	
Amazonas	27,3	11,0	498	49,8	9,0	435	62,3	7,0	479	65,5	6,2	73,5	57,5	73,5	6,2	423	
Áncash	38,4	9,2	385	71,9	4,9	394	81,4	4,7	421	81,5	4,2	88,2	74,8	88,2	4,2	357	
Apurímac	49,3	5,3	511	91,2	1,7	405	94,4	1,4	392	97,0	1,0	98,9	95,1	98,9	1,0	340	
Arequipa	79,4	6,2	316	89,1	3,4	395	91,9	2,2	265	95,2	1,8	98,6	91,8	98,6	1,8	280	
Ayacucho	47,2	8,1	561	73,7	5,6	473	92,1	2,1	431	89,4	3,7	95,9	82,8	95,9	3,7	461	
Cajamarca	22,2	14,2	379	46,6	9,8	394	58,5	6,6	437	58,7	7,7	67,6	49,9	67,6	7,7	415	
Cusco	39,4	8,7	409	77,9	6,2	297	77,2	6,6	334	81,0	5,1	89,1	72,9	89,1	5,1	378	
Huancavelica	19,6	11,9	525	58,9	6,7	489	64,7	7,2	400	70,7	6,0	78,9	62,4	78,9	6,0	336	
Huánuco	28,3	12,6	488	65,5	7,1	369	72,9	5,2	425	78,9	3,9	85,0	72,8	85,0	3,9	382	
Ica	92,5	1,5	320	96,3	1,2	416	96,4	1,0	360	97,3	1,2	99,7	95,0	99,7	1,2	343	
Junín	46,0	8,7	387	72,6	6,3	327	67,1	7,0	399	69,9	8,0	80,9	59,0	80,9	8,0	362	
La Libertad	51,6	5,7	378	70,1	6,3	406	69,2	6,5	414	78,3	4,3	84,9	71,7	84,9	4,3	403	
Lambayeque	57,4	6,6	326	83,3	2,5	414	89,1	5,2	275	82,4	9,2	97,3	67,6	97,3	9,2	285	
Lima	89,5	1,5	979	97,2	0,7	636	96,6	0,7	818	97,5	0,6	98,7	96,4	98,7	0,6	697	
Loreto	39,6	10,4	505	48,4	8,6	532	52,9	6,2	632	47,6	8,2	55,3	39,9	55,3	8,2	538	
Madre de Dios	74,9	3,1	458	90,8	1,6	637	88,5	2,3	529	85,8	3,6	91,8	79,8	91,8	3,6	391	
Moquegua	83,6	3,6	304	90,6	2,9	313	95,2	1,7	304	92,5	3,0	98,0	87,1	98,0	3,0	287	
Pasco	50,7	9,3	408	76,3	4,4	474	75,9	5,6	506	80,4	5,5	89,1	71,7	89,1	5,5	382	
Plura	63,4	4,9	437	75,4	4,8	427	81,3	3,6	458	81,3	4,9	89,2	73,5	89,2	4,9	446	
Puno	20,5	10,1	531	43,9	7,8	377	57,7	7,5	419	65,4	5,9	72,9	57,8	72,9	5,9	347	
San Martín	45,8	8,1	389	76,3	4,2	508	66,2	6,8	418	76,4	5,5	84,7	68,1	84,7	5,5	416	
Tacna	82,2	3,1	259	88,0	3,8	330	92,2	2,0	259	91,7	2,9	96,8	86,5	96,8	2,9	190	
Tumbes	85,7	2,9	329	94,0	1,5	458	94,0	1,5	380	94,9	2,5	99,6	90,2	99,6	2,5	336	
Ucayali	46,3	8,8	417	73,0	4,9	518	61,0	7,4	534	66,0	7,3	75,5	56,5	75,5	7,3	457	

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación (C.V.) mayor a 15,0% deben ser considerados como referenciales.

a/ La estimación a nivel nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007 y la estimación a nivel departamental corresponde a información recolectada en los años 2005, 2006, 2007 y 1er. trimestre 2008 más ampliación muestral, la mediana de fecha de entrevistas es junio 2007.

Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar: ENDES 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.

CUADRO N° 30: PROPORCIÓN DE PARTO DE GESTANTES PROCEDENTES DEL ÁREA RURAL DEL ÚLTIMO NACIMIENTO EN LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA ATENDIDO POR PROFESIONAL DE LA SALUD, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO Y CARACTERÍSTICAS, 2000, 2007, 2009 Y 2010

Ámbito geográfico / Características	2000				2007 a/				2009				2010			
	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Intervalo de confianza al 95%	C.V.	Casos sin Ponderar	
													Inferior	Superior		
Total	29,0	3,9	5 344	52,7	7,1	1 481	61,0	2,8	4 637	63,7	2,7	4 253	60,3	67,2	2,7	4 253
Área de residencia																
Urbana	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
Rural	29,0	3,9	5 344	52,7	7,1	1 481	61,0	2,8	4 637	63,7	2,7	4 253	60,3	67,2	2,7	4 253
Región natural																
Resto Costa	55,5	8,1	507	81,8	11,7	133	84,0	3,4	339	75,5	7,7	400	64,0	87,0	7,7	400
Sierra rural	24,1	5,2	3 364	50,8	7,9	932	63,0	3,5	2 778	67,9	3,2	2 527	63,6	72,2	3,2	2 527
Selva rural	26,2	8,5	1 473	42,4	15,9	416	45,4	6,2	1 520	46,8	6,7	1 326	40,7	53,0	6,7	1 326
Nivel de educación																
Sin educación/Primaria	19,6	5,0	3 960	42,8	8,3	972	53,2	3,8	3 006	56,5	3,7	2 714	52,4	60,6	3,7	2 714
Secundaria	49,3	4,6	1 136	71,1	6,2	438	73,5	2,7	1 437	74,7	2,8	1 319	70,6	78,9	2,8	1 319
Superior	86,9	2,8	248	94,2	3,1	71	91,8	3,4	194	93,5	2,1	220	89,7	97,2	2,1	220
Quintil de riqueza																
Quintil inferior	17,7	5,6	3 071	39,6	8,1	866	51,5	4,2	2 809	54,3	3,9	2 661	50,1	58,5	3,9	2 661
Segundo quintil	33,6	5,2	1 767	65,3	7,0	477	73,0	2,7	1 407	77,2	2,2	1 206	73,8	80,6	2,2	1 206
Quintil intermedio	67,5	4,8	413	87,7	5,5	99	87,2	3,3	368	87,8	3,1	320	82,5	93,2	3,1	320
Cuarto quintil	85,7	5,8	79	94,6	4,0	31	99,8	0,2	46	93,5	4,5	48	85,2	101,9	4,5	48
Quintil superior	93,5	7,4	14	100,0	0,0	8	100,0	0,0	7	100,0	0,0	18	100,0	100,0	0,0	18
Ámbito JUNTOS	18,7	5,4	2 375	44,7	4,8	2 805	58,9	4,4	2 161	63,2	4,3	1 816	57,8	68,5	4,3	1 816

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación (C.V.) mayor a 15,0% deben ser considerados como referenciales.

n.c. = No Corresponde por ser información para el área rural.

a/ La estimación de cobertura nacional son realizadas con los datos captados en el año 2007; y, la estimación del ámbito JUNTOS (638 distritos) son realizadas con información captada en el periodo 2005-2007, 1er. trimestre 2008 y la ampliación muestral.

Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2007, 2009 y 2010.

CUADRO N° 30A: PROPORCIÓN DE PARTO DE GESTANTES PROCEDENTES DEL ÁREA RURAL DEL ÚLTIMO NACIMIENTO EN LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA ATENDIDO POR PROFESIONAL DE LA SALUD, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2000, JUNIO 2007 Y 2010

Departamento	2000			Junio 2007 a/			2009-2010 b/			
	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Intervalo de confianza al 95%		Casos sin Ponderar	
							Inferior	Superior		
Total	29,0	3,9	5 344	52,7	7,1	1 481	60,3	67,2	2,7	4 253
Amazonas	22,3	16,9	394	41,2	13,0	449	49,5	64,2	6,6	674
Ancash	22,4	18,6	246	53,9	10,5	304	68,0	82,0	4,7	478
Apurímac	40,9	7,3	406	79,3	4,8	372	93,2	96,8	1,0	543
Arequipa	49,2	32,2	59	70,0	22,7	90	84,9	98,1	7,9	90
Ayacucho	40,0	12,3	400	64,3	8,1	426	88,3	94,4	3,6	599
Cajamarca	17,2	18,4	314	40,0	12,3	402	54,6	62,8	7,7	685
Cusco	28,9	10,2	291	62,4	11,5	263	71,2	81,0	7,1	446
Huancavelica	17,9	12,4	464	51,8	8,6	554	69,0	75,8	5,0	648
Huánuco	18,4	19,8	396	54,8	9,6	374	75,8	81,3	3,7	613
Ica	83,6	4,4	67	95,4	4,2	109	99,1	101,0	1,0	91
Junín	41,2	18,3	204	58,8	13,2	226	50,6	65,7	15,1	382
La Libertad	19,9	22,8	171	37,5	19,4	248	51,5	68,7	17,1	332
Lambayeque	37,4	19,6	115	60,8	12,2	158	64,1	94,5	24,2	175
Lima	58,0	15,8	122	82,1	11,9	67	81,2	93,5	7,7	55
Loreto	14,2	22,4	232	13,5	24,3	342	16,1	20,5	13,7	543
Madre de Dios	65,3	6,4	196	77,3	6,3	286	78,3	88,4	6,5	325
Moquegua	70,6	12,5	68	90,9	4,5	55	88,8	99,3	6,0	123
Pasco	36,0	18,9	197	58,9	11,2	248	69,1	78,7	7,1	407
Piura	43,5	15,5	154	43,5	19,8	207	62,0	78,9	13,8	257
Puno	16,8	16,6	358	35,2	10,9	327	56,5	64,0	6,7	454
San Martín	32,5	18,3	203	61,0	8,7	346	57,3	68,0	9,5	458
Tacna	66,7	16,4	42	73,9	15,4	92	86,7	92,7	3,5	66
Tumbes	85,7	4,9	56	90,1	5,2	81	84,8	104,7	11,9	81
Ucayali	22,8	30,8	189	31,9	22,2	229	28,2	41,6	24,2	365

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación (C.V.) mayor a 15,0% deben ser considerados como referenciales.

a/ La estimación a nivel nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007 y la estimación a nivel departamental corresponde a información recolectada en los años 2005, 2006, 2007 y 1er trimestre 2008 más ampliación muestral. la mediana de fecha de entrevistas es junio 2007.

b/ La estimación a nivel nacional corresponde a información recolectada entre los meses de marzo a diciembre del 2010 y la estimación a nivel departamental corresponde a información recolectada en el año 2009 y 2010.

Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar: ENDES 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.

CUADRO N° 31: PROPORCIÓN DE PARTO DEL ÚLTIMO NACIMIENTO EN LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA ATENDIDO POR PROFESIONAL DE LA SALUD, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO Y CARACTERÍSTICAS, 2000, 2007, 2009 Y 2010

Ámbito geográfico / Características	2000				2007 ^{a/}				2009				2010			
	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Intervalo de confianza al 95%		Casos sin Ponderar	C.V.
													Inferior	Superior		
Total	62,5	1,3	10 499	76,5	2,6	2 696	82,5	0,9	10 289	83,8	1,0	85,4	82,2	85,4	9 281	1,0
Área de residencia																
Urbana	86,6	0,8	5 155	94,2	1,2	1 215	94,4	0,6	5 652	95,0	0,6	96,1	93,9	96,1	5 028	0,6
Rural	29,0	3,9	5 344	52,7	7,1	1 481	61,0	2,8	4 637	63,7	2,7	67,2	60,3	67,2	4 253	2,7
Región natural																
Costa	87,4	1,1	3 132	96,4	1,2	700	96,7	0,5	3 102	95,5	0,7	96,8	94,1	96,8	2 873	0,7
Lima Metropolitana	95,5	0,8	802	98,1	1,0	160	98,6	0,5	725	99,0	0,4	99,8	98,3	99,8	628	0,4
Resto Costa	79,0	2,2	2 330	94,6	2,3	540	94,5	0,9	2 377	91,8	1,4	94,3	89,2	94,3	2 245	1,4
Sierra	39,7	3,2	4 733	63,3	5,3	1 268	72,8	2,2	4 260	78,1	2,0	81,1	75,1	81,1	3 897	2,0
Sierra urbana	75,9	2,7	1 369	90,0	3,4	336	89,3	1,7	1 482	94,4	1,3	96,7	92,1	96,7	1 370	1,3
Sierra rural	24,1	5,2	3 364	50,8	7,9	932	63,0	3,5	2 778	67,9	3,2	72,2	63,6	72,2	2 527	3,2
Selva	44,4	4,5	2 634	57,4	6,8	728	64,3	3,1	2 927	63,1	3,7	67,7	58,6	67,7	2 511	3,7
Selva urbana	70,5	3,4	1 161	77,8	5,9	312	84,8	2,6	1 407	82,4	3,8	88,5	76,3	88,5	1 185	3,8
Selva rural	26,2	8,5	1 473	42,4	15,9	416	45,4	6,2	1 520	46,8	6,7	53,0	40,7	53,0	1 326	6,7
Nivel de educación																
Sin educación/Primaria	32,7	3,5	5 267	55,1	5,7	1 242	62,3	2,5	4 196	65,6	2,5	68,9	62,3	68,9	3 737	2,5
Secundaria	81,2	1,1	3 616	87,7	1,9	971	90,7	0,7	4 207	91,4	0,8	92,7	90,0	92,7	3 821	0,8
Superior	96,7	0,5	1 616	98,4	0,6	483	98,2	0,4	1 886	98,9	0,3	99,4	98,4	99,4	1 723	0,3
Quintil de riqueza																
Quintil inferior	19,6	5,3	3 315	41,8	7,5	943	53,5	3,7	3 157	55,7	3,6	59,6	51,7	59,6	2 946	3,6
Segundo quintil	47,0	3,2	2 739	74,4	3,9	758	80,2	1,5	2 824	83,4	1,4	85,7	81,1	85,7	2 343	1,4
Quintil intermedio	80,1	1,6	2 086	94,2	1,5	488	94,9	0,8	2 154	95,6	0,6	96,8	94,4	96,8	2 004	0,6
Cuarto quintil	93,7	0,8	1 463	97,6	1,0	279	98,3	0,4	1 336	98,9	0,4	99,6	98,2	99,6	1 269	0,4
Quintil superior	98,5	0,4	896	99,5	0,3	228	99,5	0,3	818	99,6	0,3	100,1	99,1	100,1	719	0,3
Ámbito JUNTOS	20,0	4,8	2 523	46,4	4,5	3 016	62,1	3,9	2 409	66,8	3,8	71,8	61,8	71,8	2 031	3,8

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación (C.V.) mayor a 15,0%, deben ser considerados como referenciales.

a/ La estimación de cobertura nacional son realizadas con los datos captados en el año 2007; y la estimación del ámbito JUNTOS (638 distritos) son realizadas con información captada en el período 2005-2007; 1er. trimestre 2008 y la ampliación muestral.

Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2007, 2009 y 2010.

CUADRO Nº 31A: PROPORCIÓN DE PARTO DEL ÚLTIMO NACIMIENTO EN LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA ATENDIDO POR PROFESIONAL DE LA SALUD, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2000, JUNIO 2007, 2009 Y 2010

Departamento	Junio 2007 al				2009				2010				
	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Número de Casos sin Ponderar
											Inferior	Superior	
Total	62,5	1,3	10 499	76,5	2,6	2 696	82,5	0,9	10 289	83,8	82,2	85,4	9 281
Amazonas	29,7	11,3	498	50,3	9,7	553	64,1	6,6	479	68,5	60,6	76,3	423
Áncash	46,2	9,4	385	71,2	5,7	495	83,1	3,9	421	86,0	81,2	90,9	379
Apurímac	50,9	5,2	511	84,1	3,5	498	94,1	1,5	392	98,0	96,6	99,4	341
Arequipa	82,0	5,8	316	89,6	4,2	452	94,4	1,8	265	95,5	92,1	98,8	280
Ayacucho	54,0	7,4	561	75,6	5,0	613	92,5	1,9	431	89,7	83,6	95,8	461
Cajamarca	25,9	13,5	379	48,5	9,0	492	64,9	6,8	437	61,6	52,8	70,4	415
Cusco	43,3	7,5	409	75,2	6,8	385	79,2	5,8	334	81,9	74,4	89,4	378
Huancavelica	23,6	10,4	525	56,0	7,4	649	70,3	6,3	400	73,8	66,9	80,7	336
Huánuco	31,1	11,5	488	64,5	7,2	493	78,4	4,0	425	85,5	80,7	90,3	382
Ica	93,8	1,2	320	98,2	0,9	506	97,7	0,8	360	97,9	96,0	99,8	343
Junín	58,7	8,9	387	75,3	6,4	397	70,1	6,2	399	74,2	63,4	85,1	362
La Libertad	57,4	5,7	378	71,2	6,6	516	75,0	6,5	414	82,6	75,9	89,4	403
Lambayeque	65,0	5,5	326	83,4	3,1	496	90,1	5,2	275	84,1	69,9	98,4	285
Lima	92,3	1,3	979	97,5	0,6	743	97,9	0,5	818	98,3	97,3	99,2	702
Loreto	42,4	10,2	505	45,3	8,9	730	52,7	6,0	632	46,6	38,6	54,5	538
Madre de Dios	77,9	3,0	458	90,0	2,1	767	90,6	2,1	529	87,5	81,1	93,9	391
Moquegua	87,5	3,1	304	95,8	1,2	356	97,1	1,2	304	96,2	92,5	99,9	287
Pasco	57,6	7,7	408	77,4	4,9	592	80,8	4,4	506	84,2	77,1	91,2	382
Piura	69,1	4,6	437	74,0	5,5	548	85,6	3,4	458	84,4	76,8	92,0	447
Puno	27,9	9,9	531	50,4	6,5	485	64,2	6,3	419	72,4	66,3	78,5	347
San Martín	50,4	7,7	389	70,3	5,2	615	66,1	6,9	418	73,1	64,4	81,9	416
Tacna	88,4	2,7	259	91,8	3,4	371	95,0	1,7	259	94,9	90,9	98,9	190
Tumbes	89,4	2,8	329	94,6	1,5	523	94,8	1,6	380	96,0	91,2	100,8	336
Ucayali	49,2	9,3	417	71,0	5,6	661	62,1	7,1	534	68,5	58,6	78,4	457

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación (C.V.) mayor a 15,0% deben ser considerados como referenciales.

a/ La estimación a nivel nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007 y la estimación a nivel departamental corresponde a información recolectada en los años 2005, 2006, 2007 y 1er. trimestre 2008 más ampliación muestral, la mediana de fecha de entrevistas es junio 2007.

Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar: ENDES 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.

CUADRO Nº 32: PROPORCIÓN DE NACIDOS VIVOS CON EDAD GESTACIONAL MENOR A 37 SEMANAS EN LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA, SEGUN AMBITO GEOGRAFICO Y CARACTERISTICAS, 2007, 2009 Y 2010

Ámbito geográfico / Características	2007			2009			2010			Número de Casos sin Ponderar	
	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Intervalo de confianza al 95%		C.V.		
							Inferior	Superior			
Total	14,7	12,4	1 902	15,0	4,5	7 420	16,2	14,8	17,6	4,4	6 824
Área de residencia											
Urbana	19,1	14,5	866	18,7	5,1	4 071	19,8	17,7	21,9	5,2	3 682
Rural	9,0	14,7	1 036	8,1	8,3	3 349	9,8	8,4	11,3	7,2	3 142
Región natural											
Lima Metropolitana	20,4	18,3	98	22,8	9,2	531	23,7	19,0	28,3	9,8	455
Resto Costa	16,5	14,6	374	16,4	7,5	1 734	19,2	16,3	22,0	7,4	1 650
Sierra	13,1	26,2	895	11,3	6,3	2 981	13,1	11,5	14,6	5,9	2 797
Selva	9,5	17,2	535	9,3	9,4	2 174	8,6	6,9	10,4	10,2	1 922
Nivel de educación											
Sin educación/Primaria	n.d.	n.d.	n.d.	8,1	8,5	2 875	10,4	8,7	12,2	8,4	2 686
Secundaria	n.d.	n.d.	n.d.	15,9	6,0	3 154	16,9	14,9	18,9	6,0	2 892
Superior	n.d.	n.d.	n.d.	23,3	8,1	1 391	24,6	20,6	28,5	8,1	1 246
Quintil de riqueza											
Quintil inferior	n.d.	n.d.	n.d.	7,0	11,3	2 278	8,9	7,3	10,5	8,8	2 199
Segundo quintil	n.d.	n.d.	n.d.	14,4	7,5	1 997	12,4	10,3	14,5	8,4	1 764
Quintil intermedio	n.d.	n.d.	n.d.	13,2	8,9	1 601	18,8	15,6	22,1	8,6	1 467
Cuarto quintil	n.d.	n.d.	n.d.	20,5	9,2	985	21,8	17,3	26,2	10,1	894
Quintil superior	n.d.	n.d.	n.d.	26,5	10,6	559	27,1	21,7	32,6	10,0	500

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación (C.V) mayor a 15,0% deben ser considerados como referenciales. n.d. = no disponible.

Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2007, 2009 y 2010.

CUADRO N° 32A: PROPORCIÓN DE NACIDOS VIVOS CON EDAD GESTACIONAL MENOR A 37 SEMANAS EN LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA, SEGÚN DEPARTAMENTO, JUNIO 2007 Y 2010

Departamento	Junio 2007 a/			2009-2010 b/				
	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Intervalo de confianza al 95%		Casos sin Ponderar		
				Valor estimado	Inferior		Superior	
Total	14,7	12,4	1 902	16,2	14,8	17,6	4,4	6824
Amazonas	5,7	22,2	365	9,6	6,7	12,5	15,0	643
Áncash	8,7	18,5	294	11,1	8,2	14,0	13,0	548
Apurímac	11,6	15,1	360	18,9	15,3	22,5	9,5	527
Arequipa	11,6	17,3	310	10,8	7,7	14,0	14,7	396
Ayacucho	9,5	12,5	407	15,8	11,7	19,8	12,9	636
Cajamarca	6,4	29,2	315	8,0	5,8	10,2	13,5	639
Cusco	11,5	18,2	254	10,2	7,1	13,4	15,5	518
Huancavelica	8,3	14,7	413	7,2	4,6	9,7	17,8	516
Huánuco	6,7	24,6	333	15,0	11,0	19,0	13,2	566
Ica	9,5	16,2	331	14,3	10,2	18,4	14,3	522
Junín	10,4	18,9	257	15,6	11,8	19,5	12,4	541
La Libertad	8,0	20,6	342	17,3	13,4	21,2	11,2	603
Lambayeque	11,6	14,7	339	19,5	15,3	23,7	10,8	398
Lima	13,4	11,2	506	23,1	20,2	25,9	6,2	1113
Loreto	4,8	22,0	521	9,4	6,8	12,0	13,9	878
Madre de Dios	10,8	11,5	539	9,1	6,8	11,3	12,3	680
Moquegua	14,0	17,7	242	11,8	7,8	15,8	17,0	444
Pasco	14,7	13,1	389	13,5	10,5	16,4	10,9	653
Piura	12,5	16,6	368	15,9	13,0	18,7	9,0	656
Puno	5,5	20,8	332	12,3	9,4	15,2	11,7	562
San Martín	7,2	18,8	429	8,4	5,6	11,3	16,9	601
Tacna	11,3	19,1	251	9,8	6,7	12,9	15,8	327
Tumbes	10,9	17,3	337	12,8	9,4	16,2	13,3	537
Ucayali	8,3	14,4	470	9,9	7,8	12,0	10,7	739

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación (C.V.) mayor a 15,0% deben ser considerados como referenciales.

a/ La estimación a nivel nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007 y la estimación a nivel departamental corresponde a información recopilada en los años 2005, 2006, 2007 y 1er. trimestre 2008 más ampliación muestral, la mediana de fecha de entrevistas es junio 2007.

b/ La estimación a nivel nacional corresponde a información recolectada entre los meses de marzo a diciembre del 2010 y la estimación a nivel departamental corresponde a información recopilada en los años 2009 y 2010.

Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar: ENDES 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.

CUADRO Nº 33: PROPORCIÓN DE MUJERES EN UNIÓN CON DEMANDA INSATISFECHA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, SEGÚN
 ÁMBITO GEOGRÁFICO Y CARACTERÍSTICAS, 2000, 2007, 2009 Y 2010

Ámbito geográfico / Características	2000			2007 a/			2009			2010				
	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Intervalo de confianza al 95%		C.V.	Casos sin Ponderar	
										Inferior	Superior			
Total	10,2	3,2	16 518	7,8	7,5	3 866	7,2	3,9	14 637	6,9	6,4	7,5	4,1	13 626
Área de residencia														
Urbana	7,6	4,6	9 099	6,6	9,8	2 052	6,5	5,3	8 860	6,0	5,3	6,7	5,8	8 129
Rural	14,9	4,4	7 419	10,0	11,4	1 814	8,7	5,4	5 777	9,1	8,2	10,1	5,4	5 497
Región natural														
Costa	7,5	5,8	5 721	6,0	12,3	1 221	5,9	7,1	5 053	5,5	4,7	6,4	7,8	4 758
Lima Metropolitana	7,2	9,4	1 487	6,8	18,4	295	5,6	11,3	1 205	5,2	3,8	6,5	13,5	1 104
Resto Costa	7,8	6,7	4 234	5,2	14,1	926	6,3	8,5	3 848	6,0	5,0	6,9	7,9	3 654
Sierra	13,4	4,5	6 789	8,8	11,5	1 689	8,6	5,3	5 914	7,9	7,1	8,8	5,6	5 597
Sierra urbana	7,6	8,1	2 310	6,0	19,1	533	8,1	8,9	2 368	6,3	5,2	7,4	9,1	2 216
Sierra rural	16,6	5,2	4 479	10,5	13,9	1 156	8,9	6,6	3 546	9,2	7,9	10,5	7,0	3 381
Selva	12,6	6,9	4 008	11,3	12,7	956	8,3	6,9	3 670	9,7	8,4	11,1	7,1	3 271
Selva urbana	10,2	9,3	1 959	11,7	18,0	466	7,4	10,1	1 970	9,8	8,0	11,6	9,5	1 742
Selva rural	14,8	9,8	2 049	11,0	17,5	490	9,3	9,6	1 700	9,7	7,6	11,7	10,7	1 529
Nivel de educación														
Sin educación/Primaria	14,0	4,0	8 295	10,0	10,4	1 727	9,1	5,5	5 971	8,5	7,6	9,4	5,5	5 518
Secundaria	8,5	5,8	5 589	8,0	11,8	1 345	7,3	6,2	5 690	6,9	6,1	7,8	6,1	5 253
Superior	4,7	10,4	2 634	3,9	21,9	794	4,3	11,2	2 976	4,6	3,5	5,6	11,7	2 855
Quintil de riqueza														
Quintil inferior	19,8	4,7	4 050	13,2	12,8	966	9,7	6,7	3 382	10,5	9,3	11,8	6,0	3 286
Segundo quintil	11,8	6,2	3 998	7,3	14,8	1 038	9,4	6,5	3 755	7,4	6,3	8,5	7,4	3 241
Quintil intermedio	7,9	7,3	3 633	8,2	16,8	798	6,8	8,6	3 387	7,3	6,0	8,6	8,9	3 150
Cuarto quintil	6,8	8,8	2 886	5,2	20,8	603	6,3	11,5	2 438	5,6	4,3	7,0	12,3	2 379
Quintil superior	5,6	11,8	1 951	5,0	25,5	461	3,7	15,8	1 675	3,7	2,6	4,9	15,9	1 570
Ámbito JUNTOS	19,4	4,4	3 164	13,6	5,9	3 303	9,9	6,7	2 745	8,8	7,5	10,2	7,7	2 523

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación (C.V.) mayor a 15,0%, deben ser considerados como referenciales.

a/ La estimación de cobertura nacional son realizadas con los datos captados en el año 2007; y la estimación del ámbito JUNTOS (638 distritos) son realizadas con información captada en el periodo 2005-2007, 1er. trimestre 2008 y la ampliación muestral.

Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2007, 2009 y 2010.

**CUADRO N° 33A: PROPORCIÓN DE MUJERES EN UNIÓN CON DEMANDA INSATISFECHA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR,
SEGUN DEPARTAMENTO, 2000, JUNIO 2007 Y 2010**

Departamento	2000			Junio 2007 a/			2009-2010 b/				
	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar		
				Intervalo de confianza al 95%							
				Inferior	Superior		Inferior	Superior			
Total	10,2	3,2	16 518	7,8	7,5	3 866	6,9	6,4	7,5	4,1	13 626
Amazonas	13,9	8,5	741	11,5	11,4	724	5,4	4,3	6,6	10,9	1 227
Áncash	15,4	14,3	560	9,8	12,6	669	4,0	2,9	5,2	14,5	1 154
Apurímac	13,0	12,1	725	12,4	12,2	663	7,6	5,8	9,5	12,6	1 026
Arequipa	6,7	19,6	615	8,5	13,3	838	6,4	4,6	8,1	14,0	958
Ayacucho	19,2	11,2	720	9,9	12,7	685	9,7	7,2	12,3	13,4	1 148
Cajamarca	13,5	15,5	587	8,5	13,4	693	7,3	5,5	9,0	12,1	1 179
Cusco	11,8	14,7	587	9,8	11,2	530	10,1	8,1	12,0	9,8	1 058
Huancavelica	22,4	8,8	617	16,4	12,1	681	11,6	8,9	14,3	11,7	895
Huánuco	17,4	13,2	631	13,6	12,8	618	9,1	7,3	10,9	10,2	1 044
Ica	5,2	19,2	537	7,1	12,1	799	4,2	2,9	5,5	15,8	1 103
Junín	4,4	18,4	616	10,6	12,9	537	8,3	6,2	10,3	12,5	1 092
La Libertad	8,8	16,2	612	10,3	13,1	709	6,9	5,2	8,6	12,7	1 152
Lambayeque	12,8	12,2	587	9,5	11,2	760	7,3	5,5	9,2	13,1	913
Lima	7,3	8,6	1 773	8,4	9,0	1 346	5,5	4,6	6,3	8,0	2 574
Loreto	16,3	8,9	700	17,4	7,0	736	11,6	9,7	13,5	8,3	1 207
Madre de Dios	13,3	9,1	706	11,5	7,2	1 084	6,9	5,3	8,5	11,9	1 328
Moquegua	4,0	22,4	629	6,3	13,6	772	6,5	4,8	8,3	13,5	1 019
Pasco	8,6	13,9	570	10,1	9,4	740	7,7	6,2	9,3	10,3	1 252
Piura	9,5	13,0	739	10,1	14,2	740	8,1	6,6	9,6	9,4	1 339
Puno	16,6	7,8	819	10,7	8,3	732	7,8	6,3	9,2	9,5	1 246
San Martín	8,9	15,9	677	10,5	9,1	987	7,5	6,0	9,1	10,5	1 193
Tacna	5,9	14,4	509	6,0	17,4	690	6,6	5,0	8,1	12,1	858
Tumbes	5,2	15,0	612	6,6	13,9	916	4,9	3,8	6,1	12,1	1 138
Ucayali	10,9	12,5	649	13,5	10,5	851	11,4	9,7	13,1	7,7	1 160

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación (C.V.) mayor a 15,0% deben ser considerados como referenciales.

a/ La estimación a nivel nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007 y la estimación a nivel departamental corresponde a información recolectada en los años 2005, 2006, 2007 y 1er. trimestre 2008 más ampliación muestral; la mediana de fecha de entrevistas es Junio 2007.

b/ La estimación a nivel nacional corresponde a información recolectada entre los meses de marzo a diciembre del 2010 y la estimación a nivel departamental corresponde a información recolectada en los años 2009 y 2010.

Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar: ENDES 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.

CUADRO N° 34: PROPORCIÓN DE GESTANTES DEL ÚLTIMO NACIMIENTO EN LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA RECIBIÓ SU PRIMER CONTROL PRENATAL EN EL 1ER TRIMESTRE DE GESTACIÓN, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO Y CARACTERÍSTICAS, 2000, 2007, 2009 Y 2010

Ámbito geográfico / Características	2000			2007 al			2009			2010					
	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Intervalo de confianza al 95%		Casos sin Ponderar			
										Inferior	Superior				
Total	58,0	1,2	10 499	71,3	1,9	2 149	72,4	1,0	8 446	73,0	74,5	71,6	74,5	1,0	7 665
Área de residencia															
Urbana	68,9	1,3	5 155	76,2	2,4	1 027	76,6	1,1	4 849	76,5	78,3	74,7	78,3	1,2	4 318
Rural	42,7	2,3	5 344	63,8	2,9	1 122	64,0	1,8	3 597	66,3	68,7	63,9	68,7	1,9	3 347
Región natural															
Costa															
Lima Metropolitana	70,4	1,6	3 132	77,0	3,0	592	79,9	1,3	2 698	78,6	80,9	76,2	80,9	1,5	2 475
Resto Costa	75,6	2,2	802	75,2	4,7	137	82,6	2,0	636	79,1	82,9	75,2	82,9	2,5	540
Sierra	65,1	2,2	2 330	79,0	3,9	455	76,7	1,6	2 062	78,1	80,7	75,5	80,7	1,7	1 935
Sierra urbana	47,4	2,2	4 733	67,7	2,7	995	65,1	1,7	3 438	68,8	71,0	66,7	71,0	1,6	3 202
Sierra rural	61,0	2,8	1 369	77,2	4,0	284	67,8	3,0	1 271	72,8	76,1	69,5	76,1	2,3	1 184
Selva	41,5	2,9	3 364	62,8	3,6	711	63,3	2,1	2 167	66,1	68,9	63,3	68,9	2,2	2 018
Selva urbana	46,4	2,8	2 634	63,3	4,3	562	66,5	2,1	2 310	65,8	69,4	62,2	69,4	2,8	1 988
Selva rural	58,4	3,2	1 161	68,8	4,3	255	71,7	2,1	1 175	70,4	73,7	67,0	73,7	2,4	986
	38,1	4,2	1 473	58,8	7,3	307	61,0	4,1	1 135	61,6	67,7	55,5	67,7	5,0	1 002
Nivel de educación															
Sin educación/Primaria	41,8	2,3	5 267	64,6	3,1	938	63,7	1,8	3 225	65,8	68,3	63,4	68,3	1,9	2 894
Secundaria	65,9	1,6	3 616	71,6	2,7	790	72,9	1,4	3 538	71,3	73,6	69,1	73,6	1,6	3 228
Superior	81,3	1,5	1 616	81,6	3,3	421	83,5	1,4	1 683	87,1	89,2	85,1	89,2	1,2	1 543
Quintil de riqueza															
Quintil inferior	36,8	3,0	3 315	59,8	4,0	680	61,1	2,7	2 337	63,3	66,4	60,2	66,4	2,5	2 223
Segundo quintil	49,9	2,6	2 739	68,6	3,0	608	66,0	2,0	2 300	67,6	70,3	64,8	70,3	2,1	1 942
Quintil intermedio	61,8	2,2	2 086	75,2	3,6	413	72,6	1,8	1 907	72,9	75,8	70,1	75,8	2,0	1 735
Cuarto quintil	75,2	1,9	1 463	77,5	5,0	249	79,9	1,9	1 183	80,5	83,4	77,7	83,4	1,8	1 121
Quintil superior	81,0	1,9	896	81,6	3,9	199	90,1	1,7	719	88,8	91,7	85,8	91,7	1,7	644
Ámbito JUNTOS	38,5	2,6	2 523	61,0	2,4	2 232	64,9	2,6	1 841	67,3	70,3	64,3	70,3	2,3	1 590

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación (C.V.) mayor a 15,0% deben ser considerados como referenciales.

a) La estimación de cobertura nacional son realizadas con los datos captados en el año 2007, y la estimación del ámbito JUNTOS (638 distritos) son realizadas con información captada en el periodo 2005-2007, 1er. trimestre 2008 y la ampliación muestral. Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2007, 2009 y 2010.

CUADRO N° 34A: PROPORCIÓN DE GESTANTES DEL ÚLTIMO NACIMIENTO EN LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA RECIBIÓ SU PRIMER CONTROL PRENATAL EN EL 1ER TRIMESTRE DE GESTACIÓN, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2000, JUNIO 2007, 2009 Y 2010

Departamento	2000				Junio 2007 a/				2009				2010			
	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		C.V.	Número de Casos sin Ponderar		
											Inferior	Superior				
Total	58,0	1,2	10 499	71,3	1,9	2 149	72,4	1,0	8 446	73,0	71,6	74,5	1,0	7 665		
Amazonas	37,8	7,5	498	61,6	6,1	435	67,9	3,9	389	68,0	62,3	73,7	4,3	363		
Áncash	47,0	5,3	385	71,6	4,0	394	71,7	3,7	347	72,4	66,4	78,5	4,2	322		
Apurímac	60,5	4,6	511	74,8	3,0	405	73,2	3,8	315	76,4	70,9	81,8	3,6	276		
Arequipa	64,9	6,2	316	76,7	3,1	395	74,6	4,4	226	74,5	69,0	80,0	3,8	247		
Ayacucho	45,3	5,1	561	69,7	3,6	473	64,8	4,9	339	66,5	61,6	71,3	3,7	368		
Cajamarca	45,1	5,0	379	65,3	4,3	394	70,1	4,3	353	68,3	62,1	74,6	4,6	332		
Cusco	64,5	4,0	409	70,9	4,6	297	74,9	5,0	276	78,6	73,8	83,3	3,1	309		
Huancavelica	45,7	6,0	525	70,4	3,9	489	64,7	5,1	295	72,6	66,8	78,5	4,1	264		
Huánuco	32,8	8,5	488	59,8	6,5	369	67,1	3,5	339	73,8	68,9	78,7	3,4	323		
Ica	70,3	3,8	320	78,1	2,4	416	79,1	2,9	311	77,9	72,5	83,3	3,5	296		
Junín	47,5	6,1	387	65,7	4,9	327	63,9	6,0	334	66,8	60,0	73,6	5,2	299		
La Libertad	56,1	4,1	378	70,5	3,9	406	68,7	3,6	339	71,8	66,2	77,5	4,0	337		
Lambayeque	54,9	5,9	326	75,5	3,8	414	76,2	6,1	237	77,9	70,1	85,7	5,1	236		
Lima	74,0	2,2	979	76,8	2,1	636	82,1	1,9	714	79,0	75,3	82,7	2,4	604		
Loreto	42,0	6,7	505	59,7	4,7	532	61,6	5,1	472	57,4	49,0	65,7	7,4	388		
Madre de Dios	57,2	4,1	458	69,7	2,9	637	73,4	3,4	443	67,8	62,0	73,7	4,4	331		
Moquegua	64,1	5,3	304	80,5	2,9	313	75,7	4,4	268	79,6	73,2	86,1	4,1	248		
Pasco	50,0	6,5	408	67,4	3,4	474	69,9	4,4	418	71,8	66,8	76,7	3,5	327		
Plura	61,3	4,2	437	74,4	4,1	427	74,0	3,0	384	77,4	73,2	81,5	2,7	374		
Puno	38,0	6,9	531	51,2	5,5	377	48,9	6,3	334	54,0	47,6	60,3	6,0	278		
San Martín	58,1	4,8	389	72,8	3,1	508	69,0	3,5	336	73,2	65,7	80,8	5,2	331		
Tacna	70,3	5,0	259	72,9	3,4	330	75,2	3,9	234	74,8	67,7	82,0	4,9	170		
Tumbes	72,0	3,5	329	77,5	2,7	458	79,8	2,7	337	78,4	72,5	84,4	3,9	293		
Ucayali	47,7	6,7	417	68,9	2,8	518	56,4	5,3	406	63,6	57,0	70,3	5,3	349		

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación (C.V.) mayor a 15,0% deben ser considerados como referenciales.

a/ La estimación a nivel nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007 y la estimación a nivel departamental corresponde a información recolectada en los años 2005, 2006, 2007 y 1er. trimestre 2008 más ampliación muestral, la mediana de fecha de entrevistas es junio 2007.

Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar: ENDES 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.

CUADRO N° 35: PROPORCIÓN DE GESTANTES DEL ÚLTIMO NACIMIENTO EN LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA RECIBIERON 6 O MÁS CONTROLES PRENATALES, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO Y CARACTERÍSTICAS, 2000, 2007, 2009 Y 2010

Ámbito geográfico / Características	2000				2007 a/				2009				2010			
	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Intervalo de confianza al 95%		Casos sin Ponderar	C.V.	
												Inferior	Superior			
Total	50,6	1,5	10 499	76,4	1,9	2 149	80,8	0,8	8 446	81,0	0,8	79,7	82,4	7 665	0,8	
Área de residencia																
Urbana	65,5	1,5	5 155	81,4	2,2	1 027	84,2	0,8	4 849	84,2	0,8	82,7	85,8	4 318	0,9	
Rural	29,9	3,6	5 344	68,8	3,6	1 122	74,0	1,7	3 597	74,7	1,8	72,1	77,3	3 347	1,8	
Región natural																
Costa	67,4	1,8	3 132	85,1	2,5	592	86,3	1,0	2 698	84,9	1,2	82,9	86,8	2 475	1,2	
Lima Metropolitana	77,1	2,1	802	86,9	3,8	137	89,1	1,5	636	84,2	2,0	81,0	87,5	540	2,0	
Resto Costa	57,5	3,1	2 330	83,1	2,9	455	82,9	1,4	2 062	85,6	1,2	83,6	87,6	1 935	1,2	
Sierra	35,5	3,0	4 733	70,0	3,2	995	77,0	1,4	3 438	79,5	1,4	77,4	81,6	3 202	1,4	
Sierra urbana	53,3	3,2	1 369	71,9	3,7	284	78,8	2,0	1 271	84,7	1,5	82,2	87,2	1 184	1,5	
Sierra rural	27,7	4,3	3 364	69,0	4,5	711	75,9	2,0	2 167	76,0	2,1	72,8	79,1	2 018	2,1	
Selva	37,2	4,4	2 634	67,8	4,2	562	72,6	2,1	2 310	72,2	2,6	68,5	75,9	1 988	2,6	
Selva urbana	52,7	3,7	1 161	76,8	4,2	255	80,5	1,7	1 175	79,4	2,0	76,3	82,5	986	2,0	
Selva rural	26,5	8,3	1 473	60,6	7,8	307	64,3	4,4	1 135	65,5	5,0	59,1	71,9	1 002	5,0	
Nivel de educación																
Sin educación/Primaria	29,2	3,3	5 267	66,2	3,8	938	72,0	1,7	3 225	72,2	1,8	69,7	74,8	2 894	1,8	
Secundaria	61,6	1,7	3 616	81,4	2,4	790	82,4	1,0	3 538	82,3	1,1	80,5	84,2	3 228	1,1	
Superior	80,4	1,5	1 616	85,2	2,3	421	90,0	1,0	1 683	91,3	1,1	89,3	93,3	1 543	1,1	
Quintil de riqueza																
Quintil inferior	22,4	4,6	3 315	63,0	4,9	680	69,2	2,5	2 337	70,2	2,5	66,8	73,6	2 223	2,5	
Segundo quintil	38,3	3,5	2 739	70,7	3,3	608	77,9	1,5	2 300	78,1	1,6	75,8	80,5	1 942	1,6	
Quintil intermedio	57,5	2,6	2 086	81,4	3,9	413	82,0	1,5	1 907	82,4	1,7	79,6	85,2	1 735	1,7	
Cuarto quintil	72,3	2,2	1 463	87,2	3,0	249	88,1	1,3	1 183	89,9	1,3	87,6	92,2	1 121	1,3	
Quintil superior	83,0	1,9	896	88,1	2,8	199	92,1	1,3	719	89,7	1,9	86,4	93,1	644	1,9	
Ámbito JUNTOS	24,4	3,8	2 523	66,0	2,8	2 232	75,8	2,3	1 841	77,2	2,1	73,9	80,4	1 590	2,1	

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación (C.V.) mayor a 15,0% deben ser considerados como referenciales.

a/ La estimación de cobertura nacional son realizadas con los datos captados en el año 2007; y la estimación del ámbito JUNTOS (638 distritos) son realizadas con información captada en el periodo 2005-2007, 1er. Trimestre 2008 y la ampliación muestral. Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2007, 2009 y 2010.

CUADRO N° 35A: PROPORCIÓN DE GESTANTES DEL ÚLTIMO NACIMIENTO EN LOS 5 AÑOS ANTES DE LA ENCUESTA RECIBIERON 6 O MÁS CONTROLES PRENATALES, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2000, JUNIO 2007, 2009 Y 2010


Departamento	2000					Junio 2007 al					2009					2010				
	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Número de Casos sin Ponderar	Valor estimado	Intervalo de confianza al 95%		Número de Casos sin Ponderar	C.V.	Número de Casos sin Ponderar	
											Inferior	Superior			Inferior	Superior				
Total	50,6	1,5	10 499	76,4	1,9	2 149	80,8	0,8	8 446	81,0	79,7	82,4	0,8	7 665						
Amazonas	24,5	11,7	498	66,0	7,0	435	73,5	3,9	389	75,0	68,1	81,9	4,7	363						
Ancash	43,4	6,7	385	74,5	3,5	394	84,1	2,4	347	83,3	78,9	87,8	2,7	322						
Apurímac	48,7	6,5	511	84,0	2,4	405	87,5	2,4	315	86,5	82,9	90,2	2,1	276						
Arequipa	57,3	6,5	316	81,5	2,6	395	76,4	2,9	226	77,9	72,7	83,1	3,4	247						
Ayacucho	33,2	6,4	561	75,6	3,2	473	81,5	3,1	339	76,5	71,9	81,1	3,1	368						
Cajamarca	27,2	10,1	379	66,8	5,3	394	79,1	3,1	353	78,5	71,9	85,0	4,3	332						
Cusco	48,9	6,6	409	78,9	3,1	297	88,3	3,3	276	82,8	76,8	88,8	3,7	309						
Huancavelica	31,6	8,7	525	72,8	4,3	489	80,9	4,3	295	83,1	78,3	87,9	2,9	264						
Huánuco	22,7	13,5	488	76,4	3,9	369	85,8	2,1	339	88,8	86,1	91,6	1,6	323						
Ica	59,1	5,7	320	81,1	3,1	416	79,1	3,0	311	83,9	78,6	89,3	3,2	296						
Junín	39,5	9,6	387	69,8	5,3	327	74,7	4,3	334	76,4	68,9	84,0	5,0	299						
La Libertad	39,9	7,8	378	72,8	5,1	406	77,1	4,5	339	80,9	76,2	85,5	2,9	337						
Lambayeque	44,5	8,9	326	75,8	3,3	414	80,1	5,4	237	78,6	69,7	87,4	5,8	236						
Lima	75,0	2,2	979	85,0	1,9	636	88,2	1,5	714	84,9	81,8	88,0	1,9	604						
Loreto	36,0	9,0	505	64,6	5,6	532	65,6	5,0	472	60,8	52,3	69,4	7,2	388						
Madre de Dios	52,0	4,8	458	78,3	2,2	637	81,8	1,9	443	80,5	75,6	85,3	3,1	331						
Moquegua	63,2	5,0	304	81,8	2,4	313	88,2	2,6	268	89,9	85,4	94,4	2,6	248						
Pasco	42,4	8,7	408	66,6	3,6	474	74,9	3,3	418	80,9	76,3	85,6	2,9	327						
Piura	52,2	6,5	437	77,9	4,0	427	77,4	3,5	384	84,3	79,7	88,9	2,8	374						
Puno	27,9	6,7	531	60,6	4,6	377	67,2	4,9	334	78,6	73,8	83,4	3,1	278						
San Martín	51,4	6,7	389	84,2	1,9	508	78,3	3,8	336	79,5	72,9	86,1	4,2	331						
Tacna	72,2	3,7	259	84,5	2,2	330	87,2	2,7	234	91,2	87,3	95,0	2,2	170						
Tumbes	68,7	5,1	329	86,7	1,9	458	88,2	2,0	337	85,2	81,2	89,2	2,4	293						
Ucayali	40,3	8,0	417	74,4	3,5	518	59,7	6,4	406	67,5	60,2	74,9	5,5	349						

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación (C.V.) mayor a 15,0% deben ser considerados como referenciales.

a) La estimación a nivel nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007 y la estimación a nivel departamental corresponde a información recopilada en los años 2005, 2006, 2007 y 1er trimestre 2008 más ampliación muestral, la mediana de fecha de entrevistas es junio 2007.

Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar: ENDES 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.

Anexo N° 3
Acceso de la Población
a la Identidad



CUADRO N° 36: PROPORCIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 59 MESES DE EDAD QUE NO ESTÁN INSCRITOS EN LA MUNICIPALIDAD / OFICINA REGISTRAL DEL RENIEC, SEGUN ÁMBITO GEOGRÁFICO Y CARACTERÍSTICAS, 2000, 2007, 2009 Y 2010

Ámbito geográfico / Características	2000				2007 al				2009				2010			
	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Intervalo de confianza al 95%		C.V.	Casos sin Ponderar
													Inferior	Superior		
Total	6,8	4,9	12 447	5,8	11,6	2 464	8,1	5,8	9 365	7,2	8,1	6,2	8,1	7,0	8 497	
Área de residencia																
Urbana	6,3	6,9	5 659	5,3	16,0	1 095	7,3	7,1	5 135	6,0	7,2	4,9	7,2	9,7	4 591	
Rural	7,3	6,9	6 788	6,5	16,7	1 369	9,6	9,6	4 230	9,2	11,0	7,4	11,0	10,0	3 906	
Región natural																
Costa	6,6	8,1	3 423	2,8	28,4	646	6,4	9,7	2 810	5,6	7,0	4,2	7,0	12,9	2 640	
Lima Metropolitana	9,0	10,1	856	2,1	59,9	145	7,3	13,5	666	6,5	8,9	4,0	8,9	19,2	574	
Resto Costa	4,2	12,1	2 567	3,6	26,7	501	5,4	12,4	2 144	4,7	6,1	3,4	6,1	14,8	2 066	
Sierra	4,8	7,3	5 912	4,7	21,8	1 159	4,4	11,4	3 885	4,6	5,6	3,5	5,6	12,0	3 574	
Sierra urbana	3,8	14,1	1 559	6,0	20,4	294	4,5	15,8	1 358	3,9	5,3	2,4	5,3	19,3	1 253	
Sierra rural	5,2	8,4	4 353	4,1	34,0	865	4,3	15,8	2 527	5,0	6,5	3,5	6,5	15,2	2 321	
Selva	12,8	9,4	3 111	18,7	14,7	659	21,9	8,6	2 670	18,1	21,6	14,6	21,6	9,7	2 283	
Selva urbana	9,0	11,2	1 269	21,7	19,1	279	17,0	10,6	1 278	12,2	15,7	8,6	15,7	14,9	1 067	
Selva rural	15,0	12,1	1 842	16,5	20,5	380	26,3	12,2	1 392	23,0	28,6	17,5	28,6	12,3	1 216	
Nivel de educación																
Sin educación/Primaria	8,2	6,4	6 797	9,4	14,5	1 145	11,5	8,2	3 872	10,6	12,6	8,6	12,6	9,5	3 458	
Secundaria	6,7	8,7	3 970	4,6	18,0	880	8,0	7,9	3 776	6,9	8,2	5,6	8,2	9,5	3 460	
Superior	2,6	23,4	1 680	0,9	41,4	439	3,2	18,6	1 717	1,9	2,8	1,1	2,8	23,0	1 579	
Quintil de riqueza																
Quintil inferior	9,5	7,4	4 409	9,5	18,9	874	13,8	9,5	2 883	12,8	15,4	10,3	15,4	10,0	2 701	
Segundo quintil	5,5	10,8	3 278	8,3	11,7	689	7,6	9,1	2 551	7,0	8,5	5,4	8,5	11,5	2 144	
Quintil intermedio	7,8	10,7	2 309	3,5	33,0	442	7,9	12,4	1 958	6,4	8,5	4,3	8,5	16,8	1 820	
Cuarto quintil	5,2	14,6	1 534	2,9	51,9	251	4,8	18,7	1 217	4,3	6,2	2,5	6,2	22,0	1 177	
Quintil superior	3,2	20,0	917	0,6	72,5	208	3,5	24,3	756	1,5	2,7	0,3	2,7	39,7	655	
Ámbito JUNTOS	6,4	5,7	3 309	5,6	16,0	1 965	6,7	18,5	2 187	6,2	8,5	4,0	8,5	18,3	1 866	

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación (C.V.) mayor a 15,0% deben ser considerados como referenciales.

a/ La estimación de cobertura nacional son realizadas con los datos captados en el año 2007; y la estimación del ámbito JUNTOS (638 distritos) son realizadas con información captada en el periodo 2005-2007, 1er. trimestre 2008 y la ampliación muestral. Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2000, 2007, 2009 y 2010.

CUADRO N° 36A: PROPORCIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS DE 6 A 59 MESES DE EDAD QUE NO ESTÁN INSCRITOS EN LA MUNICIPALIDAD / OFICINA REGISTRAL DEL RENIEC, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2000, JUNIO 2007 Y 2010

Departamento	2000			Junio 2007 a/			2009-2010 b/				
	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Valor estimado	C.V.	Casos sin Ponderar	Intervalo de confianza al 95%		Casos sin Ponderar		
							Inferior	Superior			
Total	6,8	4,9	12 447	5,8	11,6	2 464	7,2	6,2	8,1	7,0	8 497
Amazonas	3,4	20,4	594	4,1	30,3	383	5,5	3,3	7,7	20,5	834
Áncash	8,0	16,2	463	1,8	77,2	243	3,2	1,5	4,9	27,0	745
Apurímac	2,9	24,0	611	4,3	36,1	344	2,3	1,0	3,6	29,3	682
Arequipa	4,3	29,9	346	1,6	53,7	185	6,0	3,9	8,1	18,0	498
Ayacucho	3,6	27,2	698	5,0	28,3	415	4,6	2,6	6,7	22,7	808
Cajamarca	6,2	31,5	464	3,9	28,1	288	5,9	2,6	9,2	28,2	756
Cusco	3,8	17,8	498	1,2	54,7	253	3,7	2,0	5,4	23,3	646
Huancavelica	2,0	30,3	758	2,9	31,7	443	4,4	2,3	6,4	23,7	682
Huánuco	7,3	17,2	614	6,3	23,0	316	7,5	4,9	10,0	17,3	734
Ica	4,5	22,0	353	6,4	21,3	237	4,5	2,6	6,4	21,6	632
Junín	4,6	25,1	478	2,5	42,5	263	4,7	1,7	7,7	32,2	695
La Libertad	6,8	19,0	454	7,3	32,8	310	6,2	3,9	8,6	19,0	743
Lambayeque	3,7	24,5	380	5,4	34,2	219	4,6	1,8	7,5	31,7	513
Lima	9,1	9,4	1 059	5,6	20,7	525	6,8	5,4	8,3	10,7	1 391
Loreto	20,3	10,2	625	34,5	10,9	485	37,1	30,9	43,4	8,6	1 089
Madre de Dios	5,7	27,2	523	7,5	24,0	354	7,7	5,1	10,4	17,4	823
Moquegua	2,5	33,0	317	4,5	48,6	179	2,7	1,4	4,1	25,5	547
Pasco	6,6	12,7	482	9,8	30,7	265	7,2	4,8	9,6	17,1	799
Piura	3,6	20,8	507	6,5	33,6	283	5,5	3,4	7,6	19,5	815
Puno	1,9	30,0	673	2,0	34,6	349	2,7	1,6	3,8	20,8	707
San Martín	8,4	19,4	442	7,5	24,2	308	5,7	3,8	7,6	16,9	763
Tacna	3,0	39,4	267	2,9	38,8	169	4,7	2,9	6,5	19,5	412
Tumbes	0,8	58,2	360	7,2	36,8	223	6,8	4,2	9,4	19,5	656
Ucayali	21,2	8,6	481	23,0	13,0	297	30,9	25,0	36,9	9,8	892

Nota: Los Estimadores con Coeficiente de Variación (C.V.) mayor a 15,0% deben ser considerados como referenciales.

a/ La estimación a nivel nacional corresponde a información recolectada entre los meses de febrero a setiembre del 2007 y la estimación a nivel departamental corresponde a información recopilada en los años 2005, 2006, 2007 y 1er. Trimestre 2008 más ampliación muestral, la mediana de fecha de entrevistas es junio 2007.

b/ Estimaciones obtenidas con datos de 566 conglomerados que representan el 50,0 por ciento de la muestra total; 1132 conglomerados. Fuente: INEI-Encuesta Demográfica y de Salud Familiar: ENDES 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.